



Schweizerisches Gesundheitsobservatorium
Observatoire suisse de la santé
Osservatorio svizzero della salute
Swiss Health Observatory

OBSAN **DOSSIER 60**

60

Expérience de la population âgée de 65 ans et plus avec le système de santé

Analyse de l'International Health Policy Survey 2017
de la fondation Commonwealth Fund
sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Clémence Merçay

L'Observatoire suisse de la santé (Obsan) est une institution mandatée par la Confédération et les cantons. L'Obsan analyse les informations existant en Suisse dans le domaine de la santé. Il soutient la Confédération, les cantons et d'autres institutions du secteur de la santé publique dans leur planification, leur prise de décisions et leur action. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.obsan.ch.

Paraissent dans la **série «Obsan Dossier»** des rapports de recherche destinés aux spécialistes de la santé. La réalisation des rapports est assurée par l'Obsan ou confiée à des experts externes. Le contenu des rapports est de la responsabilité de leurs auteurs. Les Dossiers de l'Obsan ne sont normalement disponibles que sous forme électronique (pdf).

Impressum

Éditeur

Observatoire suisse de la santé (Obsan)

Mandant

Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Auteurs

– Clémence Merçay, Obsan

Collaboration

– Tamara Bonassi, OFSP
– Isabelle Sturny, Obsan

Série et numéro

Obsan Dossier 60

Référence bibliographique

Merçay, C. (2017). *Expérience de la population âgée de 65 ans et plus avec le système de santé. Analyse de l'International Health Policy Survey 2017 de la fondation Commonwealth Fund sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)* (Obsan Dossier 60). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé.

Renseignements / informations

Observatoire suisse de la santé
Espace de l'Europe 10
CH-2010 Neuchâtel
Tél. 058 463 60 45
obsan@bfs.admin.ch
www.obsan.ch

Page de couverture

Roland Hirter, Berne

Impression

en Suisse

Numéro OFS

1038-1703-05

Téléchargement du fichier PDF

www.obsan.ch → Publications (gratuit)

Ce document est disponible uniquement sous forme électronique.

ISBN

978-2-940502-69-1

© Obsan 2017

Expérience de la population âgée de 65 ans et plus avec le système de santé

Analyse de l'International Health Policy Survey 2017
de la fondation Commonwealth Fund
sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Auteure Clémence Merçay
Éditeur Observatoire suisse de la santé (Obsan)

Neuchâtel 2017

Table des matières

| | | | |
|--|----|--|------------|
| Résumé | 3 | 3.4.4 Aide reçue | 32 |
| Management Summary | 4 | 3.4.5 Aide délivrée | 33 |
| 1 Introduction | 5 | 3.5 Coordination des soins | 33 |
| 2 Méthodologie | 6 | 3.5.1 Problèmes de coordination | 35 |
| 2.1 Échantillon | 6 | 3.5.2 Coordination entre médecin spécialiste et médecin habituel | 35 |
| 2.2 Précautions pour l'analyse | 8 | 3.5.3 Suivi des soins après une hospitalisation | 36 |
| 2.3 Tableaux annexes | 8 | 3.6 Souhaits en matière de traitements en fin de vie | 37 |
| 2.3.1 Catégories « Medical Home » et « Malade » | 9 | 3.7 Satisfaction concernant les soins médicaux reçus | 39 |
| 2.4 Analyses cantonales | 9 | 3.8 Analyse cantonale | 40 |
| 3 Résultats | 10 | 3.8.1 Canton de Zurich | 41 |
| 3.1 État de santé | 10 | 3.8.2 Cantons de Vaud et de Genève | 42 |
| 3.1.1 État de santé auto-évalué | 10 | 3.8.3 Canton du Valais | 45 |
| 3.1.2 Prévalence des maladies chroniques | 12 | 4 Points essentiels pour la Suisse | 47 |
| 3.1.3 Risques de chute | 13 | 5 Bibliographie | 50 |
| 3.1.4 Santé psychique | 14 | 6 Annexes | 51 |
| 3.2 Conditions de vie matérielles | 16 | Index des tableaux des annexes | 190 |
| 3.2.1 Renoncement aux soins | 16 | | |
| 3.2.2 Difficultés à payer des factures médicales | 18 | | |
| 3.2.3 Motifs d'inquiétude | 19 | | |
| 3.3 Soins de premier recours | 20 | | |
| 3.3.1 Accès et déroulement de la consultation | 21 | | |
| 3.3.2 Medical Home | 23 | | |
| 3.3.3 Gestion des maladies chroniques | 24 | | |
| 3.3.4 Prévention | 26 | | |
| 3.3.5 Recours aux instruments de cybersanté | 27 | | |
| 3.4 Recours aux prestations de santé | 29 | | |
| 3.4.1 Consultation de médecins | 29 | | |
| 3.4.2 Consommation de médicaments | 30 | | |
| 3.4.3 Recours aux services d'urgence | 31 | | |

Résumé

L'enquête internationale sur les politiques de santé (International Health Policy Survey) menée en 2017 par la fondation Commonwealth Fund porte sur l'expérience du système de santé de la population âgée de 65 ans et plus vivant à son domicile. Ces données permettent de comparer les résultats pour la Suisse à ceux de dix autres pays (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, Pays-Bas, France, Norvège, Suède). De plus, il est possible de saisir les tendances récentes sur la période 2014 à 2017. En 2017, l'échantillon pour la Suisse comprend 3238 répondants (1084 en 2014).

En comparaison avec les autres pays, la population âgée de Suisse vivant à son domicile présente plutôt de bonnes conditions de santé. La majorité décrit son état de santé comme bon, très bon ou excellent (79,1%), 88,6% déclarent ne pas avoir besoin d'aide, en raison de problèmes de santé, pour des tâches de la vie quotidienne et 92,7% des répondants âgés de 75 ans et plus ne considèrent pas présenter un risque de chute élevé.

En Suisse, comme dans les autres pays participants, la quasi-totalité des répondants dispose d'un médecin habituel (96,8%). De plus, il est plus souvent rapporté en 2017 qu'en 2014 que celui-ci fournit toujours ou souvent une aide à la coordination des soins avec les autres prestataires (85,3% vs 78,2%). Par contre, une baisse de l'accessibilité rapide au médecin est relevée avec 46,5% des répondants pour la Suisse parvenant à obtenir un rendez-vous le jour-même ou le lendemain contre 63,9% en 2014. Par ailleurs, les répondants pour la Suisse mentionnent moins fréquemment que ceux des autres pays avoir discuté avec leur médecin de sujets de prévention tels que l'activité physique (47,0%) ou l'alimentation (31,8%).

Alors que dans les années à venir, la question de l'accès à un médecin de premier recours est amenée à se poser de façon particulièrement accrue, l'une des pistes avancées afin de répondre aux besoins de soins serait de substituer, pour certains traitements médicaux de base, le médecin par un autre professionnel spécialisé de la santé. En Suisse, 60,5% des répondants se déclarent ouverts à une telle substitution. Comme ce pourcentage était déjà de 59,9% en 2014, une marge de manœuvre semble donc se confirmer dans ce domaine.

En matière de recours aux soins, la Suisse affiche des résultats stables et dans la moyenne des autres pays pour ce qui concerne le recours aux prestations médicales des médecins spécialistes, le taux d'hospitalisation et l'utilisation de services d'urgence. Un changement notable par rapport à 2014 concerne la hausse de la part de répondants pour la Suisse déclarant avoir consulté au moins quatre médecins différents (de 8,1% à 14,7% en 2017).

Entre 2014 et 2017, la part de répondants pour la Suisse déclarant avoir renoncé pour des raisons de coûts à une consultation médicale, à des traitements ou examens de contrôle ou à l'achat de médicaments est passée de 6,3% à 13,2%. Dans le même temps, la part rapportant des difficultés à payer des factures médicales est passée de 2,3% à 4,3%. Ces difficultés affectent tout particulièrement les répondants des États-Unis et d'Australie mais les répondants pour la Suisse sont singulièrement touchés en comparaison avec ceux des autres pays européens.

Les résultats ayant trait à la qualité et à la coordination des soins sont restés assez stables entre 2014 et 2017. Par exemple, 12,5% des répondants pour la Suisse déclarent s'être fait prescrire un test médical jugé superflu. Cette part était déjà de 10,5% en 2014. Un potentiel d'amélioration demeure donc dans le domaine de la qualité des soins, mais également pour ce qui concerne la coordination entre le médecin habituel et le médecin spécialiste et le suivi des soins à la sortie de l'hôpital.

Dans la perspective d'un renforcement du droit à l'autodétermination, il importe que les souhaits en matière de soins médicaux à recevoir soient formalisés. Dans ce domaine, une considérable progression des indicateurs « Souhaits en matière de traitements en fin de vie » est observée pour la Suisse. En 2017, 60,4% des répondants ont informé leurs proches ou un professionnel de la santé des traitements qu'ils souhaitent ou ne souhaitent pas recevoir (54,2% en 2014) et 35,7% ont fait figurer leurs choix de fin de vie dans un document écrit (24,9% en 2014).

Finalement, les répondants pour la Suisse évaluent de façon tout à fait positive leur expérience des soins de santé, tant du point de vue de la qualité (83,7% se disent entièrement satisfaits ou très satisfaits des soins reçus) que de la quantité de soins reçus (95,5% considèrent avoir reçu la quantité de soins appropriée).

Management Summary

Die internationale gesundheitspolitische Erhebung «International Health Policy Survey» der Stiftung Commonwealth Fund untersucht im Jahr 2017 die zu Hause lebende Bevölkerung ab 65 Jahren und ihre Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem. Diese Daten ermöglichen es, die Ergebnisse für die Schweiz mit jenen von zehn anderen Ländern (Australien, Kanada, Neuseeland, Grossbritannien, Vereinigte Staaten, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Schweden) zu vergleichen. Ausserdem ist es möglich, die jüngsten Entwicklungen im Zeitraum 2014 bis 2017 aufzuzeigen. Im Jahr 2017 umfasst die Stichprobe für die Schweiz 3238 Befragte (1084 im Jahr 2014).

Im Vergleich zu anderen Ländern hat die ältere, zu Hause lebende Bevölkerung der Schweiz, ziemlich gute Gesundheitsbedingungen. Die Mehrheit beschreibt ihre Gesundheit als gut, sehr gut oder ausgezeichnet (79,1%), 88,6% benötigen aus gesundheitlichen Gründen keine Hilfe bei alltäglichen Aktivitäten und 92,7% der Befragten im Alter von 75 Jahren und mehr weisen kein erhöhtes Sturzrisiko auf.

In der Schweiz verfügen – wie in den anderen teilnehmenden Ländern – fast alle Befragten über eine Hausärztin bzw. einen Hausarzt (96,8%). Zudem wird 2017 häufiger als 2014 berichtet, dass Hausärztinnen und Hausärzte immer oder häufig bei der Koordination der Versorgung mit anderen Leistungserbringern helfen (85,3% vs. 78,2%). Auf der anderen Seite wird ein Rückgang der raschen Verfügbarkeit der Ärztinnen und Ärzte festgestellt. So beträgt der Anteil der Befragten, die im Jahr 2017 am selben oder nächsten Tag einen Termin erhalten haben, in der Schweiz 46,5% gegenüber 63,9% im Jahr 2014. Außerdem berichten die Schweizer Befragten seltener als in anderen Ländern, dass sie mit ihrer Ärztin bzw. ihrem Arzt über Präventionsthemen wie körperliche Aktivität (47,0%) oder Ernährung (31,8%) gesprochen haben.

Während sich in den kommenden Jahren die Frage des Zugangs in der Grundversorgung verstärkt stellen wird, wäre bei gewissen einfachen medizinischen Behandlungen die Substitution der Ärztin oder des Arztes durch eine andere spezialisierte Gesundheitsfachperson eine Möglichkeit, die Versorgung zu gewährleisten. In der Schweiz stehen 60,5% der Befragten einer solchen Substitution offen gegenüber. Da dieser Anteil im Jahr 2014 bereits bei 59,9% lag, scheint in diesem Bereich ein gewisser Handlungsspielraum zu bestehen.

Bezüglich Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen weist die Schweiz konstante und im Vergleich zu den anderen Ländern durchschnittliche Ergebnisse auf, dies bei der Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen von Spezialistinnen und Spezialisten, der Hospitalisierungsrate und der Inanspruchnahme von Notfalldiensten. Eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber 2014 ist in der Schweiz die Zunahme des Anteils der Befragten, die mindestens vier verschiedene Ärztinnen und Ärzte konsultiert haben (von 8,1% auf 14,7% im Jahr 2017).

Zwischen 2014 und 2017 ist in der Schweiz der Anteil der Befragten, die aus Kostengründen auf einen Arztbesuch, auf Behandlungen, Kontrolluntersuchungen oder den Kauf von Medikamenten verzichtet haben, von 6,3% auf 13,2% gestiegen. Gleichzeitig hat der Anteil Personen mit Schwierigkeiten, medizinische Rechnungen zu bezahlen, von 2,3% auf 4,3% zugenommen. Diese Schwierigkeiten werden insbesondere von den Befragten in den Vereinigten Staaten und Australien genannt, aber die Schweizer Bevölkerung ist im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern besonders betroffen.

Die Ergebnisse zur Qualität und Koordination der Versorgung blieben zwischen 2014 und 2017 relativ stabil. So geben beispielsweise 12,5% der Befragten in der Schweiz an, einen überflüssigen medizinischen Test erhalten zu haben. Dieser Anteil betrug 2014 bereits 10,5%. Ein Optimierungspotential bleibt daher im Bereich der Versorgungsqualität, aber auch hinsichtlich der Koordination zwischen der Hausarzt- und der Spezialarztpraxis sowie bei der Folgebehandlung nach einem Spitalaufenthalt bestehen.

Im Hinblick auf die Stärkung des Selbstbestimmungsrechts ist es wichtig, die eigenen Wünsche nach medizinischer Versorgung zu formalisieren. In diesem Bereich ist für die Schweiz ein deutlicher Anstieg der Indikatoren «Behandlungswünsche am Lebendende» zu beobachten. Im Jahr 2017 haben 60,4% der Befragten ihre Angehörigen oder eine Gesundheitsfachperson über Behandlungen informiert, die sie am Lebendende erhalten respektive nicht erhalten wollen (54,2% im Jahr 2014). 35,7% der Befragten geben an, ihre Entscheidungen bezüglich Lebensende in einem schriftlichen Dokument festgehalten zu haben (24,9 im Jahr 2014).

Schliesslich bewerten die Schweizer Befragten ihre Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem als positiv, sowohl hinsichtlich der Qualität (83,7% sind vollständig oder sehr zufrieden mit der medizinischen Versorgung) als auch hinsichtlich der Menge an erhaltener medizinischer Versorgung (95,5% erachten die erhaltene Menge als gerade richtig).

1 Introduction

Dans ses dernières projections, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a estimé que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus allait passer de 1,5 million en 2015 à 2,2 millions en 2030 et à 2,7 millions en 2045 (OFS, 2015). Leur proportion au sein de la population résidant en Suisse qui se monte à 18,0% en 2015 passerait ainsi à 22,8% en 2030 et à 26,4% en 2045 (Kohli et al., 2015). Parallèlement, on observe qu'en 2014, les coûts de la santé pour les personnes de plus de 65 ans ont représenté près de la moitié (46,9%) de l'ensemble des coûts de la santé (OFS, 2017).

Ces constats et perspectives ne viennent que renforcer l'idée déjà bien établie selon laquelle l'état de santé de la population âgée, la promotion de son autonomie et les modalités de sa prise en charge par les services de santé constituent des enjeux de société majeurs.

L'enquête de la fondation Commonwealth Fund menée en 2017 auprès de la population âgée de 65 ans et plus permet de rassembler des informations inédites pour apprécier ces différents aspects directement à travers le regard des personnes concernées. Menée auprès de la population âgée de onze pays, cette enquête permet d'évaluer la situation de la Suisse par rapport à des pays comparables. De plus, la disponibilité de données pour l'année 2014 (Camenzind & Petrini, 2014) permet de saisir les tendances récentes.

2 Méthodologie

En 2017, l'International Health Policy Survey (IHP) de la fondation Commonwealth Fund a été menée auprès de la population âgée de 65 ans et plus de onze pays participants (Australie, Canada, Suisse, Allemagne, France, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Suède, Royaume-Uni, États-Unis, cf. Tableau 2.1). L'enquête comprenait 81 questions pour l'ensemble des pays et 10 questions spécifiques pour la Suisse. Dans le cadre de ce dossier, les résultats pour l'année 2014 sont également présentés afin de rendre compte des tendances récentes. Pour ce faire, seuls les répondants âgés de 65 ans et plus ont été retenus, l'enquête de 2014 s'étant adressée à l'ensemble des personnes âgées d'au moins 55 ans. De plus, de nouvelles questions ont été introduites dans l'enquête 2017, pour lesquelles des résultats inédits sont ainsi disponibles.

2.1 Échantillon

En 2017, l'échantillon pour la Suisse comprend 3238 répondants. Selon le pays, la taille de l'échantillon varie entre 500 (NZ) et 7000 répondants (SE), plusieurs pays disposant d'un échantillon d'environ 750 répondants (DE, FR, NL, NO, UK). Dans tous les pays, l'échantillon retenu pour 2014 est plus petit que celui de 2017. Cela s'explique notamment par le fait que l'enquête de 2014 a été conduite auprès des personnes âgées de 55 ans et plus et que seuls les répondants âgés de 65 ans et plus ont été retenus pour la comparaison temporelle. De plus, quatre cantons ont procédé à une densification de leur échantillon en 2017, avec pour effet d'augmenter la taille globale de l'échantillon pour la Suisse.

En Suisse l'enquête a été conduite par l'institut de sondage M.I.S. Trend. Le questionnaire était disponible en allemand, français et italien et la collecte des données s'est déroulée du 15 mars au 13 mai 2017. Au cours de cette période, les participants sélectionnés ont reçu un premier courrier postal les invitant à participer à l'enquête, que ce soit par téléphone ou dans sa version en ligne, ainsi que deux courriers ultérieurs de relance.

La majorité des répondants pour la Suisse ont privilégié le mode de réponse en ligne (64%) à l'enquête par téléphone (36%). Il s'agit d'une spécificité des données pour la Suisse en 2017 puisque tous les autres pays ont utilisé uniquement l'enquête téléphonique ; la Suisse elle-même n'avait utilisé que l'enquête téléphonique en 2014. Cette particularité doit être gardée à l'esprit lors des comparaisons temporelles et internationales (partie 2.2). La possibilité de répondre à l'enquête en ligne semble avoir favorisé la participation puisqu'en Suisse, le taux de réponse s'élève à 45% alors que dans presque tous les autres pays, ce taux est inférieur à 30%. En 2014, la Suisse avait toutefois atteint un taux de participation de 60% avec l'enquête téléphonique.

Tableau 2.1 Taille des échantillons dans les pays participants, 2014 et 2017

| Pays | Abréviation | 2014 n | 2017 n |
|------------------|-------------|-----------|-----------|
| Australie | AU | 1 670 | 2 500 |
| Canada | CA | 3 147 | 4 549 |
| Suisse | CH | 1 084 | 3 238 |
| Allemagne | DE | 547 | 751 |
| France | FR | 860 | 750 |
| Pays-Bas | NL | 582 | 750 |
| Norvège | NO | 651 | 750 |
| Nouvelle-Zélande | NZ | 379 | 500 |
| Suède | SE | 5 000 | 7 000 |
| Royaume-Uni | UK | 581 | 753 |
| États-Unis | US | 1 161 | 1 392 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

La base d'échantillonnage pour la Suisse est issue du cadre d'échantillonnage pour les enquêtes auprès des personnes et des ménages (OFS). Afin de refléter la composition de la population telle que figurant dans ce cadre d'échantillonnage, les données de l'enquête ont dans un premier temps été pondérées afin de correspondre à la structure de la population avec ou sans ligne téléphonique dans chaque région linguistique. L'ajustement pour les cantons du Valais, de Vaud, de Genève et de Zurich a été effectué de façon séparée, ces quatre cantons ayant procédé à une densification de leur échantillon.

Une poststratification a ensuite été appliquée de façon à faire correspondre au mieux les caractéristiques des répondants à celles de la population suisse recensée. Les données ont ainsi été pondérées en fonction du sexe par âge, du niveau de formation et du canton (Tableau 2.2).

Pour chaque question, les répondants avaient la possibilité de sélectionner les choix de réponse « Ne sait pas » (NSP) ou de refuser de répondre (Non réponse - NR). Ces deux types de réponse ont été inclus dans la présentation des résultats avec la catégorie « Ne sait pas/Non réponse (NSP/NR) ». Pour plusieurs questions, les répondants avaient également la possibilité de se déclarer « non concernés ». Il a été jugé au cas par cas s'il était pertinent pour l'analyse de conserver ou d'exclure ces répondants. Lorsque ceux-ci ont été exclus de l'analyse, une mention le signale en-dessous du tableau ou de la figure.

Tableau 2.2 Pondération de l'échantillon pour la Suisse, 2017

| | Distribution non pondérée | Distribution pondérée | Population adulte suisse |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Sexe par Age | | | |
| Homme 65-69 | 12.3% | 13.9% | 14.0% |
| Homme 70-74 | 14.4% | 12.0% | 11.7% |
| Homme 75+ | 20.4% | 18.6% | 18.4% |
| Femme 65-69 | 13.2% | 14.5% | 15.0% |
| Femme 70-74 | 15.0% | 13.3% | 13.1% |
| Femme 75+ | 24.6% | 27.7% | 27.8% |
| Formation | | | |
| École obligatoire | 69.9% | 78.0% | 77.8% |
| Secondaire II | 7.0% | 10.0% | 10.6% |
| Tertiaire | 23.0% | 11.9% | 11.7% |
| Canton | | | |
| Zurich | 10.3% | 17.1% | 16.6% |
| Berne | 5.8% | 14.0% | 13.7% |
| Lucerne | 1.8% | 4.6% | 4.5% |
| Uri | 0.1% | 0.3% | 0.5% |
| Schwyz | 0.7% | 1.7% | 1.7% |
| Obwald | 0.1% | 0.3% | 0.4% |
| Nidwald | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| Glaris | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
| Zoug | 0.6% | 1.3% | 1.3% |
| Fribourg | 1.5% | 3.2% | 3.1% |
| Soleure | 0.9% | 3.0% | 3.4% |
| Bâle-Ville | 0.8% | 2.5% | 2.6% |
| Bâle-Campagne | 1.4% | 4.0% | 4.0% |
| Schaffhouse | 0.2% | 0.8% | 1.1% |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 0.2% | 0.7% | 0.7% |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| Saint-Gall | 1.7% | 5.4% | 5.8% |
| Grisons | 1.3% | 2.6% | 2.6% |
| Argovie | 3.0% | 7.6% | 7.4% |
| Thurgovie | 0.9% | 2.7% | 3.0% |
| Tessin | 9.6% | 5.3% | 5.1% |
| Vaud | 10.0% | 8.6% | 8.4% |
| Valais | 9.9% | 4.3% | 4.2% |
| Neuchâtel | 2.0% | 2.3% | 2.2% |
| Genève | 35.8% | 5.6% | 5.4% |
| Jura | 0.8% | 1.0% | 1.0% |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

2.2 Précautions pour l'analyse

L'IHP a été conçue de façon à permettre d'établir des comparaisons entre les pays ainsi que de saisir des évolutions temporelles. Toutefois, les modifications apportées au questionnaire de l'enquête ou au mode de récolte des données dans un pays sont susceptibles d'altérer ces comparabilités. Outre quelques modifications mineures apportées à la formulation de certaines questions, un changement plus conséquent concerne le traitement des personnes se déclarant non concernées par une question. Cette option de réponse n'ayant pas été spontanément proposée aux répondants lors de l'enquête de 2014, il est possible que cela ait entraîné un report sur les réponses négatives (« Non, cela ne s'est pas produit ») ou sur les refus et abstentions. En 2017, les catégories de réponse du type « non concerné » ont été nettement plus souvent choisies par les répondants, en particulier en Suisse où cette option de réponse était directement proposée dans le questionnaire en ligne. Afin de comparer les résultats de 2014 avec ceux de 2017, il faut alors faire des hypothèses quant au comportement de réponse des personnes qui n'étaient pas concernées en 2014 mais ne se sont pas déclarées comme telles.

Une autre différence notable concerne l'introduction en 2017 du choix de réponse « n'est plus en traitement pour cette maladie » pour les questions ayant trait au diagnostic de maladies chroniques. Pour que ces résultats puissent être comparés à ceux de 2014, ces répondants ont été additionnés à ceux souffrant d'une maladie chronique au moment de l'enquête. Ce faisant, on présume toutefois que les répondants n'étant plus en traitement au moment de l'enquête de 2014 mentionnent tout de même les maladies qui leur ont été diagnostiquées.

De plus, il est possible que le mode d'enquête en ligne ait eu un effet sur les réponses données pour certains thèmes. Par exemple, sur un thème sensible tel que le renoncement aux soins pour des raisons de coûts, il est possible que la hausse de la part de personnes concernées observée en Suisse soit partiellement liée au changement de mode d'enquête. En effet, le biais de désirabilité sociale, lequel inciterait à plutôt à taire des difficultés financières, est moindre lors d'une enquête par internet. De plus un effet d'auto-sélection peut également intervenir. Par exemple, pour les questions ayant trait à l'utilisation d'internet ou d'applications mobiles, il semble probable que les participants ayant répondu à l'enquête en ligne soient plus enclins que ceux ayant préféré l'enquête téléphonique, à utiliser de tels outils.

Finalement, il est utile de souligner que cette enquête nous renseigne sur la perspective des patients. Cette perspective est particulièrement utile pour comprendre les opinions et attitudes des patients. On peut également se rendre compte de l'appréciation qu'ont les répondants sur des sujets tels que les erreurs médicales ou d'autres problèmes de qualité des soins. Pour autant, ces réponses ne devraient pas être considérées comme révélant la fréquence objective de ce type d'évènements.

Dans le même ordre d'idée, la description que donnent les répondants de certaines caractéristiques de leur état de santé telles que l'existence de troubles psychiques ou une probabilité de chute élevée correspond certainement, jusqu'à un certain point, à leur situation objective. Il est toutefois également possible que ces taux reflètent également une plus grande sensibilisation des répondants à ces thèmes.

2.3 Tableaux annexes

Les tableaux présentés en annexes contiennent le détail des réponses pour chaque question de l'enquête. Ces données sont présentées pour les années 2014 et 2017 avec d'une part, les résultats des comparaisons internationales et d'autre part, des données détaillées pour la Suisse. Pour ce dernier jeu de tableaux, les variables d'analyse sont le sexe, la classe d'âge, le niveau de formation, le niveau de revenu, le pays de naissance, le caractère rural/urbain et la région linguistique. À cela s'ajoutent les catégories « avec » ou « sans « Medical Home » ainsi que la distinction « malade »/« non malade ».

Les données des tableaux en annexes sont accompagnées des intervalles de confiance calculés sur la base d'un seuil de risque établi à 5%. Ces intervalles de confiance permettent d'identifier des évolutions dans le temps ou des différences entre les pays et de manière plus générale, d'évaluer la solidité des résultats. Ils décrivent la zone au sein de laquelle se situerait le résultat dans 95% des cas si l'enquête était réitérée. Dans le cadre de ce dossier, les intervalles de confiance sont utilisés afin de voir si les différences (entre catégories de répondants ou dans le temps) sont statistiquement significatives ou si elles risquent d'être le fruit du hasard : une différence de pourcentage est dite significative si les intervalles de confiance ne se recoupent pas.

Par exemple, en Suisse, en 2017, 90,9% (intervalles de confiance inférieur de 89,5% et supérieur de 92,4%, cf. Tableau 6.47) des répondants ont déclaré que leur médecin habituel expliquait toujours ou souvent les choses de façon compréhensible. En 2014, cette part était de 95,4% (93,9% et 97,0%, cf. Tableau 6.48). Comme les intervalles de confiance ne se recoupent pas, la baisse observée est considérée comme significative. Il est particulièrement important d'observer les intervalles de confiance

lorsque l'échantillon est de petite taille. Par exemple, en Suisse, l'écart couvert par les intervalles de confiance peut atteindre plus de neuf points de pourcentage pour les questions concernant un séjour à l'hôpital.

2.3.1 Catégories « Medical Home » et « Malade »

Afin de permettre une analyse plus fine des résultats pour la Suisse, six classes de répondants ont été construites : Avec Medical Home/Sans Medical Home ; Malade/Non malade et Malade avec Medical Home/Malade sans Medical Home. Il s'agit ici d'apprécier l'effet d'une prise en charge médicale complète dans le domaine des soins de premier recours sur les autres aspects du rapport au système de santé, de saisir l'expérience spécifique des personnes les plus atteintes dans leur santé et de voir de quelle façon ces deux facteurs se combinent. Ces résultats sont présentés dans les tableaux en annexes.

Tel que mobilisé dans le cadre de cette étude, le concept de Medical Home désigne les répondants disposant d'un médecin de premier recours accessible et fournissant un soutien à la coordination des soins. Cette catégorisation n'est appliquée qu'aux personnes ayant consulté plusieurs médecins différents. Plus précisément, les critères retenus sont les suivants : « dispose d'un médecin ou d'un lieu de soins régulier (oui) », « obtient un rendez-vous (le jour-même ou le lendemain) » ou « reçoit une réponse du médecin le jour même (toujours ou souvent) », « le médecin connaît le passé médical (toujours ou souvent) » et « le médecin coordonne les soins (toujours ou souvent) ». En 2017, 75,4% des répondants pour la Suisse ayant consulté au moins deux médecins différents sont considérés comme « Avec Medical Home » les 24,6% restant entrant dans la catégorie « Sans Medical Home ».

Quant à la catégorie « Malade », elle comprend les personnes auxquelles au moins une maladie chronique a été diagnostiquée et prenant de façon régulière au moins quatre médicaments sur ordonnance. Sur la base de ces deux critères, 28,8% de l'ensemble des répondants (indépendamment du nombre de médecins consultés) pour la Suisse sont considérés comme « Malades » et 71,2% comme « Non malades ».

Pour les catégories « Malade avec Medical Home » et « Malade sans Medical Home », seuls les répondants catégorisés comme « Malades » et ayant consulté plusieurs médecins différents sont retenus. La première classe comprend 78,1% de ces répondants et la seconde, 21,9%.

2.4 Analyses cantonales

Bien que les données pour la Suisse aient été pondérées de façon à faire correspondre le poids de chaque canton à son poids réel, il n'est pas pour autant possible de réaliser des analyses au niveau de chaque canton avec les données récoltées. En effet, plusieurs cantons comptent quelques dizaines de répondants. Dans certains cantons ou demi-cantons, on trouve même moins d'une dizaine de répondants. Afin de permettre la conduite d'analyses au niveau cantonal, quatre cantons ont densifié leur échantillon : Zurich (n=332), Vaud, (n=324), Valais (n=321) et Genève (n=1160). Les répondants pour le canton de Genève représentent ainsi plus d'un tiers des participants pour l'ensemble de la Suisse. De plus, le canton de Vaud ayant déjà densifié son échantillon lors de l'enquête menée en 2014, la comparaison temporelle des résultats est rendue possible pour ce canton.


Dans la partie 3.8, les résultats de ces quatre cantons sont présentés de façon distincte. Afin de mettre en évidence les particularités de ces cantons, quatre tableaux ont été préparés (Tableau 3.3, Tableau 3.4, Tableau 3.5 et Tableau 3.6). Les données sont indiquées pour chaque canton, pour la Suisse à l'exclusion du canton considéré ainsi que pour la région linguistique correspondante. Ces tableaux comprennent les résultats où les données du canton diffèrent de façon significative de celles du reste de la Suisse. Sont également présentés les résultats cantonaux, lorsque ceux-ci diffèrent sensiblement de la moyenne suisse ou de celle de la région linguistique mais pas de façon significative, possiblement en raison de la petite taille de l'échantillon. Comme l'échantillon pour le canton de Genève est nettement plus grand que celui des autres cantons, seules les différences de résultat significatives sont présentées.

3 Résultats

3.1 État de santé

L'état de santé d'une personne peut être appréhendé dans ses dimensions physiques et psychiques, et peut être décrit de façon objective ou subjective. La Figure 3.1 représente ensemble quatre indicateurs se rapportant à ces différentes dimensions avec, pour chaque pays, la part de répondants décrivant leur état de santé comme passable ou mauvais (CH=20,7%), le pourcentage de répondants avec au moins deux maladies chroniques actuelles (CH=44,1%), la part ayant éprouvé un sentiment de détresse émotionnelle (CH=15,7%) et pour les seuls répondants âgés d'au moins 75 ans, le pourcentage considérant avoir un risque de chute élevé (CH=7,3%). De manière générale, la Suisse figure plutôt parmi les pays où ces troubles sont moins souvent mentionnés par les répondants. Ces différents résultats sont discutés plus en détail dans la suite de ce chapitre.

Figure 3.1 État de santé, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017




Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Exemple de lecture : En Suisse, 20,7% des répondants considèrent leur état de santé comme passable ou mauvais, 44,1% mentionnent au moins deux maladies chroniques au moment de l'enquête, 15,7% font part d'une détresse émotionnelle qu'ils trouvent difficile à gérer eux-mêmes et 7,3% des répondants âgés de 75 ans et plus considèrent comme élevée leur probabilité de tomber.

3.1.1 État de santé auto-évalué

Près de la moitié des répondants pour la Suisse décrivent leur état de santé comme bon (47,3%, cf. Figure 3.2). Par rapport aux autres pays participants, ce choix de réponse moyen a été privilégié aux qualificatifs plus tranchés, que ce soit positifs (excellent ou très bon : 31,9%) ou négatifs (passable ou mauvais : 20,7%). Entre 2014 et 2017, ces résultats sont restés stables dans l'ensemble des pays, à l'exception de la France où la part de répondants considérant leur état de santé comme très bon ou excellent a nettement augmenté (de 11,3% en 2014 à 23,0% en 2017, cf. Tableau 6.121 et Tableau 6.122).


Figure 3.2 Santé auto-évaluée, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

©Obsan 2017

NSP/NR : Ne sait pas/Non réponse

Outre un net effet de l'âge dans la manière d'apprécier sa santé, cet indicateur est également un marqueur d'inégalités sociales : les personnes les mieux formées, celles dont le revenu est supérieur au seuil de pauvreté ainsi que celles nées en Suisse présentent des résultats plus favorables (Figure 3.3). On observe également tant l'impact des affections physiques que de l'état psychique, la part de répondants déclarant un état de santé excellent étant non seulement liée au nombre de maladies chroniques, mais également au sentiment d'isolement.

Figure 3.3 Santé auto-évaluée, personnes de 65 ans et plus, Suisse, 2017


Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

3.1.2 Prévalence des maladies chroniques

Pour comparer les résultats de 2017 avec ceux de 2014, sept maladies chroniques ont été retenues¹. Les résultats pour la Suisse sont assez stables avec 32,0% de répondants souffrant d'une maladie chronique et 47,2%, d'au moins deux maladies chroniques (33,2% et 45,1% en 2014), situant la Suisse parmi les pays affichant les valeurs les plus basses (Figure 3.4 et Tableau 6.186). Pour chaque maladie prise individuellement, la Suisse se situe d'ailleurs en milieu ou en bas de classement international (Tableau 6.161 et Tableau 6.181). Pour ce qui concerne l'asthme et les maladies pulmonaires chroniques, la prévalence pour la Suisse est même significativement plus basse que dans tous les autres pays sauf la Nouvelle-Zélande où la différence n'est pas significative.

Figure 3.4 Nombre de maladies chroniques diagnostiquées, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

©Obsan 2017

Note : Contrairement aux données de la Figure 3.1, les répondants se déclarant comme n'étant plus en traitement pour leur maladie chronique sont ici inclus.

Le Tableau 3.1 indique la prévalence de chaque maladie prise individuellement, telle que rapportée par les répondants pour la Suisse. Figurent également les cas d'attaque cérébrale ou AVC (non inclus en 2014) et les problèmes neurologiques comme la démence ou la maladie d'Alzheimer (résultat disponible uniquement pour la Suisse). Pour chaque problème de santé, les personnes ayant indiqué ne plus être en traitement ont été exclues. Pour l'hypertension et les maladies cardiaques, on observe une nette augmentation de la fréquence à mesure que l'âge augmente. Pour d'autres types de problèmes de santé, les différences de résultats au sein des répondants pour la Suisse reflètent plutôt des inégalités sociales. Par exemple, 8,6% des répondants avec une formation de degré tertiaire se sont vus diagnostiquer du diabète. Pour les répondants avec un niveau de scolarité obligatoire, cette part passe à 18,0%.

¹ Les sept maladies chroniques retenues sont l'hypertension/haute pression sanguine, une maladie cardiaque (y c. crise cardiaque), le diabète, l'asthme ou une maladie pulmonaire chronique, la dépression/l'anxiété/d'autres problèmes psychiques, le cancer et les douleurs articulaires/arthritis. A des fins de comparaison temporelle, sont également inclus en 2017 les répondants auxquels une(des) maladie(s) chronique(s) a/ont été diagnostiquée(s) mais qui ne sont plus en traitement.

Tableau 3.1 Maladies chroniques actuelles, personnes de 65 ans et plus, Suisse, 2017

| | | Hypertension | Douleurs articulaires, arthrite | Maladie cardiaque | Diabète | Cancer |
|-------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Total | | 45,5 | 37,8 | 18,3 | 12,4 | 10,0 |
| Homme | | 44,9 | 31,4 | 24,3 | 14,8 | 12,2 |
| Femme | | 46,1 | 43,0 | 13,4 | 10,4 | 8,1 |
| Classe d'âge | 65–69 ans | 39,1 | 34,8 | 14,9 | 12,8 | 10,2 |
| | 70–74 ans | 43,3 | 33,8 | 15,6 | 10,5 | 12,0 |
| | 75–79 ans | 48,9 | 42,1 | 17,5 | 13,9 | 9,3 |
| | 80+ ans | 52,3 | 41,7 | 25,4 | 12,5 | 8,2 |
| Formation | Scolarité oblig. | 54,1 | 44,1 | 18,0 | 18,0 | 9,2 |
| | Secondaire II | 44,0 | 36,5 | 18,5 | 10,8 | 10,5 |
| | Tertiaire | 37,6 | 32,0 | 17,8 | 8,6 | 8,9 |
| Revenu | > Seuil de pauvreté | 46,2 | 35,8 | 18,6 | 12,1 | 10,0 |
| | < Seuil de pauvreté | 43,8 | 43,8 | 17,3 | 13,2 | 9,8 |
| Pays de naissance | Né en Suisse | 44,2 | 35,8 | 18,3 | 12,1 | 10,4 |
| | Né à l'étranger | 50,7 | 45,4 | 18,0 | 13,3 | 8,5 |

| | | Dépression, anxiété | Maladie pulmonaire chronique | Attaque cérébrale, AVC | Problèmes neurologiques |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Total | | 9,1 | 8,5 | 5,4 | 1,8 |
| Homme | | 6,3 | 8,3 | 7,6 | 1,7 |
| Femme | | 11,3 | 8,7 | 3,6 | 2,0 |
| Classe d'âge | 65–69 ans | 11,7 | 7,1 | 3,7 | 0,8 |
| | 70–74 ans | 8,0 | 9,8 | 5,0 | 1,5 |
| | 75–79 ans | 7,8 | 8,9 | 6,3 | 0,4 |
| | 80+ ans | 8,2 | 8,4 | 7,0 | 4,6 |
| Formation | Scolarité oblig. | 11,9 | 10,3 | 5,3 | 2,1 |
| | Secondaire II | 8,7 | 8,0 | 5,5 | 1,8 |
| | Tertiaire | 6,2 | 8,0 | 4,3 | 1,5 |
| Revenu | > Seuil de pauvreté | 8,3 | 8,2 | 5,6 | 1,7 |
| | < Seuil de pauvreté | 11,3 | 9,5 | 4,8 | 2,3 |
| Pays de naissance | Né en Suisse | 9,0 | 8,0 | 5,2 | 1,9 |
| | Né à l'étranger | 9,7 | 10,2 | 6,2 | 1,8 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017


© Obsan 2017

3.1.3 Risques de chute

Chez les personnes âgées, les chutes peuvent avoir des implications importantes, que ce soit par rapport aux conséquences traumatiques et psychomotrices ou au risque d'institutionnalisation précoce que celles-ci peuvent engendrer, mais aussi en raison de leur impact psychologique sur la personne ayant chuté. En Suisse, les répondants âgés de 75 à 79 ans ne sont que 2,5% à indiquer une probabilité de tomber élevée alors que ce pourcentage s'élève à 11,4% chez les 80 ans et plus (Figure 3.5). A l'instar de pays comme la France ou l'Australie, les répondants pour la Suisse seraient donc relativement confiants jusqu'à un âge avancé quant à leurs facultés motrices.


Il y a toutefois lieu d'examiner ces résultats par région linguistique (Figure 3.6). Pour les personnes âgées de 80 et plus, un risque élevé de chute serait deux fois plus souvent mentionné par les romands (19,2%) que par les alémaniques (9,2%). Cet écart peut notamment être le reflet des différents modes de prise en charge de la population âgée dans les cantons de Suisse (le recours à l'EMS se ferait plus tôt en Suisse alémanique ; les répondants alémaniques restés à leur domicile seraient alors en meilleure santé que les répondants romands plus souvent pris en charge par des services d'aide et de soins à domicile). Il est aussi possible que les personnes qui mentionnent un risque de chute élevé aient été sensibilisées à cette thématique dans le cadre de campagnes de prévention menées au niveau cantonal.

Figure 3.5 Risque de chute élevé, personnes âgées de 75 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

Figure 3.6 Risque de chute élevé, personnes âgées de 75 ans et plus, Suisse, 2017



© Obsan 2017

3.1.4 Santé psychique

L'IHP17 dispose de plusieurs indicateurs évaluant la santé psychique des personnes âgées. Formellement, près d'un dixième des répondants pour la Suisse (9,1%) se sont vus diagnostiquer un problème psychique de type dépression ou anxiété (Tableau 3.1). Parallèlement, 15,2% des répondants en Suisse déclarent se sentir, parfois ou souvent, isolés des autres et 15,7% font part d'une détresse émotionnelle difficile à gérer eux-mêmes (Figure 3.8 et Figure 3.9). Dans l'ensemble, 28,5% des répondants pour la Suisse mentionnent au moins l'un de ces trois mal-être (Figure 3.7). La moitié des pays participants se situent dans cette fourchette inférieure allant de 25,7% (Suède) à 28,9% (Pays-Bas). Les valeurs maximales sont observées en Australie (41,0%) et en France (40,1%).

Pour le sentiment d'isolement comme pour celui de détresse émotionnelle, il apparaît que les femmes sont plus souvent affectées que les hommes. On observe également un lien avec la classe d'âge, particulièrement visible pour ce qui concerne le sentiment d'isolement : 14,4% des 65 à 69 ans éprouvent ce sentiment ; cette part baisse à 9,6% chez les 70 à 74 ans puis elle remonte pour atteindre 22,1% chez les 80 ans et plus. Pour le sentiment d'isolement comme pour celui de détresse émotionnelle, des inégalités sociales apparaissent également en lien avec les niveaux de formation et de revenu.

Les résultats varient encore selon les régions linguistiques mais pas de façon similaire pour chacun des indicateurs de santé psychique. Ainsi, le sentiment d'isolement est plus fréquemment mentionné en Suisse romande et en Suisse italienne qu'en Suisse alémanique alors que le sentiment de détresse émotionnelle est plus souvent mentionné en Suisse romande qu'en Suisse italienne. Ces variations de l'état de santé psychique selon la région linguistique ont déjà été repérées dans des études précédentes (Schuler et al., 2016) mais les motifs de ces différences ne sont pas clairement identifiés. Il est possible qu'il s'agisse effectivement d'une différence culturelle dans la façon d'appréhender la santé mentale. Comme pour les risques de chute, il est également possible que la différence tienne au degré de sensibilisation des répondants quant aux questions de bien-être mental.

Figure 3.7 Dépression, sentiment d'isolement ou détresse émotionnelle, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017




Figure 3.8 Sentiment d'isolement (parfois/souvent), personnes de 65 ans et plus, Suisse, 2017




Figure 3.9 Détresse émotionnelle ressentie au cours des deux années précédentes, personnes de 65 ans et plus, Suisse, 2017





Figure 3.10 Aide reçue par les personnes de 65 ans et plus en détresse émotionnelle, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017


Se pose ensuite la question de la prise en charge des personnes avec troubles psychiques (Figure 3.10). Aux répondants s'étant déclarés confrontés à une forme de détresse émotionnelle, il a été demandé si ceux-ci avaient eu la possibilité d'obtenir une aide professionnelle. La Suisse fait ici partie des pays où il est le moins fréquent qu'une aide professionnelle ait été fournie (36,8%), sans que des obstacles financiers ne semblent être la cause des difficultés d'accès (mentionnés par 6,8% de ces répondants). Il s'avère en fait que les répondants pour la Suisse ne sont pas nécessairement à la recherche d'une aide professionnelle, 55,9% ayant déclaré ne pas avoir désiré un tel soutien.

3.2 Conditions de vie matérielles

La santé est étroitement liée aux conditions de vie. L'IHP17 comprend plusieurs indicateurs renseignant les difficultés matérielles rencontrées par les répondants ainsi que les entraves financières dans l'accès aux soins. Le renoncement à des soins de santé pour des raisons de coûts, la difficulté à payer des factures médicales et l'inquiétude concernant des aspects matériels du quotidien sont les trois dimensions retenues pour comparer les pays sur ce thème (Figure 3.11). Il apparaît ici que la Suisse figure parmi les pays où des difficultés matérielles et financières sont le plus souvent susceptibles d'impacter l'accès aux soins de santé des répondants. Ces indicateurs sont présentés plus en détail dans la suite de ce chapitre.

Par ailleurs, la Suisse est également le pays où les dépenses médicales des ménages dépassent le plus souvent l'équivalent de 1'000 dollars US (50,4%). Sur ce point, la comparabilité des pays est cependant limitée car ces dépenses sont en partie le reflet du pouvoir d'achat.

Figure 3.11 Difficultés matérielles et d'accès aux soins, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Exemple de lecture : En Suisse, 13,2% des répondants déclarent renoncer à des soins pour des raisons de coûts, 4,3% rapportent des difficultés à payer leurs factures médicales et 8,0% rencontrent toujours ou généralement au moins un type de difficultés matérielles. De plus, 50,4% des répondants pour la Suisse ont dépensé au cours des douze derniers mois l'équivalent d'au moins 1'000 USD en dépenses médicales non couvertes.

3.2.1 Renoncement aux soins

En 2017, parmi les répondants pour la Suisse, 6,6% ont renoncé à consulter un médecin pour un problème médical (Figure 3.12), 5,3%, à effectuer un test médical, un traitement ou un examen de contrôle recommandé par un médecin (Figure 3.13) et 4,6%, à retirer un médicament sur ordonnance ou à en prendre des doses (Figure 3.14), à chaque fois pour des raisons de coûts. Si les parts de personnes concernées restent plutôt modestes, une hausse du renoncement s'observe tout de même par rapport à 2014, avec des changements significatifs pour ce qui concerne les consultations chez le médecin et l'achat de médicaments (respectivement 2,1% et 2,2% en 2014). Dans l'ensemble, la part de répondants ayant renoncé à au moins l'une de ces prestations de santé est passée de 6,3% à 13,2% (Figure 3.15, différence significative).

Il est possible que la hausse de la part de répondants pour la Suisse déclarant avoir renoncé à des soins soit en partie liée au changement de mode d'administration de l'enquête avec le passage de l'enquête téléphonique en 2014 à une enquête principalement en ligne en 2017. Pour un thème sensible tel que le renoncement aux soins, on peut en effet envisager que le biais de désirabilité sociale soit moins prononcé avec une enquête en ligne. Si un tel effet s'est effectivement manifesté, c'est toutefois la hausse observée depuis 2014 qui serait en partie artificielle, sans remettre en cause les résultats obtenus en 2017.

Au sein des répondants pour la Suisse, on peut relever que la part ayant renoncé à un type de prestation ne varie pas significativement en fonction du revenu, du niveau de formation ou de la région linguistique (Tableau 6.19). Par contre, les

répondants âgés de moins de 75 ans mentionnent plus souvent avoir renoncé à des soins que ceux âgés de 75 ans et plus (16,4% vs 9,6%, données non représentées).

Figure 3.12 Renoncement à une consultation pour des raisons de coûts, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2014 et 2017




Figure 3.13 Renoncement à un test/examen/traitement pour des raisons de coûts, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2014 et 2017




Figure 3.14 Renoncement à des médicaments pour des raisons de coûts, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2014 et 2017






Figure 3.15 Au moins un type de renoncement (consultation/test/médicament) pour des raisons de coûts, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2014 et 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014/2017


© Obsan 2017

Figure 3.16 Renoncement à une consultation chez le dentiste pour des raisons de coûts, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

Figure 3.17 Renoncement à des soins de santé pour des raisons de coûts, personnes de 65 ans et plus, Suisse, 2017



© Obsan 2017

Le renoncement aux consultations chez le dentiste est abordé de façon séparée car en Suisse, celles-ci ne sont pas prises en charge par l'assurance obligatoire des soins. En Suisse, 12,7% des répondants déclarent avoir renoncé à consulter un dentiste en raison du coût, un résultat intermédiaire entre ceux de l'Australie (23,0%) et des Pays-Bas (4,3%, cf. Figure 3.16). Les différences entre les pays peuvent en partie refléter des conditions de remboursement différentes.

De plus, les données sur le renoncement aux soins dentaires en Suisse donnent à voir des inégalités sociales qui ne transparaissent pas aussi clairement avec le renoncement aux autres types de prestation de santé. La part de répondants renonçant à des soins dentaires passe ainsi du simple au double, selon que ceux-ci ont un revenu supérieur (9,8%) ou inférieur (20,8%) au seuil de pauvreté ou selon qu'ils sont nés en Suisse (10,5%) ou à l'étranger (21,0%, cf. Figure 3.17). La Suisse romande est également presque deux fois plus souvent concernée (19,8%) que la Suisse italienne (12,3%) ou que la Suisse alémanique (10,2%).

3.2.2 Difficultés à payer des factures médicales

Dans l'ensemble des pays participants, la part de répondants ayant eu des difficultés ou n'ayant pas pu payer leurs factures médicales plafonne à 5%, l'Australie (13,0%) et les États-Unis (9,9%) faisant exception. En Suisse, cette part s'élève à 4,3% (Figure 3.18). Les tendances observées sont les mêmes que pour le renoncement aux soins avec, d'une part, une hausse de la part de répondants rapportant de telles difficultés depuis 2014 (de 2,3% à 4,3% en 2017, différence significative) et, d'autre part, des inégalités en fonction du niveau de revenu, du pays de naissance et de la région linguistique (Tableau 6.241).

On peut encore ajouter qu'en Suisse, parmi les répondants ayant renoncé à au moins un type de prestations (consultation/test/médicament), une moindre part déclare avoir eu des difficultés pour régler leurs factures médicales, alors que la majorité ne mentionne pas ce type de problème. Sur l'ensemble des répondants pour la Suisse, 2,1% mentionnent donc simultanément avoir renoncé à des soins de santé et éprouvé des difficultés à payer des factures médicales (Figure 3.19). En Australie où la part de renoncement aux soins (13,7%) est proche de celle de la Suisse (13,2%), cette part atteint 6,6%.

Sur le thème du renoncement aux soins, la question se pose souvent de savoir à quels types de soins les répondants ont renoncé et s'il s'agissait bien de soins nécessaires. Il est possible que ce recoupement de réponses permette de cibler un peu plus précisément les répondants les plus vulnérables.

Figure 3.18 Difficultés à régler les factures médicales, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2014 et 2017





Figure 3.19 Renoncement aux soins pour des raisons de coûts selon la présence de difficultés à régler les factures médicales, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014/2017

© Obsan 2017


3.2.3 Motifs d'inquiétude

Les contraintes financières pesant sur les répondants sont encore examinées à travers la fréquence de différents motifs d'inquiétude. En Suisse, 5,4% des répondants déclarent s'inquiéter toujours ou souvent pour le paiement du loyer ou de l'hypothèque, 5,2% répondent de la même manière concernant le fait d'avoir suffisamment d'argent pour payer d'autres factures mensuelles (p. ex. électricité, chauffage, téléphone) et 4,8% pour l'achat d'aliments sains (Figure 3.20). Globalement, 8,0% des répondants pour la Suisse sont concernés par au moins l'un de ces motifs d'inquiétude (Figure 3.21).

On peut ajouter qu'en intégrant la modalité de réponse « parfois », ces pourcentages atteignent pour la Suisse 15,1% (loyer), 13,5% (autres factures) et 12,2% (aliments sains), avec 19,4% des répondants concernés par au moins l'une de ces problématiques (données non représentées).

Ces difficultés touchent 15,0% des répondants dont le revenu se situe en dessous du seuil de pauvreté mais elles concernent également 5,6% des répondants dont le revenu se situe en dessus du seuil de pauvreté (Tableau 6.243). L'inégalité en lien avec le pays de naissance apparaît également (6,5% des personnes nées en Suisse contre 13,5% de celles nées à l'étranger). De plus, une disparité se montre à nouveau selon la région linguistique avec 12,1% des romands et 13,7% des italophones ayant, toujours ou généralement, des soucis en lien avec le paiement du loyer, de factures ou de nourriture saine, contre 6,1% des germanophones. Ces différences sont toutes significatives.

Figure 3.20 Motifs de soucis au cours des douze derniers mois (toujours, généralement), personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Exemple de lecture : En Suisse, 4,8% des répondants mentionnent les fréquences « toujours » ou « généralement » concernant le fait de s'inquiéter pour l'achat d'aliments sains, 5,4% se font toujours ou généralement du soucis pour le paiement du loyer ou de l'hypothèque et 5,2% mentionnent ces fréquences d'inquiétude concernant le fait d'avoir suffisamment d'argent pour payer d'autres factures mensuelles (p. ex électricité, téléphone).

3.3 Soins de premier recours

Dans tous les pays participants, la quasi-totalité des répondants dispose d'un lieu de traitement régulier. Le plus souvent, il s'agit d'un médecin spécifique. En Suède et au Royaume-Uni, il est par contre plus fréquent que les répondants disposent d'un lieu de traitement régulier, sans être rattachés à un médecin particulier (respectivement 37,8% et 14,5%). En Suisse, 96,8% des répondants disposent d'un médecin habituel et 0,8% d'un lieu de traitement habituel. Ces pourcentages sont restés stable depuis 2014 (97,0% et 0,8%) et ne varient guère au sein de la population de répondants.

Afin de comparer les pays entre eux quant à la prise en charge par le médecin de premier recours, douze indicateurs ont été utilisés : trois en lien avec l'accessibilité du médecin habituel², quatre concernant le déroulement de la consultation³, un ayant trait à l'aide fournie pour la coordination des soins entre plusieurs prestataires de santé⁴ et quatre concernant les activités de prévention⁵ (Figure 3.21). À des fins de comparaison, ces douze indicateurs ont été convertis en indices centrés autour des résultats pour la Suisse (CH=100).


La Suisse occupe une position intermédiaire pour ce qui concerne l'accès au médecin ainsi que le déroulement de la consultation. En comparaison avec les autres pays, la Suisse obtient plutôt de bons résultats en matière d'aide à la coordination et de moins bons résultats pour ce qui concerne les activités de prévention.

² Moyenne des indicateurs présentés au Tableau 6.5.

³ Moyenne des indicateurs présentés au Tableau 6.6.

⁴ Moyenne des indicateurs présentés au Tableau 6.8.

⁵ Moyenne des indicateurs présentés au Tableau 6.7.

Figure 3.21 Rapport au médecin de premier recours (CH 2017=100), comparaison internationale, 2017

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Exemple de lecture : Pour chacun des douze indicateurs utilisés, un indice a été créé où la Suisse sert de valeur de référence (CH=100). Un indice moyen a alors été calculé pour l'accès au médecin (trois indicateurs), pour le déroulement de la consultation (quatre indicateurs), pour l'aide à la coordination (un indicateur) et pour les activités de prévention (quatre indicateurs).

Résultat > 100 : Meilleur résultat que pour la Suisse.

Résultat < 100 : Moins bon résultat que pour la Suisse.

3.3.1 Accès et déroulement de la consultation

Si en Suisse, les répondants disposent presque tous d'un médecin habituel, celui-ci tend toutefois à devenir moins rapidement accessible. Alors qu'en 2014, 63,9% des répondants parvenaient à obtenir un rendez-vous chez leur médecin le jour même ou le lendemain, ce pourcentage n'est plus que de 46,5% en 2017 (Figure 3.22). Comme plusieurs autres pays enregistrent également un important recul de la disponibilité des médecins, la Suisse maintient sa position en milieu de classement international.

Cette baisse de la part de répondants obtenant un rendez-vous chez leur médecin dans un délai court est particulièrement rapide en Suisse alémanique (de 69,5% à 50,1% des répondants entre 2014 et 2017, cf. Tableau 6.25 et Tableau 6.26). Comme en 2014, l'accessibilité reste toutefois moins bonne pour les répondants romands en 2017 : 35,2% obtiennent un rendez-vous le jour même ou le lendemain (36,5% dans les deux à cinq jours et 17,9% dans un délai supérieur). Par ailleurs, 42,7% des répondants pour la Suisse considèrent comme très ou assez facile de recevoir des soins médicaux en dehors des horaires d'ouverture classiques des cabinets, ce qui est plutôt bas en comparaison avec les autres pays (Figure 3.23).

Figure 3.22 Personnes de 65 ans et plus obtenant un rendez-vous chez le médecin le jour même/le lendemain, comparaison internationale, 2014 et 2017




Figure 3.23 Très/assez facile de recevoir des soins médicaux le soir, le week-end ou les jours fériés, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017




Figure 3.24 Personnes de 65 ans et plus recevant toujours/souvent une réponse le jour même lorsque contacte son médecin pour un problème médical, comparaison internationale, 2014 et 2017





Figure 3.25 Déroulement de la consultation chez le médecin de premier recours (toujours ou souvent), personnes de 65 ans et plus, Suisse, 2014 et 2017



1. Explique les choses clairement
2. Connaît les informations importantes du passé médical
3. Passe assez de temps avec le patient
4. Patient impliqué dans les décisions
5. Patient encouragé à poser des questions

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014/2017

© Obsan 2017

Malgré les difficultés croissantes à obtenir une rencontre physique dans un délai court, les répondants pour la Suisse peuvent apprécier une bonne réactivité de leur médecin lorsque celui-ci est contacté pour un problème médical : en 2017 comme en 2014, plus de 90% des répondants pour la Suisse déclarent recevoir toujours ou souvent une réponse le jour-même (respectivement 93,1% et 91,1%, cf. Figure 3.24). Il s'agit du résultat le plus élevé de la comparaison internationale.


Globalement, les répondants pour la Suisse décrivent de façon plutôt positive le déroulement de leur consultation chez le médecin. Environ 90% considèrent que celui-ci explique les choses clairement, qu'il connaît les informations importantes du passé médical, et qu'il passe suffisamment de temps avec le patient (respectivement 90,9%, 89,3% et 88,5% attribuent les fréquences toujours ou souvent à ces comportements, cf. Figure 3.25). Les résultats sont un peu moins favorables pour ce qui a trait à la participation des patients : 84,4% se sentent impliqués dans les décisions et 63,6% encouragés à poser des questions (toujours ou souvent).

Bien que les résultats de 2017 soient assez proches de ceux de 2014, ces indicateurs tendent tout de même à se détériorer. Le changement est même significatif pour ce qui concerne le temps passé avec le patient ou la clarté des explications (respectivement -4,0 et -5,5 points de pourcentage).

Alors que dans les années à venir, la question de l'accès à un médecin de premier recours est amenée à se poser de façon particulièrement accrue, l'une des pistes avancées afin de répondre aux besoins de soins serait de substituer, pour certains traitements médicaux de base, le médecin par un autre professionnel spécialisé de la santé. En Suisse, 60,5% des répondants déclarent pouvoir effectivement s'imaginer recevoir la suite d'un traitement par un autre professionnel de la santé que le médecin (Figure 3.26). Ce pourcentage était déjà de 59,9% en 2014. Une marge de manœuvre semble donc se confirmer quant à une possible substitution du médecin par d'autres prestataires pour certains soins de santé.

L'attitude des répondants n'est toutefois pas homogène face à cette éventualité : les mieux formés, les plus aisés, les personnes nées en Suisse et celles qui ne sont pas malades se montrent les plus ouverts à une telle idée. Il est possible que l'attitude plus conservatrice des répondants moins formés, plus démunis financièrement, nés à l'étranger et malades reflète la crainte qu'une telle substitution n'entraîne une baisse de la qualité des soins. De plus, cette possibilité semble acceptable aux deux tiers des répondants alémaniques (66,6%) alors qu'elle ne conviendrait qu'à 35,8% des italophones (différence significative). Relevons également que les répondants romands sont moins ouverts que les alémaniques à cette possibilité (48,3%) alors que ceux-ci rendent compte de délais d'attente plus longs pour leurs rendez-vous chez le médecin.

Figure 3.26 Personnes de 65 ans et plus qui pourraient imaginer recevoir la suite du traitement par un professionnel spécialisé de la santé autre qu'un médecin, Suisse, 2014 et 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014/2017

© Obsan 2017

On peut ici ajouter qu'en Suisse, seuls 8,3% des répondants ayant une maladie chronique sont un contact avec un professionnel de la santé qui prend des nouvelles entre les visites chez le médecin (Tableau 6.197). Ce pourcentage est le plus bas de la comparaison internationale. Il atteint par exemple 29,1% aux États-Unis. On pourrait envisager que des contacts plus réguliers avec des professionnels de la santé autres que le médecin habituel puissent favoriser l'acceptation de l'idée d'une substitution des prestataires de soins.

3.3.2 Medical Home

Afin de caractériser les répondants bénéficiant d'une prise en charge médicale complète, une variable « Medical Home » a été créée (cf. 2.3.1). Le concept de « Patient-centered Medical Home » vient des États-Unis. Il s'agit d'un modèle d'organisation des soins qui promeut des soins de santé globaux, coordonnés, accessibles, centrés autour du patient, avec des objectifs de qualité et de sécurité. De plus, ce modèle prévoit généralement des incitations à travers les modalités de financement des soins. Dans le contexte de cette étude, le concept de Medical Home est limité aux aspects d'accessibilité et de coordination. Seuls les répondants ayant consulté plus d'un médecin au cours des douze derniers mois ont été retenus.

Si l'on considère séparément les critères composant une prise en charge dite complète, on observe que trois sont restés assez stables entre 2014 et 2017 (dispose d'un lieu de soins régulier, reçoit une réponse du médecin le jour-même et le médecin connaît l'historique médical du patient, cf. Tableau 3.2). S'il est devenu nettement moins fréquent que les répondants parviennent à obtenir un rendez-vous le jour même ou le lendemain (de 62,4% en 2014 à 45,2% en 2017), ceux-ci déclarent plus souvent que leur médecin les aide à coordonner les soins reçus par d'autres médecins (de 78,7% à 85,3%). Globalement, parmi les répondants recevant des soins de plusieurs médecins, environ trois sur quatre se trouvent au bénéfice d'une prise en charge médicale complète (Medical Home). Cette part est ainsi restée stable par rapport à 2014.

Tableau 3.2 Prise en charge médicale des personnes de 65 ans et plus ayant consulté plus d'un médecin au cours des douze derniers mois, Suisse, 2014 et 2017


| | 2014 | 2017 |
|---|--------------|--------------|
| 1. Lieu de soins régulier | 98.3% | 97.8% |
| 2. ET accès (a. ou b.) | 97.0% | 93.6% |
| a. Obtient un rendez-vous le jour-même ou le lendemain | 62.4% | 45.2% |
| b. Reçoit une réponse du médecin le jour même | 93.1% | 89.7% |
| 3. ET connaît le passé médical | 89.7% | 92.2% |
| 4. ET coordonne les soins | 78.7% | 85.3% |
| Prise en charge médicale complète (Medical Home) | 73.2% | 75.4% |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014/2017

© Obsan 2017

Concernant les besoins d'aide en matière de coordination pour les personnes consultant plusieurs médecins différents, la grande majorité des répondants pour la Suisse sont soutenus dans ce domaine par leur médecin habituel (85,3%), 11,8% n'ont pas reçu d'aide mais n'en ressentent pas le besoin et seuls 2,3% expriment un besoin insatisfait d'aide à la coordination (Figure 3.27). En comparaison avec les autres pays sous étude, la Suisse apparaît donc comme un pays où il est relativement peu fréquent qu'il soit fait état de lacunes quant au soutien à la coordination des soins des personnes âgées de 65 ans et plus qui consultent plusieurs médecins.

Figure 3.27 Aide à la coordination pour les personnes de 65 ans et plus ayant consulté plus d'un médecin au cours des douze derniers mois, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017


3.3.3 Gestion des maladies chroniques

Parmi les répondants pour la Suisse, huit sur dix sont atteints d'au moins une maladie chronique (79,2%). Un renforcement des compétences des patients dans la gestion de leur maladie comporte de nombreux avantages : en gagnant en expertise et en autonomie, ceux-ci sollicitent les soignants de façon plus ciblée et établissent également plus clairement le lien entre leurs habitudes de vie et les conséquences sur la santé.

On retient trois indicateurs comme témoignant d'une bonne gestion des maladies chroniques : avoir reçu des instructions claires sur les symptômes à surveiller, avoir eu une discussion avec le médecin sur les priorités et principaux objectifs à atteindre et

avoir un plan de traitement pour gérer sa maladie dans sa vie quotidienne. Pour chacun de ces indicateurs, environ la moitié des répondants souffrant d'une ou plusieurs maladie(s) chronique(s) ont répondu par la positive (respectivement 56,0%, 56,3% et 46,1%). Ces résultats, qui semblent stables depuis 2014⁶, placent la Suisse en milieu de classement international (Figure 3.28).

Figure 3.28 Gestion des maladies chroniques chez les personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017


Les répondants se déclarant comme n'étant plus en traitement ont été exclus de l'échantillon.

Exemple de lecture : En Suisse, 56,0% des répondants en traitement ont reçu des instructions claires sur les symptômes à surveiller, 56,3% ont parlé avec leur médecin des priorités et principaux objectifs à atteindre dans la prise en charge de la maladie et 46,1% disposent d'un plan de traitement.

Il est à noter que les répondants avec diabète sont ceux qui suivent de plus près l'évolution de leur maladie. Par exemple, 63,0% disposent d'un plan de traitement. A l'inverse, cette part n'est que de 44,9% pour les répondants avec des douleurs articulaires ou de l'arthrite (données non représentées).

Malgré ces résultats moyens, 57,5% des répondants pour la Suisse se disent confiants et 35,6%, très confiants quant à leur capacité à gérer leurs problèmes de santé (Figure 3.29). En prenant ces deux possibilités de réponses ensemble, la Suisse occupe la première position du classement international. On observe par ailleurs que les personnes avec Medical Home sont 37,7% à se déclarer très confiantes contre 18,6% pour celles sans Medical Home (Tableau 6.210). Cette différence témoigne d'un renforcement des capacités en lien avec une prise en charge médicale complète, malgré l'absence de plans de traitements ou de discussion concernant les objectifs à atteindre dans la gestion de la maladie.

Figure 3.29 Confiance quant à la capacité à gérer ses maladies, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

⁶ En 2017, l'introduction du choix de réponse « n'est plus en traitement pour cette maladie » altère la comparabilité des réponses.

3.3.4 Prévention


En discutant avec leurs patients des comportements ayant une influence sur la santé, les médecins de premier recours peuvent également jouer un rôle important en matière de prévention. En Suisse comme dans les autres pays, le thème le plus fréquemment abordé est celui de l'activité physique. Près de la moitié des répondants discutent ce sujet avec leur médecin (47,0%, cf. Figure 3.30). De plus, environ un tiers des répondants pour la Suisse parlent d'une alimentation saine (31,8%) avec leur médecin.

Dans tous les pays, il est moins fréquent que les aspects de la santé psychique et que la consommation d'alcool soient abordés. En Suisse, 17,7% des répondants déclarent avoir parlé avec un professionnel de la santé des choses qui les inquiètent ou qui les stressent dans la vie et 10,5% ont eu une discussion sur leur consommation d'alcool. Sur ce dernier point, la Suisse se place en dernière position du classement international.

Le médecin habituel peut également procurer un soutien important en accompagnant les patients à prévenir les chutes ou leurs récurrences. On peut rappeler qu'en Suisse, 38,8% des répondants âgés de 75 ans et plus considèrent comme modérée ou élevée leur probabilité de tomber. Parmi eux, 51,1% ont abordé ce sujet avec leur médecin. La taille des échantillons étant ici réduite, ce résultat ne diffère de façon significative que de ceux de la Norvège (31,7%), de la Suède (30,9%) et des Pays-Bas (29,9%).

De manière générale, les aspects de prévention sont plus fréquemment abordés en France et dans les pays anglo-saxons. Dans l'ensemble des pays participants, y compris la Suisse, ces différents résultats sont restés plutôt stables entre 2014 et 2017.

Figure 3.30 Discussions avec un professionnel de la santé au cours des deux années précédentes, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017




Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Exemple de lecture : Au cours des deux années précédentes, 47,0% des répondants pour la Suisse ont abordé au moins une fois avec un professionnel de la santé la question de l'activité physique, 31,8% ont discuté d'une alimentation saine, 17,7% ont eu l'occasion de parler des choses qui les inquiètent ou qui les stressent dans la vie et 10,5% ont discuté de leur consommation d'alcool. De plus, 51,1% des répondants de 75 ans et plus se considérant comme ayant un risque de chute modéré ou élevé ont traité de ce sujet avec un professionnel de la santé.

Figure 3.31 Discussions avec un professionnel de la santé au cours des deux années précédentes, personnes de 65 ans et plus, Suisse, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Exemple de lecture : Au cours des deux années précédentes, 57,3% des répondants pour la Suisse romande ont abordé au moins une fois avec un professionnel de la santé la question de l'activité physique, 46,3% ont discuté d'une alimentation saine, 28,0% ont eu l'occasion de parler des choses qui les inquiètent ou qui les stressent dans la vie et 18,4% ont discuté de leur consommation d'alcool. De plus, 66,0% des répondants de 75 ans et plus se considérant comme ayant un risque de chute modéré ou élevé ont traité de ce sujet avec un professionnel de la santé.

Ces différents sujets sont nettement plus souvent abordés au sein des cabinets de Suisse romande que dans ceux de Suisse italienne, et plus souvent dans les cabinets de Suisse italienne que dans ceux de Suisse alémanique (Figure 3.31). La question de la consommation d'alcool fait exception, étant relativement peu discutée, tant en Suisse italienne qu'en Suisse alémanique.

En Suisse, environ la moitié des fumeurs (11,2% des 65 ans et plus) discute de leur consommation de tabac avec leur médecin (53,7%), un pourcentage stable par rapport à 2014 (53,1%, cf. Tableau 6.215 et Tableau 6.217). En France, où les répondants ont également été interrogés à ce sujet, 74,8% des fumeurs déclarent parler de leur consommation de tabac avec leur médecin.

3.3.5 Recours aux instruments de cybersanté


La numérisation de la santé se manifeste à travers l'émergence de nouveaux comportements en lien avec la santé ou avec le système de santé. Ceux-ci peuvent également avoir un impact sur la relation qu'ont les patients avec leur médecin de premier recours. Sachant que la majorité des répondants pour la Suisse ont choisi de participer à l'enquête au moyen du questionnaire en ligne (64%), il est toutefois possible que ce mode de collecte des données ait introduit un biais susceptible d'augmenter la part d'utilisateurs des instruments de cybersanté.

Avec 43,3% des répondants pour la Suisse ayant déclaré avoir utilisé internet pour s'informer sur des sujets concernant leur santé, la fonction première d'internet en lien avec la santé semble bien être celle de source d'information (Figure 3.32). Cela peut avoir un impact sur le profil des patients qui peuvent se trouver très bien informés mais qui peuvent aussi être induits en erreur par les informations trouvées sur internet.

Internet est également utilisé, mais de façon moins courante, afin d'échanger des informations avec des professionnels de la santé : 13,0% des répondants auraient visionné sur internet ou téléchargé des informations sur leur santé tels que des résultats d'examens et 5,6% auraient déjà envoyé un email à leur médecin pour une question médicale.

De plus, les applications de santé mobiles permettant de collecter des données de santé rencontrent également un certain engouement : 10,9% des répondants ont utilisé une application numérique pour recueillir des informations sur leur santé dans le cadre d'un usage privé et 6,0% ont utilisé une telle application mais avec l'objectif de partager les informations récoltées avec un professionnel de la santé.

Figure 3.32 Utilisation des instruments de cybersanté au cours des deux années précédentes, personnes de 65 ans et plus, Suisse, 2017




Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Comme on peut s’y attendre, ces ressources sont plus souvent utilisées par les personnes âgées de 65 à 74 ans que par celles de 75 ans et plus. Par ailleurs, le niveau de formation apparaît ici comme jouant un rôle essentiel. Par exemple, les répondants avec formation obligatoire ne sont que 22,4% à avoir utilisé internet comme source d’information pour une question de santé et 1,5% à avoir envoyé un email à un médecin pour une question médicale alors que chez les répondants avec une formation de niveau tertiaire, ces pourcentages s’élèvent à respectivement 66,7% et 15,1% (Figure 3.33 et Tableau 6.248). Un tel gradient s’observe pour chacune des questions en lien avec la santé numérique. Des différences quant à la fréquence d’utilisation de ces technologies sont encore observées selon le niveau de revenu, le pays de naissance ou le type de région.

Figure 3.33 Utilisation d’internet par les personnes de 65 ans et plus pour s’informer sur des sujets concernant la santé au cours des deux années précédentes, Suisse, 2017




Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

3.4 Recours aux prestations de santé

Si l'on considère simultanément la fréquence du recours aux médecins, aux services d'urgence ainsi que les hospitalisations, il est possible d'avoir une vue d'ensemble de l'utilisation des services de santé par les personnes âgées de 65 ans et plus (Figure 3.34). De plus, la consommation de médicaments est également prise en compte pour cette synthèse.

Figure 3.34 Recours aux prestations de santé, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Exemple de lecture : En Suisse, 14,7% des répondants ont consulté au moins quatre médecins différents au cours des douze derniers mois. Au cours des deux dernières années, 65,4% ont consulté un médecin spécialiste, 26,2% ont utilisé un service d'urgence et 31,9% se sont fait hospitaliser. De plus, 65,7% des répondants consomment régulièrement au moins deux médicaments sur ordonnance.

De manière générale, le recours aux prestations de santé est le plus intense aux États-Unis et en Allemagne. Dans ces deux pays, environ un quart des répondants ont consulté au moins quatre médecins différents au cours des douze derniers mois. De plus, les répondants pour les États-Unis sont ceux qui consomment le plus souvent au moins deux médicaments et ils recourent fréquemment aux services d'urgence alors que les répondants pour l'Allemagne présentent un résultat particulièrement élevé pour ce qui concerne les hospitalisations. À l'opposé, la France présente pour chacun des indicateurs retenus des taux de recours aux prestations de santé parmi les plus bas.

Pour sa part, la Suisse affiche des taux de recours aux médecins moyens en comparaison internationale. Pour le taux d'hospitalisation, le résultat pour la Suisse est supérieur à la moyenne alors que pour le recours aux services d'urgence, le résultat est inférieur à la moyenne.

3.4.1 Consultation de médecins

Par rapport à 2014, un changement notable apparaît pour la Suisse en 2017 avec la hausse du nombre de médecins consultés par les répondants : alors que la part de personnes n'ayant consulté aucun médecin se maintient autour de 7%, la part de répondants déclarant avoir consulté au moins quatre médecins au cours des douze derniers mois est passée de 8,1% à 14,7% (différence significative, cf. Figure 3.35 et Tableau 6.58). La Suisse est le seul pays où ce pourcentage a augmenté de façon significative. L'Allemagne et l'Australie enregistrent pour leur part une baisse significative de la part de répondants ayant consulté au moins 4 médecins (de 38,4% à 26,3% et de 18,1% à 11,1%).

Avec 23,1% de répondants ayant consulté au moins quatre médecins différents, la Suisse romande présente un taux de recours nettement plus élevé que la Suisse alémanique (11,7%) ou que la Suisse italienne (15,4%, différences significatives, cf. Figure 3.36). C'est d'ailleurs principalement en Suisse romande que le recours à au moins quatre médecins a augmenté puisqu'il

était de 10,6% en 2014 (Tableau 6.60). À l'échelle cantonale, ces particularités régionales pourraient certainement être mises en relation avec les différences en matière de densité médicale.

Figure 3.35 Nombre de médecins consultés au cours des douze derniers mois, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017





Figure 3.36 Recours au médecin, personnes de 65 ans et plus, Suisse, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Pour le recours au médecin spécialiste, les taux sont globalement similaires dans les trois régions linguistiques : environ 65% des répondants ont consulté ou ont eu besoin de consulté un médecin spécialiste au cours des deux dernières années. Par contre, il est plus fréquent en Suisse alémanique que les répondants attendent moins de quatre semaines avant de voir ce dernier (81,2% vs 69,2% en Suisse romande).

Par ailleurs, on peut noter que les répondants ayant un niveau de formation plus élevé consultent moins souvent au moins quatre médecins différents que les personnes au bénéfice de la scolarité obligatoire (29,6% vs 40,3%). Par contre, la relation avec le niveau de formation est inverse pour ce qui concerne le recours au médecin spécialiste : 76,0% des répondants avec un niveau de formation tertiaire ont consulté un spécialiste au cours des deux dernières années contre 59,0% des répondants avec formation obligatoire (Tableau 6.81).


3.4.2 Consommation de médicaments

Comme il a été vu précédemment près de la moitié des répondants pour la Suisse souffrent d'au moins deux maladies chroniques. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que la plupart des répondants mentionnent également la prise régulière d'au moins deux médicaments (65,7%, cf. Figure 3.34). Pour les personnes âgées en particulier, la prise d'un nombre important de médicaments peut toutefois comporter un certain nombre de risques (par exemple des effets indésirables ou des interactions médicamenteuses) faisant de la polymédication un enjeu essentiel de santé publique. Si l'on s'intéresse de plus près à la polymédication dite « majeure », soit la consommation régulière d'au moins cinq médicaments, des disparités importantes apparaissent entre les pays (Figure 3.37). On peut notamment distinguer les pays où plus d'un quart des répondants s'inscrivent dans cette catégorie de ceux où cette part reste en deçà de 20%. Avec 14,3% de répondants consommant régulièrement entre cinq et sept médicaments et 4,0% en consommant huit ou plus, la Suisse apparaît ici comme un pays où la polymédication majeure est plutôt moins répandue que dans les autres pays.

Avec un total de 18,3% de répondants consommant au moins cinq médicaments, la part de personnes concernées en Suisse n'est toutefois pas insignifiante. Chez les personnes âgées de 80 ans et plus, ce pourcentage passe d'ailleurs à 25,3% (données non représentées). Il importe donc particulièrement qu'une telle médication fasse l'objet d'un suivi par un professionnel de la santé. Au sein de ce groupe, la plupart des répondants pour la Suisse confirment que leurs médicaments ont bel et bien été passés en revue (81,7%). Sur l'ensemble des répondants pour la Suisse, 3,1% seraient ainsi en situation de polymédication


majeure, sans que leurs médicaments n'aient été examinés par un professionnel de la santé (Figure 3.38). En Suède, ce pourcentage atteint 11,0%.

Figure 3.37 Polymédication majeure (consommation de 5 médicaments et plus), personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

Figure 3.38 Passage en revue des médicaments consommés chez les personnes de 65 ans et plus consommant au moins 5 médicaments, comparaison internationale, 2017




© Obsan 2017

3.4.3 Recours aux services d'urgence

Au cours des deux années précédant l'enquête, 26,2% des répondants pour la Suisse ont utilisé des services d'urgence (17,0% les ont utilisés une fois et 9,2%, au moins deux fois, cf. Tableau 6.113). Ce résultat place la Suisse dans la moitié inférieure du classement international pour ce qui concerne le recours aux services d'urgence.

Pour autant, les urgences hospitalières ne sont pas toujours le mode de prise en charge le plus adéquat. Dans l'ensemble des répondants pour la Suisse, 7,9% ont eu recours à des services d'urgence pour un problème dont ils considèrent qu'il aurait pu être traité par leur médecin habituel si celui-ci avait été disponible (Figure 3.39). On retrouve des pourcentages similaires dans les autres pays, les États-Unis et le Canada se distinguant avec des parts de recours évitables particulièrement élevées (14,9% et 10,9%).

Figure 3.39 Utilisation des services d'urgence, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

En Suisse, on peut encore relever que les répondants italophones sont ceux qui utilisent le plus souvent les services d'urgence des hôpitaux : 14,3% y ont eu recours au moins deux fois contre 8,3% des répondants alémaniques (Tableau 6.115). Pour autant, les données ne donnent pas à penser que cela reflète un recours évitable plus fréquent chez ce groupe de répondants.

3.4.4 Aide reçue

Pour les personnes âgées en perte d'autonomie, les aides procurées au domicile permettent de continuer à vivre au sein de leur ménage et, ce faisant, de retarder l'entrée dans une institution spécialisée. En Suisse, 11,3% des répondants ont déclaré avoir besoin d'aide, en raison de problèmes de santé, pour des tâches telles que les travaux ménagers, la préparation des repas ou la gestion quotidienne des médicaments (Tableau 6.125). Ce pourcentage place la Suisse dans le groupe des pays où les personnes âgées vivant à leur domicile expriment plutôt des besoins modérés d'aide et de soutien (moins de 13% dans cinq pays). En Australie, la part de répondants exprimant des besoins d'aide atteint 28,7%. Afin de comprendre les différences entre les pays, il faudrait notamment connaître le taux d'institutionnalisation des personnes âgées, voir leur état de santé ainsi que leur situation matérielle et organisationnelle.

Avec le Royaume-Uni, la Suisse est le pays où les personnes exprimant des besoins d'aide mentionnent le plus souvent recevoir toujours ou souvent une telle aide pour l'accomplissement de ces activités. Au total, on peut estimer que seuls 3,1% de l'ensemble des répondants pour la Suisse auraient des besoins d'aide non satisfaits (Figure 3.40). Ce pourcentage est le plus bas de la comparaison internationale, il atteint 6,8% en Nouvelle-Zélande et 14,0% en Australie.

Figure 3.40 Couverture des besoins d'aide, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017





Figure 3.41 Forme d'aide reçue par les personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

En Suisse, 3,0% de l'ensemble des répondants reçoivent simultanément une aide professionnelle ainsi que l'aide de proches, 1,4% reçoivent uniquement une aide professionnelle et 6,1%, uniquement l'aide de proches (Figure 3.41). En Suisse comme dans les autres pays, l'aide professionnelle vient donc le plus souvent s'ajouter à celle déjà délivrée par les proches.

Aux 11,3% de répondants ayant déclaré avoir besoin d'aide, il a encore été demandé s'il était déjà arrivé au cours de la dernière année que pour des raisons de coûts, ceux-ci ne reçoivent pas l'aide dont ils avaient besoin. Avec un taux de renoncement de 9,9%, la Suisse se positionne ici entre les autres pays européens où cette part plafonne à moins de 6% et les autres pays anglo-saxons où ce pourcentage atteint 23,6% (US, cf. Tableau 6.131). Sur l'ensemble des répondants pour la Suisse, le pourcentage de personnes dont l'accès à une aide serait limité par des motifs financiers serait ainsi de 1,1% (données non représentées).

3.4.5 Aide délivrée

Les personnes âgées peuvent non seulement être bénéficiaires d'une aide extérieure, mais elles peuvent également délivrer elles-mêmes une telle aide à leur(s) proche(s). En Suisse, 14,9% des répondants fournissent au moins une fois par semaine des soins ou une autre forme d'assistance (Figure 3.42). Cette part était de 12,9% en 2014 mais la hausse n'est pas significative.


Le pourcentage de répondants apportant une aide s'avère constant quel que soit le sexe ou la classe d'âge. Par contre, il est significativement plus fréquent de délivrer de l'aide pour les personnes dont le revenu est supérieur au niveau de pauvreté (16,2%) et pour celles habitant en ville (18,8%) par rapport aux personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté (11,1%) et à celles habitant en agglomération (12,1, cf. Figure 3.43). La part de proches aidants est aussi plus élevée en Suisse romande (19,3) qu'en Suisse alémanique (13,4%) et en Suisse italienne (14,0%). Ces différences ne sont pas nécessairement représentatives de la part de proches aidants dans l'ensemble de la population. Il est possible qu'en Suisse romande, l'aide soit plus souvent procurée par le/la conjoint/e (faisant partie de la population sondée) alors qu'en Suisse alémanique, l'aide serait plus souvent procurée par des proches ne partageant pas le ménage (p. ex. les enfants, lesquels n'ont pas participé à l'enquête, Dutoit et al., 2016).

Il est à noter que près de la moitié des répondants (44,0%) ayant déclaré délivrer des soins ou de l'assistance au moins une fois par semaine souffrent eux-mêmes d'au moins deux maladies chroniques (données non représentées).

Figure 3.42 Personnes de 65 ans et plus délivrant des soins ou une assistance au moins une fois par semaine, comparaison internationale, 2014 et 2017



Figure 3.43 Personnes de 65 ans et plus délivrant des soins ou une assistance au moins une fois par semaine, Suisse, 2014 et 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014/2017


© Obsan 2017

3.5 Coordination des soins

Dans le cadre de l'IHP17, les répondants sont interrogés sur différents aspects de la qualité des soins procurés par différents prestataires. L'accent est mis sur les problèmes de coordination. En rassemblant tous les résultats ayant trait à la qualité et à la coordination, il est possible d'obtenir une vue d'ensemble de la qualité des soins telle que rapportée par les répondants et de voir pour chaque pays, quels sont les points forts et les points faibles (Figure 3.44). Sur ce thème, on peut cependant envisager que ce qui est qualifié de lacunes dans un pays ne correspond pas nécessairement aux exigences de coordination dans un autre pays. Les résultats ayant trait à la qualité et la coordination nécessiteraient donc particulièrement d'être contextualisés.

En comparaison avec les autres pays, la Suisse présente des résultats moyens dans tous les domaines. Dans les autres pays, on observe que les points forts et points faibles ne sont pas les mêmes. Par exemple, l'Allemagne présente de moins bons résultats que la Norvège pour ce qui concerne la coordination en recevant des soins (p. ex. recevoir des informations contradictoires de différents professionnels de la santé) alors que des problèmes sont plus fréquemment mentionnés en Norvège qu'en Allemagne pour ce qui concerne la prise en charge post-hospitalière.

Figure 3.44 Problèmes de coordination et de qualité des soins observés par les personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017




Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Exemple de lecture : En Suisse, 23,6% des répondants ont mentionné au moins un problème de coordination en recevant des soins, 17,2% de ceux ayant consulté leur médecin habituel ainsi qu'un spécialiste mentionnent au moins un problème de coordination entre les deux professionnels. De plus, 46,5% des personnes hospitalisées mentionnent au moins une lacune dans leur prise en charge post-hospitalière et 26,5% des personnes consommant au moins deux médicaments déclarent que ceux-ci n'ont pas été passés en revue par un professionnel.

Au sein des répondants pour la Suisse, on remarque que les problèmes de coordination tendent à être moins fréquents chez les italophones que chez les répondants de Suisse allemande ou de Suisse romande (Figure 3.45). La différence s'avère significative avec les germanophones pour ce qui concerne la coordination entre le médecin habituel et le spécialiste. Par contre, plus de la moitié des répondants italophones prenant au moins deux médicaments sur ordonnance déclarent que ceux-ci n'ont pas été passés en revue par un professionnel (54,2%) alors que cette lacune ne concerne que 23,5% des répondants alémaniques et 28,3% des répondants romands (différences significatives). De plus, on observe également que les répondants avec Medical Home rapportent moins souvent des problèmes de coordination, mais la différence n'est significative que pour le passage en revue des médicaments.

Figure 3.45 Problèmes de coordination et de qualité des soins observés par les personnes de 65 ans et plus, Suisse, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017


© Obsan 2017

Exemple de lecture : 23,9% des répondants pour la Suisse alémanique ont mentionné au moins un problème de coordination en recevant des soins, 18,3% de ceux ayant consulté leur médecin habituel ainsi qu'un spécialiste mentionnent au moins un problème de coordination entre les deux professionnels. De plus, 23,5% des personnes consommant au moins deux médicaments déclarent que ceux-ci ont été passés en revue par un professionnel.

3.5.1 Problèmes de coordination

Les problèmes de coordination sont sources d'inefficience au sein du système de santé. Ils peuvent se manifester de différentes manières, mais ont souvent pour effet d'interrompre la continuité des soins. En Suisse, environ un répondant sur dix a déclaré qu'au cours des deux années précédentes, il était déjà arrivé que les résultats d'un test ou que le dossier médical ne soient pas disponibles au moment du rendez-vous pour les soins (9,6%), de recevoir des informations contradictoires de différents médecins ou professionnels de la santé (12,0%) ou que des médecins prescrivent un test médical jugé inutile car déjà effectué (12,5%, cf. Figure 3.46).

Figure 3.46 Problèmes de coordination observés au cours des deux années précédentes par les personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Note : Les personnes se déclarant « non concernées » ont été exclues pour les trois indicateurs suivants : « Résultat de test/dossier médical non disponible », « Informations contradictoires reçues » et « Test(s) superflu(s) ». À des fins de comparaison avec les résultats de 2014, les personnes non concernées n'ont pas été exclues pour l'indicateur « Erreur médicale ».

Exemple de lecture : En Suisse, 9,6% des répondants ont déclaré qu'au cours des deux années précédentes, il était déjà arrivé que les résultats d'un test ou que le dossier médical ne soient pas disponibles au moment du rendez-vous pour les soins, 12,0% ont reçu des informations contradictoires de différents médecins ou professionnels de la santé, 12,5% se sont vus prescrire un test médical jugé inutile car déjà effectué et 11,3% considèrent qu'une erreur médicale a été commise dans leur traitement ou dans leurs soins.

Dans l'ensemble, près d'un quart des répondants se sont dit confrontés à l'un ou l'autre de ces problèmes de coordination (23,6%, cf. Figure 3.44). Par rapport aux résultats de 2014, ces différents types de problèmes tendent à être un peu plus souvent mentionnés par les répondants mais les différences ne sont pas significatives. De plus, 11,3% des répondants considèrent qu'une erreur médicale a été commise dans leur traitement ou dans leurs soins, un pourcentage que suit également une tendance non significative à la hausse (8,1% en 2014, cf. Tableau 6.72).


Au vu des fréquences relevées quant à la survenue de problèmes de coordination ainsi que de la constance de ces résultats entre 2014 et 2017, on peut conclure à la persistance d'un potentiel d'amélioration pour la Suisse dans le domaine de la coordination des soins. (Tableau 6.70)

3.5.2 Coordination entre médecin spécialiste et médecin habituel

Les résultats sont aussi constants pour ce qui concerne la fréquence des problèmes de coordination observés par les patients entre leur médecin habituel et le médecin spécialiste. En 2017, parmi les répondants ayant consulté les deux types de professionnels, 12,0% affirment qu'après avoir vu le spécialiste, le médecin habituel ne semblait pas informé et à jour concernant les soins reçus d'un spécialiste et 9,2% déclarent qu'il est arrivé que le médecin spécialiste ne dispose pas des renseignements médicaux de base ou de résultats de tests du médecin habituel concernant la raison de la visite (Figure 3.47). Au total, 17,2% des répondants concernés mentionnent au moins l'un de ces deux problèmes de coordination (Figure 3.44).

Avec une quatrième position au classement des pays où ces problèmes sont les plus souvent mentionnés, ces résultats suggèrent à nouveau l'existence d'un potentiel d'amélioration pour la Suisse. Toutefois, on peut rappeler que lors de l'enquête menée en 2015, les médecins de premier recours de Suisse étaient ceux qui avaient apprécié de la façon la plus positive la coordination avec les médecins spécialistes (Merçay, 2015). Les perspectives des répondants âgés de 65 ans et plus et des médecins de premier recours ne semblent donc pas converger sur ce thème.

Figure 3.47 Problèmes de coordination observés entre le médecin spécialiste et le médecin habituel au cours des deux années précédentes par les personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017


Exemple de lecture : En Suisse, parmi les répondants ayant consulté les deux types de professionnels, 12,0% affirment qu'après avoir vu le spécialiste, le médecin habituel ne semblait pas informé et à jour concernant les soins reçus d'un spécialiste et 9,2% déclarent qu'il est arrivé que le médecin spécialiste ne dispose pas des renseignements médicaux de base ou de résultats de tests du médecin habituel concernant la raison de la visite.

3.5.3 Suivi des soins après une hospitalisation

Sachant que près d'un tiers des répondants pour la Suisse ont vécu au moins une hospitalisation au cours des deux années précédentes (31,9%, cf. Figure 3.34), la question du bon déroulement des soins de suivi à la sortie de l'hôpital paraît essentielle.

La Suisse affiche un résultat particulièrement bon pour ce qui concerne le fait d'avoir un interlocuteur de contact pour aborder les questions sur l'état de santé ou le traitement (94,1% des répondants, cf. Figure 3.48). Des résultats positifs sont également enregistrés concernant le suivi de l'information auprès du lieu de traitement habituel (88,0%) ainsi que par rapport à l'arrangement des soins de suivi (84,1%). Il est par contre moins systématique que les répondants expriment le sentiment d'avoir reçu le soutien et les services nécessaires afin de gérer l'état de santé à la maison (76,0%), que des explications soient données concernant les raisons de prendre chacun des médicaments (71,4%) ou que des informations écrites soient remises concernant le suivi des soins à la maison (65,6%).

Par rapport aux résultats de 2014, aucun changement significatif n'est enregistré mais cela peut être en partie dû à la petite taille de l'échantillon. Il est toutefois possible qu'une réelle tendance à la hausse se dessine concernant la remise d'instructions écrites (55,6% en 2014). La pratique semble particulièrement s'être répandue en Suisse romande (46,0% en 2014 et 65,8% en 2017) qui se positionne ainsi au même niveau que la Suisse alémanique (64,8%) et que la Suisse italienne (74,0%, cf. Tableau 6.105 et Tableau 6.106).

Figure 3.48 Suivi à la sortie de l'hôpital, personnes de 65 ans et plus, Suisse, 2014 et 2017

1. Savait qui contacter en cas de questions sur l'état de santé ou le traitement.
2. Le personnel du lieu de traitement habituel semblait informé des dernières informations concernant les soins reçus à l'hôpital.
3. L'hôpital a veillé à ce que des soins de suivi soient délivrés.
4. A reçu le soutien et les services nécessaires pour gérer l'état de santé à la maison.
5. Les raisons de prendre chacun des médicaments ont été expliquées.
6. A reçu des informations écrites sur quoi faire dès le retour au domicile et les symptômes à surveiller.


Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014/2017

© Obsan 2017


3.6 Souhaits en matière de traitements en fin de vie

Le principe d'autonomie du patient a été consacré dans le nouveau droit de la protection de l'adulte, en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2013. Les directives anticipées sont considérées comme un instrument permettant de garantir cette autonomie en consignait les traitements médicaux auxquels le patient consent ou non, au cas où celui-ci deviendrait incapable de discernement.

Une première étape permettant de faire valoir ses volontés en matière de choix de fin de vie est de communiquer oralement ces dernières, que ce soit à ses proches ou à un professionnel de la santé. Ici, les pratiques diffèrent passablement d'un pays à l'autre, passant de 22,3% de répondants ayant pris de telles dispositions en Norvège à 75,9% aux États-Unis (Figure 3.49). Avec un pourcentage de 60,4%, la Suisse figure parmi les pays où ce sujet est plutôt souvent évoqué. De plus, il s'agit du seul pays, avec la France, où cet indicateur a progressé de façon significative depuis 2014 (54,2%).


Figure 3.49 Proches ou professionnel de la santé informés des souhaits en matière de traitements en fin de vie, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2014 et 2017

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014/2017

Figure 3.50 Souhaits en matière de traitements en fin de vie consignés dans un document écrit, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2014 et 2017

© Obsan 2017

Figure 3.51 Représentant légal désigné dans un document écrit, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2014 et 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014/2017

© Obsan 2017

La rédaction de directives anticipées reste généralement le moyen recommandé afin de faire connaître ses volontés. Comme dans les autres pays, cette manière de formuler ses volontés est toutefois moins répandue que la communication orale. En Suisse, 35,7% des répondants ont fait figurer leurs choix de fin de vie dans un document écrit, ce qui représente une hausse de près de onze points de pourcentage par rapport à 2014 (24,9%, cf. Figure 3.50). Une part similaire de répondants a fait la démarche de désigner un représentant légal afin de prendre les décisions thérapeutiques en cas d'incapacité de discernement (36,7%, 27,5% en 2014, cf. Figure 3.51). Le plus souvent, les répondants ayant désigné un représentant légal sont également ceux ayant consigné leurs choix de fin de vie dans un document écrit (données non représentées).


Aux répondants pour la Suisse, il a encore été demandé s'ils étaient membres d'une organisation pour l'autodétermination de fin de vie (telle qu'Exit ou Dignitas). Bien que la part de répondants ayant fait une telle démarche reste moindre, celle-ci suit tout de même également la tendance à la hausse : alors qu'en 2014, 5,0% des répondants avaient adhéré à une organisation pour l'autodétermination de fin de vie et 5,4% avaient le projet de devenir membre, ces pourcentages sont passés en 2017 à respectivement 6,6% et 7,9%. Au total, la part de répondants étant membres d'une telle organisation ou ayant l'intention de le devenir est passée de 10,4% en 2014 à 14,5% en 2017.

En Suisse, le recours aux outils servant à l'autodétermination est lié à plusieurs critères socio-démographiques. Premièrement, un net effet d'âge apparaît, les personnes plus âgées étant plus souvent préparées sur ce sujet. Par exemple, entre les classes d'âge allant de 65 à 69 ans et de 80 ans et plus, la part de répondants ayant désigné par écrit un représentant légal passe du simple au double (de 24,6% à 50,4%, cf. Tableau 6.225).

Il apparaît également que de manière générale, ces outils sont moins souvent utilisés par les personnes issues de la migration en comparaison avec celles nées en Suisse. Par exemple, 39,1% des personnes nées en Suisse disposent d'un document écrit dans lequel leurs choix de vie sont consignés, contre 23,0% des personnes nées à l'étranger.

Sur ce thème, on observe encore une importante divergence entre les résultats pour la Suisse alémanique et ceux de la Suisse latine, les répondants alémaniques ayant nettement plus souvent que les latins consigné leurs désirs en matière de fin de vie (Figure 3.52). Ainsi, plus de la moitié des répondants alémaniques âgés de 80 ans et plus ont préparé des directives anticipées écrites (55,4%) alors que dans cette tranche d'âge, ce n'est le cas que de 27,5% des romands et de 16,5% des italophones.

Figure 3.52 Description des souhaits en matière de traitements en fin de vie par les personnes âgées de 65 ans et plus, Suisse, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Exemple de lecture : En Suisse alémanique, 76,6% des répondants âgés de 80 ans et plus ont informé leurs proches de leurs choix de fin de vie, 55,4% disposent d'un document écrit décrivant leurs choix de fin de vie, 57,6% ont désigné par écrit un représentant légal et 8,0% sont membres d'une organisation pour l'autodétermination de fin de vie.

Dans l'ensemble, les deux tiers des répondants alémaniques de 65 ans et plus (67,9%) ont pris des dispositions concernant les traitements médicaux à recevoir ou à ne pas recevoir en fin de vie, que ce soit en informant leurs proches ou en rédigeant des directives anticipées (données non représentées). Ce pourcentage passe à 53,2% en Suisse romande et à 49,5% en Suisse italienne. Il serait intéressant de savoir si ces écarts reflètent plutôt des différences culturelles d'attitude vis-à-vis de la fin de vie ou si ceux-ci sont liés, par exemple, à la méconnaissance qu'ont certains répondants de ces outils ou au développement différencié des soins palliatifs dans les cantons suisses. Il apparaît dans tous les cas que ce thème est relativement peu discuté au sein du cabinet du médecin habituel puisque seuls 5,9% des répondants déclarent avoir eu une telle discussion avec ce dernier (cf. Tableau 6.227). Ce pourcentage est stable, indépendamment de la région linguistique.

3.7 Satisfaction concernant les soins médicaux reçus

S'il n'est pas rare que les répondants pour la Suisse relèvent des problèmes de coordination entre différents prestataires de santé, la satisfaction concernant la qualité des soins médicaux reçus n'en demeure pas moins élevée puisque 83,7% des répondants ayant reçu des soins médicaux au cours de l'année précédente se déclarent entièrement satisfaits ou très satisfaits, ce qui représente le meilleur résultat de la comparaison internationale (Figure 3.53).

Figure 3.53 Personnes de 65 ans et plus entièrement ou très satisfaites concernant la qualité des soins médicaux reçus au cours des douze derniers mois, comparaison internationale, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

En Suisse, comme en Suède ou en Norvège, la grande majorité des répondants ayant rencontré un quelconque problème de prise en charge (selon les indicateurs retenus pour la Figure 3.44) se déclare néanmoins entièrement ou très satisfaite (77,9% pour la Suisse, données non représentées) de la qualité des soins. Dans d'autres pays, cette part descend à 51% environ (AU et FR).

De plus, toujours parmi les répondants ayant reçu des soins médicaux au cours de l'année précédente, la très grande majorité déclare avoir reçu la quantité de soins appropriée (95,5%). Seuls 2,4% estiment avoir reçu trop peu de soins médicaux et 1,3%, en avoir reçu trop. (calcul à partir du Tableau 6.251).

3.8 Analyse cantonale

Pour les quatre cantons ayant densifié leur échantillon, il est possible de présenter certaines spécificités cantonales quant aux résultats de l'enquête. Il est toutefois utile de contextualiser ces résultats en indiquant également les valeurs observées dans chaque région linguistique.

De manière générale, les indicateurs décrivant l'état de santé sont plus favorables en Suisse alémanique et en Suisse italienne qu'en Suisse romande. Par exemple, les parts de répondants rapportant au moins deux maladies chroniques différentes ou déclarant avoir été l'objet d'un sentiment de détresse émotionnelle difficile à gérer soi-même sont plus élevées dans les cantons romands. Pour ce qui concerne la description de l'état de santé, les répondants pour le canton du Valais présentent cependant de meilleurs résultats que ceux de Suisse romande en général (voir aussi Tableau 3.6).


Sur la question des difficultés financières également, les résultats sont plus favorables en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. C'est sur la question du renoncement aux soins dentaires que ces écarts sont les plus manifestes : le taux de renoncement atteint 21,5% des répondants dans le canton de Genève contre 12,2% dans le canton Zurich.

Pour les soins de premier recours, on observe que l'accès au médecin est plus rapide en Suisse alémanique et en Suisse italienne qu'en Suisse romande alors que les pratiques de prévention sont nettement plus répandues en Suisse romande que dans le reste de la Suisse.

En matière de coordination des soins, les résultats entre Suisse alémanique et Suisse romande sont assez similaires. Par contre, si les répondants italophones mentionnent plutôt peu souvent des lacunes pour ce qui concerne la coordination des soins entre le médecin habituel et le médecin spécialiste, il est par moins fréquent que leur consommation de médicaments soit passée en revue par un professionnel.

Finalement, la principale différence pour ce qui concerne le recours aux prestations de santé se situe au niveau du nombre de médecins consultés avec les répondants romands mentionnant deux fois plus souvent que les alémaniques avoir consulté au moins quatre médecins différents au cours de l'année précédente. Cette particularité concerne en fait surtout les cantons de Genève et de Vaud, le canton du Valais présentant un résultat plus proche de la moyenne nationale.

Figure 3.54 Exemples de différences régionales, régions linguistiques et cantons, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Les spécificités cantonales pour les quatre cantons ayant procédé à une densification de leur échantillon sont discutées plus en détail ci-après. Les tableaux 3.3 à 3.6 rendent compte des questions pour lesquelles les résultats cantonaux diffèrent de ceux pour le reste de la Suisse. Il ne s'agit donc pas de dresser un portrait complet pour chaque canton mais bien de mettre en évidence les particularités observées. Les différences significatives sont indiquées en caractères normaux. Lorsque les résultats cantonaux diffèrent sensiblement de la moyenne suisse mais pas de façon significative, possiblement en raison de la petite taille de l'échantillon, les chiffres sont indiqués en italique et entre parenthèse. Comme l'échantillon pour le canton de Genève est nettement plus grand que pour les autres cantons, seules les différences de résultat significatives sont présentées

3.8.1 Canton de Zurich

Que ce soit par rapport au nombre de médecins consultés, au recours au service d'urgence ou à la consommation de médicaments, plusieurs indicateurs suggèrent un recours moins intense aux prestations de santé par les répondants du canton

de Zurich que par ceux du reste de la Suisse. Il est possible que le recours aux médecins spécialistes fasse exception. Dans ce domaine, les faibles délais d'attente reflètent sans doute une densité plus élevée de médecins spécialistes dans ce canton.

Avec des activités de prévention plutôt moins courantes mais des souhaits plus souvent formalisés concernant les choix de fin de vie, les résultats pour le canton de Zurich sont, sur ces deux sujets, à l'image de ceux observés pour l'ensemble de la Suisse alémanique.

On relève finalement que si les répondants du canton de Zurich semblent un peu moins souvent exprimer une forme de détresse émotionnelle que ceux du reste de la Suisse, ils reçoivent néanmoins plus souvent une aide professionnelle. Autres points positifs pour les répondants du canton de Zurich : les difficultés matérielles semblent être légèrement moins souvent sources d'inquiétude et ces répondants semblent être plutôt familiers des instruments de cybersanté.

Tableau 3.3 Particularités pour le canton de Zurich, 2017

| | | Canton de Zurich | Suisse sans le canton de Zurich | Suisse alémanique |
|--|---|------------------|---------------------------------|-------------------|
| État de santé | | | | |
| Santé psychique | <i>Détresse émotionnelle (oui)</i> | (12,3) | (16,4) | (14,8) |
| | A reçu une aide en cas de détresse émotionnelle (oui) | 59,3 | 33,4 | 33,7 |
| Conditions de vie matérielles | | | | |
| Inquiétude | <i>Au moins un type de difficulté matérielle (toujours/généralement/parfois)</i> | (5,4) | (8,5) | (10,2) |
| Recours aux prestations de santé | | | | |
| Médecin | <i>Au moins 2 médecins consultés (oui)</i> | (62,3) | (70,0) | (56,5) |
| Spécialiste | <i>Consultation d'un spécialiste (oui)</i> | (70,5) | (64,3) | (65,1) |
| | Moins de 4 semaines avant d'obtenir un rdv (oui) | 86,7 | 75,9 | 81,2 |
| Urgences | <i>Recours aux services d'urgences (au moins une fois)</i> | (22,6) | (26,9) | (24,6) |
| Médicament | <i>Consomme au moins 2 médicaments (oui)</i> | (61,7) | (66,6) | (64,2) |
| Substitution | <i>Pourrait recevoir la suite du traitement par un autre professionnel de la santé que le médecin (oui)</i> | (64,2) | (59,7) | (66,6) |
| Recours aux instruments de cybersanté | | | | |
| | <i>A téléchargé des informations de santé (oui)</i> | (17,5) | (12,1) | (12,7) |
| | <i>A utilisé internet pour s'informer sur des sujets concernant la santé (oui)</i> | (49,5) | (42,1) | (43,6) |
| Médecin de premier recours | | | | |
| Consultation | <i>Patient encouragé à poser des questions (toujours)</i> | (33,2) | (38,9) | (43,6) |
| Prévention | Discussion sur l'alimentation (oui) | 22,7 | 33,7 | 71,7 |
| | Discussion sur la consommation d'alcool (oui) | 7,3 | 11,2 | 8,2 |
| Coordination | | | | |
| Problème | <i>Informations de santé non disponibles au moment du rendez-vous (oui)</i> | (6,5) | (10,2) | (8,8) |
| | <i>Test inutile (oui)</i> | (15,9) | (11,8) | (13,8) |
| Médicaments | Remise d'une liste écrite des médicaments prescrits (oui) | 36,1 | 46,2 | 44,1 |
| | <i>Effets secondaires expliqués (oui)</i> | (40,0) | (49,9) | (46,4) |
| Gestion | <i>Professionnel de santé facilement joignable entre les visites (oui)</i> | (28,4) | (34,9) | (31,1) |
| | <i>Plan de traitement (oui)</i> | (39,3) | (47,5) | (38,8) |
| Souhaits en matière de traitement en fin de vie | | | | |
| | <i>Document écrit avec choix de fin de vie (oui)</i> | (41,2) | (34,5) | (43,6) |
| | <i>Représentant légal désigné (oui)</i> | (43,1) | (35,4) | (44,6) |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Note : Lorsque le résultat cantonal diffère de façon significative du résultat pour le reste de la Suisse, les pourcentages sont indiqués en caractères normaux. Lorsque les résultats cantonaux diffèrent sensiblement de la moyenne suisse mais pas de façon significative, possiblement en raison de la petite taille de l'échantillon, les chiffres sont indiqués en italique et entre parenthèse.

Résultat en vert : Le résultat cantonal est meilleur que résultat pour le reste de la Suisse.

Résultat en rouge : Le résultat cantonal est moins bon que résultat pour le reste de la Suisse.

3.8.2 Cantons de Vaud et de Genève

Malgré la taille réduite de son échantillon, le canton de Vaud présente des résultats distincts du reste de la Suisse sur plusieurs points. Sur la plupart des thèmes, les résultats pour le canton de Vaud se rapprochent d'ailleurs de ceux du canton de Genève, raison pour laquelle les deux cantons sont ici traités ensemble.

Premièrement, plusieurs indicateurs témoignent de difficultés matérielles plus fréquentes pour les répondants de ces deux cantons que pour ceux du reste de la Suisse (p. ex. renoncement à une consultation dentaire ou soucis pour des aspects matériels). Les réponses pour le canton de Genève se distinguent de surcroît en présentant des dépenses médicales plus élevées et des difficultés plus fréquentes à payer des factures médicales.

Deuxièmement, un recours accru aux prestations de santé transparait à travers le nombre de médecins consultés. Les répondants du canton de Vaud ont également une plus grande consommation de médicaments alors que ceux du canton de Genève sollicitent plus souvent les services d'urgence. Sur ce point, les répondants pour le canton de Vaud présentent un taux de recours moyen aux services d'urgence et il semblerait de plus qu'il s'agisse moins souvent d'un recours évitable (parce que le médecin habituel aurait été disponible) que dans le reste de la Suisse.

À l'image du résultat pour la Suisse romande dans son ensemble, les répondants de ces deux cantons accueillent moins volontiers l'idée de voir une partie de leurs soins substituée par un autre professionnel de la santé que leur médecin.

Concernant les rapports avec le médecin habituel, le bilan est également similaire pour les deux cantons. D'un côté, celui-ci est nettement moins souvent rapidement atteignable (les répondants pour le canton de Genève trouvant toutefois plus facile d'avoir des soins en dehors des horaires classiques d'ouverture des cabinets). De plus, il serait moins fréquent que le médecin fournisse une aide à la coordination des soins lorsque plusieurs médecins sont consultés. D'un autre côté, des activités de prévention plus souvent mentionnées par les répondants de ces deux cantons. Ceux-ci disposent également plus souvent d'un plan de traitement, lequel permet une meilleure vue d'ensemble des problèmes de santé. Ce résultat est plutôt positif lorsque l'on sait que la multimorbidité est plus répandue chez les répondants de ces deux cantons que pour ceux du reste de la Suisse.

Les répondants des deux cantons présentent encore des résultats proches pour ce qui concerne la formulation des choix concernant les traitements médicaux consentis ou non en fin de vie. Tant pour ce qui concerne l'information aux proches que la préparation d'un document écrit ou la désignation d'un représentant légal, ces démarches ont moins souvent été entreprises par les répondants des cantons de Vaud et Genève que par ceux du reste de la Suisse. Pour le canton de Genève, on relève par ailleurs, que si les répondants ne sont pas plus souvent membres d'une organisation pour l'autodétermination de fin de vie qu'en moyenne suisse, ceux-ci déclarent plus souvent une intention de devenir membre d'une telle organisation.

Pour le seul canton de Genève, on peut finalement mentionner que les répondants sont plus souvent atteints dans leur santé psychique que dans le reste de la Suisse. En outre, ces derniers semblent plus familiers à l'usage des nouvelles technologies au service de leur santé (p. ex. envoi d'e-mail avec une question médicale).

Tableau 3.4 Particularités pour le canton de Vaud, 2017

| | | Canton de Vaud | Suisse sans le canton de Vaud | Suisse romande |
|--|--|----------------|-------------------------------|----------------|
| État de santé | | | | |
| Santé physique | 3 maladies chroniques ou plus (oui) | 28,1 | 20,2 | 26,0 |
| Conditions de vie matérielles | | | | |
| Renoncement | Consultation chez le dentiste (oui) | 19,4 | 12,0 | 19,8 |
| | Achats alimentaires (toujours/généralement/parfois) | 22,0 | 11,2 | 19,4 |
| Soucis | Loyer ou hypothèque (toujours/généralement/parfois) | 23,6 | 14,3 | 22,1 |
| | Autres factures mensuelles (toujours/généralement/parfois) | 22,1 | 12,7 | 20,8 |
| Recours aux prestations de santé | | | | |
| Médecins | Au moins 4 médecins consultés (oui) | 24,8 | 13,7 | 23,1 |
| Médicament | Consomme au moins 2 médicaments (oui) | 73,8 | 65,0 | 70,2 |
| Urgence | <i>Recours évitable au service d'urgences (oui)</i> | (22,7) | (31,9) | (28,6) |
| Substitution | Pourrait recevoir la suite du traitement par un autre professionnel de la santé que le médecin (oui) | 47,3 | 61,7 | 48,3 |
| Médecin de premier recours | | | | |
| Accès | Parvient à obtenir un rdv le jour même/le lendemain (oui) | 32,9 | 47,8 | 35,2 |
| | Réponse le jour-même en cas de question (toujours) | 54,4 | 69,5 | 54,9 |
| Consultation | <i>Médecin connaît l'historique médical (toujours)</i> | (63,9) | (69,9) | (62,2) |
| Soutien | <i>Médecin aide à la coordination des soins (toujours/souvent)</i> | (80,3) | (85,9) | (78,6) |
| | Discussion sur l'alimentation (oui) | 47,4 | 30,4 | 46,3 |
| Prévention | Discussion sur l'activité physique (oui) | 58,6 | 45,9 | 57,3 |
| | Discussion sur les sources de stress (oui) | 26,9 | 16,8 | 28,0 |
| | Discussion sur la consommation d'alcool (oui) | 19,6 | 9,6 | 18,4 |
| Gestion maladie | Plan de traitement (oui) | 62,8 | 44,6 | 63,0 |
| | Instructions claires sur les symptômes à surveiller (oui) | 56,9 | 45,7 | 65,8 |
| Coordination | | | | |
| | <i>Test inutile (oui)</i> | (8,3) | (12,9) | (9,3) |
| Médicament | <i>Effets secondaires expliqués (oui)</i> | (55,0) | (47,6) | (53,4) |
| | <i>Professionnel de santé facilement joignable entre les visites (oui)</i> | (40,5) | (33,2) | (40,4) |
| Souhaits en matière de traitement en fin de vie | | | | |
| | Proches informés des choix de fins de vie (oui) | 51,6 | 61,2 | 52,1 |
| | Document écrit avec choix de fin de vie (oui) | 15,9 | 37,5 | 16,2 |
| | Représentant légal désigné (oui) | 17,8 | 38,5 | 18,2 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Note : Lorsque le résultat cantonal diffère de façon significative du résultat pour le reste de la Suisse, les pourcentages sont indiqués en caractères normaux. Lorsque les résultats cantonaux diffèrent sensiblement de la moyenne suisse mais pas de façon significative, possiblement en raison de la petite taille de l'échantillon, les chiffres sont indiqués en italique et entre parenthèse.

Résultat en vert : Le résultat cantonal est meilleur que résultat pour le reste de la Suisse.

Résultat en rouge : Le résultat cantonal est moins bon que résultat pour le reste de la Suisse.

Tableau 3.5 Particularités pour le canton de Genève, 2017

| | | Canton de Genève | Suisse sans le canton de Genève | Suisse romande |
|---|--|------------------|---------------------------------|----------------|
| État de santé | | | | |
| Santé physique | 2 maladies chroniques ou plus (oui) | 50,8 | 44,6 | 49,6 |
| | Douleurs articulaires, arthrite (oui) | 47,2 | 37,3 | 44,6 |
| | Sentiment d'isolement (parfois/souvent) | 21,3 | 14,8 | 19,3 |
| Santé psychique | Dépression (oui) | 13,0 | 8,9 | 12,1 |
| | Détresse émotionnelle (oui) | 19,9 | 15,5 | 19,7 |
| Conditions de vie matérielles | | | | |
| Renoncement | Test/examen de contrôle (oui) | 8,5 | 5,2 | 5,4 |
| | Consultation chez le dentiste (oui) | 21,5 | 12,2 | 19,8 |
| Paiements | Difficultés à payer des factures médicales (oui) | 7,5 | 4,1 | 7,1 |
| | Achats alimentaires (toujours/généralement/parfois) | 17,1 | 11,9 | 19,4 |
| Inquiétude | Loyer ou hypothèque (toujours/généralement/parfois) | 19,5 | 14,9 | 22,1 |
| | Autres factures mensuelles (oui) | 18,0 | 13,2 | 20,8 |
| Dépenses | Dépenses médicales du ménage >= 2000.- | 37,1 | 30,3 | 28,3 |
| Recours aux prestations de santé | | | | |
| Médecins | Au moins 4 médecins consultés (oui) | 27,4 | 13,9 | 23,1 |
| Urgences | Recours aux services d'urgence (oui) | 32,8 | 25,8 | 29,5 |
| Substitution | Pourrait recevoir la suite du traitement par un autre professionnel de la santé que le médecin (oui) | 44,6 | 61,4 | 48,3 |
| Recours aux instruments de cybersanté | | | | |
| | A envoyé un email à un professionnel de la santé pour une question médicale (oui) | 12,0 | 5,2 | 7,4 |
| | A utilisé internet pour s'informer sur des sujets concernant la santé (oui) | 50,4 | 42,9 | 44,2 |
| | Application numérique pour recueillir des informations sur sa santé (usage privé) (oui) | 16,6 | 10,5 | 14,9 |
| Médecin de premier recours | | | | |
| Accès | Soins en dehors des horaires d'ouverture (très/assez facile) | 50,2 | 42,2 | 42,9 |
| | Parvient à obtenir un rdv le jour même/le lendemain (oui) | 30,1 | 47,5 | 35,2 |
| | Réponse le jour-même en cas de question (toujours/souvent) | 85,1 | 91,5 | 87,4 |
| Consultation | Médecin connaît l'historique médical (toujours) | 63,0 | 69,8 | 62,2 |
| | Patient encouragé à poser des questions (toujours/souvent) | 69,6 | 63,2 | 67,9 |
| Soutien | Patient impliqué dans les décisions (toujours) | 54,1 | 61,6 | 56,6 |
| | Médecin aide à la coordination des soins (toujours/souvent) | 77,8 | 85,8 | 78,6 |
| Prévention | Discussion sur l'alimentation (oui) | 47,1 | 30,9 | 46,3 |
| | Discussion sur l'activité physique (oui) | 61,3 | 46,1 | 57,3 |
| | Discussion sur les sources de stress (oui) | 27,6 | 17,1 | 28,0 |
| Gestion maladie | Discussion sur la consommation d'alcool (oui) | 21,2 | 9,9 | 18,4 |
| | Plan de traitement (oui) | 60,2 | 45,3 | 63,0 |
| | Très confiant quant à la capacité à gérer la maladie (oui) | 29,2 | 36,0 | 30,4 |
| Coordination | | | | |
| Hôpital | Suivi des soins assuré (oui) | 74,1 | 84,6 | 81,5 |
| Souhait en matière de traitement en fin de vie | | | | |
| | Proches informés des choix de fins de vie (oui) | 49,4 | 61,0 | 52,1 |
| | Document écrit avec choix de fin de vie (oui) | 14,1 | 36,9 | 16,2 |
| | Représentant légal désigné (oui) | 15,9 | 37,9 | 18,2 |
| | A l'intention de devenir membre d'une organisation pour l'autodétermination de fin de vie (oui) | 11,9 | 7,7 | 12,4 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Note : Lorsque le résultat cantonal diffère de façon significative du résultat pour le reste de la Suisse, les pourcentages sont indiqués en caractères normaux. Lorsque les résultats cantonaux diffèrent sensiblement de la moyenne suisse mais pas de façon significative, possiblement en raison de la petite taille de l'échantillon, les chiffres sont indiqués en italique et entre parenthèse.

Résultat en vert : Le résultat cantonal est meilleur que résultat pour le reste de la Suisse.

Résultat en rouge : Le résultat cantonal est moins bon que résultat pour le reste de la Suisse.

3.8.3 Canton du Valais

Sur plusieurs thèmes, le canton du Valais présente un profil similaire à celui des cantons de Vaud et de Genève : par rapport à la moyenne suisse, les pratiques de prévention sont plus répandues, on trouve une plus grande réticence vis-à-vis de l'idée d'une substitution des soins par un professionnel autre que le médecin et les répondants ont moins souvent pris de dispositions concernant les traitements médicaux auxquels ils consentent ou non en fin de vie. Ces résultats correspondent également aux tendances relevées pour l'ensemble de la Suisse romande.

Les données pour le canton du Valais présentent toutefois également des caractéristiques propres. L'état de santé des répondants pour le canton du Valais serait plutôt bon, même si les différences avec le reste de la Suisse ne sont pas significatives. De plus, les dépenses des ménages consacrées à la santé sont plus basses que dans le reste de la Suisse. La part de répondants ayant consulté au moins quatre médecins est proche de la moyenne pour la Suisse, ce qui signifie également que cette part est nettement plus basse que dans la moyenne des cantons romands. Bien que la part de répondants ayant consulté un médecin spécialiste ne soit pas particulièrement élevée, les délais d'attente tendent à être plus longs que dans le reste de la Suisse, ce qui reflète certainement une densité de médecins spécialistes moins élevée.

Tableau 3.6 Particularités pour le canton du Valais, 2017

| | | Canton du Valais | Suisse sans le canton du Valais | Suisse romande |
|--|--|------------------|---------------------------------|----------------|
| État de santé | | | | |
| | <i>État de santé excellent/très bon (oui)</i> | (39,0) | (31,5) | (30,6) |
| Santé physique | <i>Risque de chute élevé/modéré (oui)</i> | (29,1) | (39,2) | (11,4) |
| | <i>Consommation de tabac (oui)</i> | (7,7) | (11,3) | (10,8) |
| Conditions de vie matérielles | | | | |
| Dépenses | Dépenses médicales du ménage >= 1000.- | 39,1 | 50,9 | 46,0 |
| Recours aux prestations de santé | | | | |
| Spécialiste | <i>Consultation d'un spécialiste (oui)</i> | (61,3) | (65,6) | (65,0) |
| | Moins de 4 semaines avant d'obtenir un rdv (oui) | 63,7 | 78,4 | 69,2 |
| Substitution | Pourrait recevoir la suite du traitement par un autre professionnel de la santé que le médecin (oui) | 51,3 | 60,9 | 48,3 |
| Aide | <i>Fournit des soins ou de l'assistance (oui)</i> | (20,4) | (14,6) | (19,3) |
| Recours aux instruments de cybersanté | | | | |
| | <i>A utilisé internet pour s'informer sur des sujets concernant la santé (oui)</i> | (37,8) | (43,6) | (44,2) |
| Médecin de premier recours | | | | |
| Consultation | Médecin connaît l'historique médical (toujours/souvent) | 82,8 | 89,6 | 88,5 |
| Prévention | <i>Discussion sur l'alimentation (oui)</i> | (39,2) | (31,5) | (46,3) |
| | Discussion sur la consommation d'alcool (oui) | 16,7 | 10,2 | 18,4 |
| Coordination | | | | |
| Spécialiste | <i>Médecin informé des soins procurés par le spécialiste (oui)</i> | (85,9) | (80,3) | (84,3) |
| Souhaits en matière de traitement en fin de vie | | | | |
| | Proches informés des choix de fins de vie (oui) | 48,0 | 60,9 | 52,1 |
| | Document écrit avec choix de fin de vie (oui) | 16,3 | 36,5 | 16,2 |
| | Représentant légal désigné (oui) | 21,3 | 37,4 | 18,2 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Note : Lorsque le résultat cantonal diffère de façon significative du résultat pour le reste de la Suisse, les pourcentages sont indiqués en caractères normaux. Lorsque les résultats cantonaux diffèrent sensiblement de la moyenne suisse mais pas de façon significative, possiblement en raison de la petite taille de l'échantillon, les chiffres sont indiqués en italique et entre parenthèse.

Résultat en vert : Le résultat cantonal est meilleur que résultat pour le reste de la Suisse.

Résultat en rouge : Le résultat cantonal est moins bon que résultat pour le reste de la Suisse.

4 Points essentiels pour la Suisse

En comparaison internationale, la population âgée de Suisse présente un bon état de santé général

Tant au niveau de l'état de santé auto-évalué (20,7% des répondants décrivent leur état de santé comme passable ou mauvais) que de la fréquence des maladies chroniques (44,1% souffrent d'au moins deux maladies chroniques), l'état de santé général des répondants pour la Suisse est plutôt bon en comparaison avec les autres pays. Seule la Nouvelle-Zélande présente des résultats significativement meilleurs sur ces deux points.

En Suisse, environ un répondant sur dix présente des besoins d'aide et de soutien

En Suisse, 11,3% des répondants ont déclaré avoir besoin d'aide, en raison de problèmes de santé, pour des tâches telles que les travaux ménagers ou la préparation des repas. Ce pourcentage place la Suisse parmi les pays où les personnes âgées vivant à leur domicile expriment plutôt des besoins modérés d'aide et de soutien. La plupart du temps, ces personnes reçoivent effectivement l'aide dont elles ont besoin (toujours ou souvent pour 72,3%). Au total, on peut estimer que seuls 3,1% des répondants pour la Suisse auraient des besoins d'aide non satisfaits. La plupart du temps, les proches contribuent à l'aide reçue, que ce soit en combinaison avec une aide professionnelle ou non.

Moins de personnes en situation de polymédication majeure en Suisse que dans les autres pays participants

Avec 18,3% de répondants consommant régulièrement un minimum de cinq médicaments sur ordonnance, la Suisse apparaît comme le second pays après la France où la polymédication majeure est la moins développée. Il importe toutefois qu'une telle médication fasse l'objet d'un suivi par un professionnel de la santé. En Suisse, la plupart des personnes concernées confirment que leurs médicaments ont bel et bien été passés en revue (81,7%). Sur l'ensemble des répondants pour la Suisse, 3,1% seraient ainsi en situation de polymédication majeure, sans que leurs médicaments n'aient été examinés par un professionnel de la santé.

Un risque de chute élevé deux fois plus souvent mentionné en Suisse romande qu'en Suisse alémanique chez les 80+ ans

Parmi les personnes sondées en Suisse, seuls 2,5% des 75 à 79 ans considèrent que leur probabilité de chuter est élevée. Ce résultat indique que jusqu'à un âge avancé, les répondants pour la Suisse sont relativement confiants quant à leurs facultés motrices. Chez les 80 ans et plus, la part de répondants mentionnant un risque élevé passe cependant à 9,2% en Suisse alémanique et à 19,2% en Suisse romande. Cet écart peut notamment être le reflet de différents modes de prise en charge de la population âgée dans les cantons suisses.

Parmi les personnes voyant plusieurs médecins, trois sur quatre bénéficient d'une prise en charge médicale complète

Comme dans la plupart des autres pays participants, la quasi-totalité des répondants pour la Suisse dispose d'un médecin habituel (96,8%). En ajoutant des critères d'accessibilité ou d'aide à la coordination des soins, on peut considérer que parmi les répondants ayant consulté plus d'un médecin au cours des douze derniers, trois sur quatre bénéficient d'une prise en charge médicale complète (75,4%). Bien que ce résultat soit stable par rapport à 2014 (73,2%) il englobe des tendances divergentes. D'un côté, le médecin habituel fournit plus souvent une aide à la coordination des soins avec les autres prestataires (toujours ou souvent pour 85,3% des répondants en 2017 contre 78,2% en 2014. Mais d'un autre côté, il est devenu moins fréquent que les répondants parviennent à obtenir un rendez-vous chez le médecin le jour même ou le lendemain (de 63,9% à 46,5% pour l'ensemble des répondants pour la Suisse).

Diminution de l'accessibilité rapide des médecins de premier recours

Cette baisse de la part de répondants obtenant un rendez-vous chez leur médecin dans un délai court se produit dans presque tous les pays participants. En Suisse, la diminution est particulièrement rapide en Suisse alémanique (de 69,5% à 50,1% des répondants entre 2014 et 2017). La part de répondants faisant part d'un accès rapide à leur médecin reste cependant plus basse en Suisse romande (35,2% en 2017).

Trois répondants sur cinq sont ouverts à l'idée d'une substitution partielle du médecin par un autre professionnel spécialisé de la santé

Alors que dans les années à venir, la question de l'accès à un médecin de premier recours est amenée à se poser de façon particulièrement accrue, l'une des pistes avancées afin des répondre aux besoins de soins serait de substituer, pour certains soins ou traitements, le médecin par d'autres professionnels de la santé. En Suisse, 60,5% des répondants déclarent pouvoir effectivement s'imaginer recevoir la suite d'un traitement par autre professionnel de la santé que le médecin. Chez les répondants alémaniques, cette part atteint 66,6% alors qu'elle est de 48,3% chez les romands et de 35,8% chez les italophones.

Activités de prévention plutôt peu répandues en Suisse, avec d'importantes variations selon la région linguistique

Si les sujets de prévention sont plus fréquemment abordés en France et dans les pays anglo-saxons, il est moins commun que les répondants pour la Suisse déclarent avoir discuté avec leur médecin de sujets tels que l'activité physique (47,0%) ou l'alimentation (31,8%). Ces thèmes sont nettement plus souvent abordés au sein des cabinets de Suisse romande que dans ceux de Suisse alémanique, la Suisse italienne occupant une position intermédiaire.

Forte hausse en Suisse romande de la part de répondants ayant consulté au moins quatre médecins différents

Qu'il s'agisse du nombre de médecins consultés, du recours aux prestations des médecins spécialistes, du taux d'hospitalisation ou de l'utilisation de services d'urgence, les répondants pour la Suisse affichent un recours global aux prestations de santé plutôt moyen en comparaison avec les autres pays. Un changement notable par rapport à 2014 concerne la hausse de la part de répondants déclarant avoir consulté au moins quatre médecins différents au cours des douze derniers mois (de 8,1% à 14,7% en 2017). Pour la Suisse alémanique, cette augmentation, bien que modeste, s'avère significative (de 6,9% à 11,7%). Cette part a en fait surtout augmenté en Suisse romande où elle est passée de 10,6% à 23,1%. Pour les autres types de prestataires, le taux de recours est resté stable entre 2014 et 2017.

Les difficultés financières en lien avec les frais de santé s'accroissent en Suisse

Entre 2014 et 2017, la part de répondants pour la Suisse déclarant avoir renoncé pour des raisons de coûts à une consultation médicale, à des traitement ou examens de contrôle ou à l'achat de médicaments est passée de 6,3% à 13,2%. De plus, la part de répondants rapportant des difficultés à payer leurs factures médicales est passée de 2,3% à 4,3% au cours de cette période. Si de tels problèmes sont particulièrement aux États-Unis et en Australie, les répondants pour la Suisse sont aussi singulièrement touchés en comparaison avec ceux des autres pays européens.

Un potentiel d'amélioration qui demeure dans le domaine de la qualité et de la coordination des soins

Les résultats ayant trait à la qualité et à la coordination des soins sont restés assez stables entre 2014 et 2017, la Suisse ne se distinguant, en comparaison avec les autres pays, ni par une fréquence particulièrement élevée ni par une fréquence particulièrement basse de problèmes dans ces domaines. Un potentiel d'amélioration demeure donc tant pour ce qui concerne la qualité des soins, la coordination entre le médecin habituel et le médecin spécialiste ou le suivi des soins à la sortie de l'hôpital.

Progression de l'expression des choix de fin de vie, particulièrement en Suisse alémanique

Dans la perspective d'un renforcement du droit à l'autodétermination, il importe que les souhaits en matière de soins médicaux à recevoir soient formalisés. Dans ce domaine, une considérable progression des indicateurs « Souhaits en matière de traitements médicaux en fin de vie » est observée pour la Suisse. En 2017, 60,4% des répondants ont informé leurs proches ou un professionnel de la santé des traitements qu'ils ne souhaitent pas recevoir (54,2% en 2014) et 35,7% ont fait figurer leurs choix de fin de vie dans un document écrit (24,9% en 2014). Il est toutefois nettement plus fréquent que ces dispositions aient été prises en Suisse alémanique que dans le reste de la Suisse. Par exemple, plus de la moitié des répondants alémaniques âgés de 80 ans et plus ont préparé des directives anticipées écrites (55,4%) alors que, dans cette tranche d'âge, ce n'est le cas que de 27,5% des romands et 16,5% des italophones.

Bonne opinion de la qualité et de la quantité des soins médicaux délivrés

Globalement, 83,7% des répondants ayant reçu des soins médicaux au cours de l'année précédente se déclarent entièrement satisfaits ou très satisfaits, ce qui représente le meilleur résultat de la comparaison internationale. De plus, la très grande majorité de ces répondants déclare avoir reçu la quantité de soins appropriée (95,5%).

5 Bibliographie

- Dutoit, L., Pellegrini, S. & Füglistler-Dousse, S. (2016). Soins de longue durée dans les cantons. Trois modèles-types d'organisation (Obsan Bulletin 13/2016). Neuchâtel : Observatoire suisse de la santé.
- Camenzind, P. & Petrini, L. (2014). Personen ab 55 Jahren im Gesundheitssystem : Schweiz und internationaler Vergleich 2014. Auswertung der Erhebung «The Commonwealth Fund's 2014 International Survey of Older Adults» im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) (Obsan Dossier 43). Neuchâtel : Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Kohli, R., Bläuer, A., Perrenoud, S. & Babel, J. (2015). Les scénarios de l'évolution de la population de la Suisse 2015 – 2045. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique (OFS).
- Merçay, C. (2015). Médecins de premier recours – Situation en Suisse, tendances récentes et comparaison internationale. Analyse de l'International Health Policy Survey sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) (Obsan Dossier 50). Neuchâtel : Observatoire suisse de la santé.
- Merçay, C. (2016). Expérience de la population âgée de 18 ans et plus avec le système de santé – Situation en Suisse et comparaison internationale. Analyse de l'International Health Policy Survey sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) (Obsan Dossier 56). Neuchâtel : Observatoire suisse de la santé.
- Office fédéral de la statistique (OFS). Coût et financement du système de santé (modèle révisé 2017, état des données 2015).
- Rapoport, R. & Czyzewicz, E. (2017). 2017 International Health Policy Survey of Older Adults (65+). Methodology Report. SSRS.
- Schuler, D., Tuch, A., Buscher, N. & Camenzind, P. (2016). La santé psychique en Suisse. Monitoring 2016 (Obsan Rapport 72). Neuchâtel: Observatoire suisse de la santé.

6 Annexes

Afin d'avoir une vue d'ensemble de la manière dont la Suisse se situe par rapport aux autres pays, cinq thèmes ont été retenus : l'état de santé, la situation financière, le recours aux soins, la qualité et la coordination et les soins de premier recours. Pour chacun de ces thèmes, les résultats obtenus pour plusieurs questions ont été rassemblés. Par exemple, pour l'état de santé, on considère la part de répondants déclarant un état de santé auto-évalué bon/très bon/excellent, la part déclarant moins de deux maladies chroniques, la part ne mentionnant pas de détresse émotionnelle et parmi les 75 ans et plus, la part considérant ne présenter aucun risque de chute, un risque faible ou modéré. Pour chacun de ces indicateurs, la variable centrée réduite a été calculée. Cela permet ensuite de calculer une valeur moyenne des variables centrées réduites qui soit ne soit pas influencée par la moyenne ou la dispersion des données. De cette manière, chacune des variables retenues a le même poids dans le calcul de la valeur moyenne.

Les résultats obtenus (Tableau 6.10) sont ensuite représentés sous la forme de graphique en étoile (Figure 6.1, Figure 6.2, Figure 6.3 et Figure 6.4). Sur ces graphiques, plus les points sont éloignés du centre, plus les résultats sont positifs (meilleur état de santé, moins de difficultés financières, etc.). Pour le recours aux soins, on considère qu'un moindre recours aux différents prestataires de santé est un résultat positif. En effet, toutes choses étant égales par ailleurs, un moindre recours aux soins peut être considéré comme témoignant d'un système de santé plus performant.

Tableau 6.1 Indicateurs de l'état de santé, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017

| | État de santé auto-évalué bon/très bon/excellent | | Moins de deux maladies chroniques actuelles | | Détresse émotionnelle difficile à gérer soi-même (non) | | Aucun risque de chute, risque faible ou modéré (personnes de 75 ans et plus) | | Moyenne variable centrée réduite |
|------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | |
| AU | 88,2 | 1,9 | 53,0 | 0,3 | 72,2 | -2,1 | 95,0 | 1,4 | 0,4 |
| NZ | 80,6 | 0,8 | 43,3 | -0,9 | 80,2 | -0,4 | 89,4 | 0,2 | -0,1 |
| CH | 73,2 | -0,2 | 55,8 | 0,6 | 84,1 | 0,5 | 91,7 | 0,7 | 0,4 |
| NO | 80,7 | 0,9 | 46,0 | -0,6 | 80,2 | -0,4 | 83,0 | -1,2 | -0,3 |
| CA | 74,6 | 0,0 | 50,0 | -0,1 | 87,7 | 1,3 | 89,5 | 0,2 | 0,4 |
| UK | 71,2 | -0,4 | 59,6 | 1,1 | 79,4 | -0,5 | 86,6 | -0,4 | -0,1 |
| DE | 72,2 | -0,3 | 55,8 | 0,6 | 85,0 | 0,7 | 90,7 | 0,5 | 0,4 |
| FR | 79,2 | 0,7 | 62,1 | 1,4 | 83,8 | 0,4 | 93,5 | 1,1 | 0,9 |
| SE | 66,7 | -1,0 | 51,3 | 0,1 | 88,8 | 1,5 | 84,9 | -0,8 | -0,1 |
| US | 69,4 | -0,7 | 47,1 | -0,4 | 80,1 | -0,4 | 85,5 | -0,6 | -0,5 |
| NL | 62,2 | -1,7 | 32,8 | -2,2 | 79,4 | -0,5 | 83,8 | -1,0 | -1,3 |
| Moyenne | 74,4 | | 50,6 | | 81,9 | | 88,5 | | |
| Écart-type | 7,4 | | 8,2 | | 4,6 | | 4,6 | | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.2 Indicateurs de la situation financière, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017

| | Renoncement à des soins de santé pour des raisons de coûts | | Pas de difficultés à payer ses factures médicales | | Aucun type de difficulté matérielle rencontré "toujours" ou "généralement" | | Moyenne variable centrée réduite |
|------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | |
| AU | 86,3 | -0,7 | 86,4 | -2,3 | 95,7 | 0,7 | -0,8 |
| CA | 91,0 | 0,1 | 95,5 | 0,2 | 91,0 | -0,2 | 0,0 |
| CH | 86,8 | -0,6 | 95,6 | 0,3 | 87,1 | -0,9 | -0,4 |
| DE | 89,3 | -0,2 | 95,0 | 0,1 | 87,3 | -0,9 | -0,3 |
| FR | 95,4 | 0,8 | 95,1 | 0,1 | 92,5 | 0,1 | 0,3 |
| NL | 92,9 | 0,4 | 95,6 | 0,3 | 93,9 | 0,4 | 0,3 |
| NO | 96,1 | 0,9 | 97,4 | 0,8 | 97,6 | 1,1 | 0,9 |
| NZ | 89,3 | -0,2 | 96,5 | 0,5 | 95,4 | 0,6 | 0,3 |
| SE | 97,3 | 1,1 | 98,2 | 1,0 | 96,5 | 0,9 | 1,0 |
| UK | 95,8 | 0,9 | 97,0 | 0,6 | 94,5 | 0,5 | 0,7 |
| US | 77,0 | -2,3 | 89,1 | -1,5 | 79,4 | -2,3 | -2,1 |
| Moyenne | 90,7 | | 94,7 | | 91,9 | | |
| Écart-type | 5,9 | | 3,6 | | 5,4 | | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.3 Indicateurs du recours aux soins, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017

| | A consulté moins de quatre médecins (douze derniers mois) | | N'a pas consulté de spécialiste (deux dernières années) | | N'a pas eu recours aux services d'urgence (deux dernières années) | | N'a pas été hospitalisé (deux dernières années) | | Consomme moins de deux médicaments | | Moyenne variable centrée réduite |
|------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | |
| AU | 88,3 | 0,7 | 34,1 | -0,7 | 57,8 | -1,4 | 70,3 | -0,3 | 28,8 | -0,4 | -0,4 |
| CA | 84,5 | 0,1 | 38,4 | 0,0 | 61,2 | -1,0 | 77,6 | 0,8 | 26,2 | -0,8 | -0,2 |
| CH | 85,2 | 0,2 | 34,4 | -0,7 | 73,2 | 0,7 | 68,0 | -0,7 | 33,7 | 0,6 | 0,0 |
| DE | 72,4 | -1,9 | 29,4 | -1,5 | 69,9 | 0,2 | 59,9 | -1,9 | 30,7 | 0,0 | -1,0 |
| FR | 88,0 | 0,7 | 47,4 | 1,4 | 80,6 | 1,7 | 84,0 | 1,9 | 37,2 | 1,2 | 1,4 |
| NL | 86,6 | 0,5 | 33,7 | -0,8 | 77,2 | 1,2 | 73,1 | 0,1 | 32,3 | 0,3 | 0,3 |
| NO | 92,1 | 1,4 | 46,5 | 1,3 | 73,6 | 0,7 | 66,9 | -0,8 | 34,5 | 0,7 | 0,7 |
| NZ | 86,5 | 0,4 | 42,8 | 0,7 | 65,9 | -0,3 | 74,4 | 0,3 | 37,9 | 1,4 | 0,5 |
| SE | 83,9 | 0,0 | 42,4 | 0,6 | 63,4 | -0,7 | 71,4 | -0,1 | 30,1 | -0,1 | -0,1 |
| UK | 80,2 | -0,6 | 42,7 | 0,7 | 67,0 | -0,2 | 77,2 | 0,8 | 25,4 | -1,0 | -0,1 |
| US | 74,3 | -1,6 | 32,7 | -1,0 | 60,8 | -1,0 | 71,7 | -0,1 | 20,5 | -1,9 | -1,1 |
| Moyenne | 83,8 | | 38,6 | | 68,2 | | 72,2 | | 30,7 | | |
| Écart-type | 6,0 | | 6,1 | | 7,3 | | 6,3 | | 5,3 | | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.4 Indicateurs de qualité et de coordination, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017

| | Pas de problème de coordination en recevant des soins | | Pas de problème de coordination entre le spécialiste et le médecin habituel (personnes ayant consulté les deux professionnels) | | Pas de lacune dans les dispositions prises à la sortie de l'hôpital (personnes hospitalisées) | | Médicaments n'ont pas été passés en revue (personnes prenant au moins deux médicaments) | | Moyenne variable centrée réduite |
|------------|---|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | |
| AU | 76,7 | -0,2 | 89,7 | 1,1 | 69,9 | 1,2 | 85,9 | 1,1 | 0,8 |
| CA | 76,5 | -0,2 | 84,9 | 0,3 | 55,7 | 0,2 | 80,9 | 0,7 | 0,3 |
| CH | 73,0 | -0,7 | 82,2 | -0,1 | 53,5 | 0,1 | 72,4 | 0,1 | -0,1 |
| DE | 67,7 | -1,4 | 74,2 | -1,4 | 50,8 | -0,1 | 57,5 | -1,0 | -1,0 |
| FR | 92,6 | 2,1 | 92,9 | 1,6 | 49,5 | -0,2 | 56,1 | -1,1 | 0,6 |
| NL | 86,1 | 1,2 | 83,3 | 0,1 | 29,3 | -1,5 | 65,4 | -0,4 | -0,2 |
| NO | 82,0 | 0,6 | 80,3 | -0,4 | 29,7 | -1,5 | 61,8 | -0,7 | -0,5 |
| NZ | 80,8 | 0,4 | 88,3 | 0,9 | 74,3 | 1,4 | 88,9 | 1,3 | 1,0 |
| SE | 76,0 | -0,3 | 74,0 | -1,4 | 40,8 | -0,7 | 53,3 | -1,3 | -0,9 |
| UK | 74,5 | -0,5 | 84,0 | 0,2 | 49,3 | -0,2 | 72,7 | 0,1 | -0,1 |
| US | 70,5 | -1,0 | 77,1 | -0,9 | 71,1 | 1,2 | 87,9 | 1,3 | 0,1 |
| Moyenne | 77,9 | | 82,8 | | 52,2 | | 71,2 | | |
| Écart-type | 7,1 | | 6,1 | | 15,3 | | 13,3 | | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.5 Indicateurs des soins de premier recours – Accès au médecin, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017

| | Très/assez facile de recevoir des soins médicaux le soir, le week-end ou les jours fériés | | Obtient un rendez-vous chez le médecin le jour-même ou le lendemain | | Reçoit toujours/souvent une réponse le jour même lorsque contacte son médecin pour un problème médical | | Moyenne variable centrée réduite |
|------------|---|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|
| | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | |
| AU | 44,2 | -0,3 | 65,9 | 1,4 | 87,9 | 0,9 | 0,6 |
| CA | 36,0 | -0,9 | 36,7 | -1,1 | 70,5 | -1,5 | -1,2 |
| CH | 42,7 | -0,4 | 46,5 | -0,3 | 91,1 | 1,3 | 0,2 |
| DE | 47,5 | -0,1 | 40,4 | -0,8 | 88,0 | 0,9 | 0,0 |
| FR | 52,3 | 0,3 | 71,4 | 1,9 | 85,7 | 0,6 | 0,9 |
| NL | 74,3 | 1,9 | 48,9 | -0,1 | 85,9 | 0,6 | 0,8 |
| NO | 63,5 | 1,1 | 60,7 | 0,9 | 77,1 | -0,6 | 0,5 |
| NZ | 57,5 | 0,7 | 41,2 | -0,8 | 88,0 | 0,9 | 0,3 |
| SE | 25,9 | -1,6 | 38,0 | -1,0 | 73,6 | -1,1 | -1,2 |
| UK | 34,4 | -1,0 | 46,9 | -0,3 | 74,4 | -1,0 | -0,8 |
| US | 54,3 | 0,4 | 52,3 | 0,2 | 76,1 | -0,8 | 0,0 |
| Moyenne | 48,4 | | 49,9 | | 81,7 | | |
| Écart-type | 13,9 | | 11,6 | | 7,3 | | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.6 Indicateurs des soins de premier recours – Déroulement de la consultation, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017

| | Connait (toujours/souvent) les informations importantes du passé médical | | Passe assez de temps avec le patient (toujours/souvent) | | Patient encouragé à poser des questions (toujours/souvent) | | Explique les choses clairement (toujours/souvent) | | Moyenne variable centrée réduite |
|------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | |
| AU | 89,0 | 0,7 | 90,7 | 1,1 | 84,9 | 1,2 | 93,7 | 1,1 | 1,0 |
| CA | 85,9 | 0,3 | 83,2 | -0,2 | 69,6 | 0,3 | 88,7 | 0,1 | 0,1 |
| CH | 89,3 | 0,7 | 88,5 | 0,7 | 63,6 | 0,0 | 90,9 | 0,5 | 0,5 |
| DE | 84,7 | 0,2 | 84,7 | 0,1 | 60,6 | -0,2 | 85,9 | -0,5 | -0,1 |
| FR | 87,9 | 0,6 | 85,3 | 0,2 | 75,7 | 0,7 | 92,0 | 0,7 | 0,5 |
| NL | 86,7 | 0,4 | 90,5 | 1,0 | 51,8 | -0,7 | 89,3 | 0,2 | 0,2 |
| NO | 73,9 | -1,0 | 81,2 | -0,5 | 37,8 | -1,5 | 85,7 | -0,6 | -0,9 |
| NZ | 91,1 | 0,9 | 90,3 | 1,0 | 85,9 | 1,2 | 94,3 | 1,2 | 1,1 |
| SE | 61,0 | -2,4 | 72,8 | -2,0 | 35,4 | -1,6 | 78,1 | -2,1 | -2,0 |
| UK | 74,5 | -0,9 | 75,8 | -1,4 | 58,3 | -0,3 | 83,4 | -1,0 | -0,9 |
| US | 86,3 | 0,4 | 84,7 | 0,1 | 81,3 | 1,0 | 91,0 | 0,5 | 0,5 |
| Moyenne | 82,8 | | 84,3 | | 64,1 | | 88,5 | | |
| Écart-type | 9,2 | | 5,9 | | 17,6 | | 4,8 | | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.7 Indicateurs des soins de premier recours – Pratiques de prévention, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017

| | Discussion avec un professionnel de la santé | | | | | | | | Moyenne variable centrée réduite |
|------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Alimentation et nourriture saines | | Exercices ou activités physiques | | Choses qui vous inquiètent ou vous stressent dans la vie | | Consommation d'alcool | | |
| | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | Part en % | Variable centrée réduite | |
| AU | 46,7 | 0,4 | 49,7 | 0,1 | 31,3 | 1,5 | 24,0 | 1,1 | 0,8 |
| CA | 44,7 | 0,2 | 51,8 | 0,3 | 20,3 | 0,1 | 16,8 | -0,2 | 0,1 |
| CH | 31,8 | -0,8 | 47,0 | -0,2 | 17,7 | -0,3 | 10,5 | -1,3 | -0,6 |
| DE | 39,9 | -0,1 | 46,7 | -0,3 | 14,5 | -0,7 | 11,6 | -1,1 | -0,6 |
| FR | 64,2 | 1,7 | 57,2 | 0,9 | 29,4 | 1,3 | 27,9 | 1,8 | 1,4 |
| NL | 23,9 | -1,4 | 36,6 | -1,5 | 17,1 | -0,4 | 13,7 | -0,7 | -1,0 |
| NO | 29,6 | -0,9 | 46,3 | -0,3 | 11,3 | -1,1 | 11,5 | -1,1 | -0,9 |
| NZ | 50,1 | 0,7 | 51,5 | 0,3 | 25,9 | 0,8 | 21,7 | 0,7 | 0,6 |
| SE | 27,9 | -1,1 | 43,2 | -0,7 | 9,0 | -1,4 | 18,5 | 0,1 | -0,8 |
| UK | 40,6 | -0,1 | 41,4 | -0,9 | 13,8 | -0,8 | 19,9 | 0,4 | -0,3 |
| US | 59,0 | 1,3 | 68,9 | 2,3 | 27,4 | 1,0 | 18,5 | 0,1 | 1,2 |
| Moyenne | 41,7 | | 49,1 | | 19,8 | | 17,7 | | |
| Écart-type | 12,9 | | 8,6 | | 7,6 | | 5,6 | | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.8 Indicateurs des soins de premier recours – Aide à la coordination, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017

| Aide du médecin habituel à la coordination avec d'autres médecins ou d'autres soins (répondants ayant un médecin régulier et ayant consulté plus d'un médecin) | | |
|--|-------------|--------------------------|
| | Part en % | Variable centrée réduite |
| AU | 88,0 | 1,1 |
| CA | 80,7 | 0,5 |
| CH | 85,3 | 0,8 |
| DE | 80,6 | 0,4 |
| FR | 72,7 | -0,2 |
| NL | 66,3 | -0,7 |
| NO | 74,5 | -0,1 |
| NZ | 91,0 | 1,3 |
| SE | 50,8 | -2,0 |
| UK | 61,6 | -1,1 |
| US | 76,1 | 0,1 |
| Moyenne | 75,2 | |
| Écart-type | 12,0 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.9 Indicateurs des soins de premier recours, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017

| | Accès | Consultation | Prévention | Aide à la coordination | Moyenne variable centrée réduite |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Variable centrée réduite | Variable centrée réduite | Variable centrée réduite | Variable centrée réduite | |
| AU | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
| CA | -1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | -0,1 |
| CH | 0,2 | 0,5 | -0,6 | 0,8 | 0,2 |
| DE | 0,0 | -0,1 | -0,6 | 0,4 | -0,1 |
| FR | 0,9 | 0,5 | 1,4 | -0,2 | 0,7 |
| NL | 0,8 | 0,2 | -1,0 | -0,7 | -0,2 |
| NO | 0,5 | -0,9 | -0,9 | -0,1 | -0,3 |
| NZ | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 0,8 |
| SE | -1,2 | -2,0 | -0,8 | -2,0 | -1,5 |
| UK | -0,8 | -0,9 | -0,3 | -1,1 | -0,8 |
| US | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 0,4 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017


Tableau 6.10 Indicateurs de l'expérience du système de santé, variables centrées réduites moyenne, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017

| | État de santé (Tableau 6.1) | Situation financière (Tableau 6.2) | Recours aux soins (Tableau 6.3) | Qualité et coordination (Tableau 6.4) | Soins de premier recours (Tableau 6.9) |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| AU | 0,4 | -0,8 | -0,4 | 0,8 | 0,9 |
| CA | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | -0,1 |
| CH | 0,4 | -0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,2 |
| DE | -0,3 | -0,3 | -1,0 | -1,0 | -0,1 |
| FR | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 0,6 | 0,7 |
| NL | -0,1 | 0,3 | 0,3 | -0,2 | -0,2 |
| NO | 0,4 | 0,9 | 0,7 | -0,5 | -0,3 |
| NZ | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,8 |
| SE | -0,1 | 1,0 | -0,1 | -0,9 | -1,5 |
| UK | -0,5 | 0,7 | -0,1 | -0,1 | -0,8 |
| US | -1,3 | -2,1 | -1,1 | 0,1 | 0,4 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Figure 6.1 Expérience du système de santé, indicateurs pour cinq dimensions, personnes de 65 ans et plus, Suisse, Allemagne et Pays-Bas, 2017




Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Note : Plus les points sont éloignés du centre, plus les résultats sont positifs.

Figure 6.2 Expérience du système de santé, indicateurs pour cinq dimensions, personnes de 65 ans et plus, Suisse, Suède et États-Unis, 2017




Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Note : Plus les points sont éloignés du centre, plus les résultats sont positifs.

Figure 6.3 Expérience du système de santé, personnes de 65 ans et plus, indicateurs pour cinq dimensions Suisse, Australie et Canada, 2017




Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Note : Plus les points sont éloignés du centre, plus les résultats sont positifs.

Figure 6.4 Expérience du système de santé, indicateurs pour cinq dimensions, personnes de 65 ans et plus, Suisse, Norvège et Royaume-Uni, 2017



Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Note : Plus les points sont éloignés du centre, plus les résultats sont positifs.

Question Q800 : De manière générale, dans quelle mesure êtes-vous satisfait/e de la qualité des soins médicaux que vous avez reçus au cours des douze derniers mois ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.11 Satisfaction concernant la qualité des soins reçus au cours des douze derniers mois, comparaison internationale (2017, en %)

| | Entièrement satisfait/e | | | Très satisfait/e | | | Moyennement satisfait/e | | | Pas satisfait/e du tout | | | N'a pas reçu de soins médicaux | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| NO | 41,2 | 36,9 | 45,4 | 34,6 | 30,5 | 38,7 | 14,2 | 11,3 | 17,2 | 1,3 | 0,3 | 2,4 | 7,0 | 4,7 | 9,2 | 1,7 | 0,7 | 2,8 | 750 |
| NL | 40,7 | 36,8 | 44,5 | 28,8 | 25,3 | 32,3 | 18,2 | 15,3 | 21,2 | 3,9 | 2,4 | 5,3 | 7,2 | 5,3 | 9,2 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | 750 |
| US | 40,5 | 37,2 | 43,9 | 31,8 | 28,7 | 34,9 | 18,8 | 16,0 | 21,5 | 5,6 | 3,9 | 7,4 | 1,7 | 0,7 | 2,6 | 1,6 | 0,6 | 2,6 | 1392 |
| NZ | 35,6 | 30,7 | 40,5 | 45,5 | 40,4 | 50,6 | 14,4 | 10,9 | 18,0 | 3,5 | 1,7 | 5,2 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | . | . | . | 500 |
| UK | 34,3 | 30,5 | 38,1 | 36,6 | 32,8 | 40,5 | 18,2 | 15,1 | 21,2 | 4,2 | 2,7 | 5,6 | 4,6 | 2,9 | 6,2 | 2,2 | 0,9 | 3,4 | 753 |
| DE | 33,3 | 29,6 | 37,0 | 37,7 | 33,8 | 41,5 | 20,7 | 17,4 | 23,9 | 3,2 | 1,7 | 4,8 | 4,0 | 2,4 | 5,5 | 1,2 | 0,4 | 1,9 | 751 |
| SE | 33,3 | 31,9 | 34,7 | 36,8 | 35,4 | 38,2 | 13,4 | 12,4 | 14,4 | 4,6 | 4,0 | 5,2 | 11,6 | 10,7 | 12,6 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 7000 |
| CA | 30,5 | 28,7 | 32,2 | 32,4 | 30,6 | 34,2 | 26,8 | 24,9 | 28,6 | 4,9 | 4,1 | 5,7 | 4,0 | 3,3 | 4,8 | 1,4 | 1,0 | 1,9 | 4549 |
| AU | 30,4 | 27,0 | 33,8 | 38,9 | 35,1 | 42,7 | 24,3 | 20,9 | 27,7 | 3,2 | 2,1 | 4,4 | 2,8 | 1,9 | 3,7 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2500 |
| CH | 29,7 | 27,5 | 32,0 | 48,6 | 46,1 | 51,0 | 14,0 | 12,3 | 15,6 | 1,2 | 0,7 | 1,8 | 6,4 | 5,2 | 7,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 3238 |
| FR | 15,4 | 12,7 | 18,1 | 51,1 | 47,3 | 55,0 | 28,7 | 25,1 | 32,3 | 3,3 | 2,0 | 4,6 | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.12 Satisfaction concernant la qualité des soins reçus au cours des douze derniers mois, Suisse (2017, en %)

| | Entièrement satisfait/e | | | Très satisfait/e | | | Moyennement satisfait/e | | | Pas satisfait/e du tout | | | N'a pas reçu de soins médicaux | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 29,7 | 27,5 | 32,0 | 48,6 | 46,1 | 51,0 | 14,0 | 12,3 | 15,6 | 1,2 | 0,7 | 1,8 | 6,4 | 5,2 | 7,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 3238 |
| Homme | 31,5 | 28,2 | 34,9 | 47,0 | 43,4 | 50,5 | 14,7 | 12,2 | 17,2 | 1,5 | 0,6 | 2,4 | 5,3 | 3,7 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1526 |
| Femme | 28,3 | 25,3 | 31,3 | 49,9 | 46,5 | 53,2 | 13,4 | 11,2 | 15,5 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 7,4 | 5,6 | 9,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1712 |
| 65–69 ans | 27,1 | 22,9 | 31,3 | 50,2 | 45,5 | 55,0 | 13,1 | 10,1 | 16,2 | 2,0 | 0,6 | 3,5 | 7,5 | 5,1 | 9,8 | . | . | . | 828 |
| 70–74 ans | 30,9 | 26,7 | 35,1 | 47,8 | 43,1 | 52,4 | 13,4 | 10,3 | 16,4 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 7,5 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 954 |
| 75–79 ans | 29,3 | 24,5 | 34,1 | 47,4 | 42,1 | 52,8 | 16,2 | 12,3 | 20,0 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 6,5 | 3,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697 |
| 80+ ans | 31,9 | 27,2 | 36,7 | 48,4 | 43,4 | 53,5 | 13,6 | 10,3 | 17,0 | 1,8 | 0,3 | 3,2 | 4,1 | 1,9 | 6,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 26,3 | 21,8 | 30,9 | 47,0 | 41,9 | 52,2 | 18,1 | 14,2 | 22,0 | 2,7 | 0,9 | 4,4 | 5,8 | 3,5 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 706 |
| Secondaire II | 29,2 | 26,4 | 32,1 | 51,4 | 48,2 | 54,5 | 11,9 | 9,9 | 13,9 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 6,6 | 5,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1765 |
| Tertiaire | 38,5 | 33,1 | 43,9 | 38,2 | 32,9 | 43,5 | 15,6 | 11,7 | 19,6 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 6,9 | 4,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 30,6 | 27,9 | 33,2 | 48,6 | 45,7 | 51,5 | 13,1 | 11,3 | 15,0 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 6,6 | 5,2 | 8,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 27,4 | 23,1 | 31,6 | 48,4 | 43,6 | 53,3 | 16,3 | 12,8 | 19,8 | 2,0 | 0,6 | 3,4 | 5,8 | 3,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 807 |
| Né en Suisse | 31,2 | 28,6 | 33,8 | 49,2 | 46,4 | 52,1 | 12,7 | 10,9 | 14,5 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 5,7 | 4,4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2217 |
| Né à l'étranger | 24,1 | 20,0 | 28,1 | 46,5 | 41,6 | 51,4 | 18,3 | 14,5 | 22,2 | 1,9 | 0,4 | 3,4 | 9,1 | 6,3 | 11,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1015 |
| Medical Home | 32,6 | 28,8 | 36,3 | 52,7 | 48,7 | 56,7 | 13,0 | 10,4 | 15,6 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1249 |
| Sans Medical Home | 16,8 | 12,7 | 20,9 | 44,7 | 39,2 | 50,3 | 25,5 | 20,7 | 30,3 | 3,2 | 1,0 | 5,4 | 9,7 | 6,3 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 726 |
| Malade | 30,0 | 25,8 | 34,2 | 51,9 | 47,3 | 56,5 | 15,7 | 12,4 | 18,9 | 1,9 | 0,5 | 3,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 948 |
| Non-malade | 30,2 | 27,5 | 32,9 | 46,6 | 43,6 | 49,6 | 13,2 | 11,2 | 15,2 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 9,0 | 7,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 34,5 | 28,2 | 40,8 | 51,6 | 45,0 | 58,1 | 12,7 | 8,6 | 16,8 | 1,1 | 0,0 | 2,6 | . | . | . | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 21,5 | 12,6 | 30,4 | 51,4 | 40,6 | 62,3 | 23,6 | 14,4 | 32,9 | 3,4 | 0,0 | 7,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | . | . | . | 210 |
| Ville | 33,8 | 29,5 | 38,1 | 43,4 | 38,8 | 47,9 | 15,0 | 11,8 | 18,1 | 2,0 | 0,6 | 3,3 | 5,9 | 3,7 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1026 |
| Agglomération | 27,7 | 24,5 | 30,8 | 51,0 | 47,4 | 54,6 | 12,7 | 10,4 | 15,1 | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 7,2 | 5,4 | 9,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1643 |
| Zone rurale | 29,4 | 24,2 | 34,5 | 50,3 | 44,6 | 56,0 | 14,8 | 11,0 | 18,6 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 5,0 | 2,6 | 7,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 29,6 | 26,6 | 32,6 | 50,6 | 47,4 | 53,9 | 12,5 | 10,4 | 14,7 | 1,3 | 0,5 | 2,1 | 5,9 | 4,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1040 |
| Suisse romande | 31,0 | 27,9 | 34,1 | 43,9 | 40,6 | 47,2 | 16,4 | 13,9 | 18,9 | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 7,4 | 5,6 | 9,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1869 |
| Suisse italienne | 26,5 | 21,6 | 31,3 | 42,5 | 36,9 | 48,0 | 21,2 | 16,6 | 25,8 | 1,3 | 0,1 | 2,5 | 8,6 | 5,5 | 11,8 | . | . | . | 329 |
| ZH | 30,5 | 25,4 | 35,6 | 52,1 | 46,5 | 57,6 | 10,1 | 6,8 | 13,4 | 1,8 | 0,4 | 3,3 | 5,3 | 2,8 | 7,9 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 332 |
| CH sans ZH | 29,6 | 27,1 | 32,1 | 47,8 | 45,1 | 50,6 | 14,8 | 12,9 | 16,6 | 1,1 | 0,5 | 1,8 | 6,6 | 5,3 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2906 |
| VD | 32,0 | 26,8 | 37,2 | 43,0 | 37,4 | 48,7 | 17,5 | 13,2 | 21,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 7,4 | 4,4 | 10,3 | . | . | . | 324 |
| CH sans VD | 29,5 | 27,1 | 31,9 | 49,1 | 46,4 | 51,7 | 13,6 | 11,9 | 15,4 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | 6,3 | 5,1 | 7,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2914 |
| VS | 28,0 | 22,8 | 33,2 | 45,1 | 39,3 | 51,0 | 19,3 | 14,5 | 24,1 | 1,1 | 0,0 | 2,2 | 6,2 | 3,1 | 9,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 321 |
| CH sans VS | 29,8 | 27,5 | 32,2 | 48,7 | 46,2 | 51,3 | 13,7 | 12,0 | 15,4 | 1,3 | 0,7 | 1,8 | 6,4 | 5,2 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2917 |
| GE | 33,8 | 30,9 | 36,7 | 46,2 | 43,2 | 49,3 | 12,5 | 10,4 | 14,6 | 1,5 | 0,8 | 2,2 | 5,7 | 4,3 | 7,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1160 |
| CH sans GE | 29,5 | 27,1 | 31,9 | 48,7 | 46,1 | 51,3 | 14,0 | 12,3 | 15,8 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 6,5 | 5,2 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q810 : Durant les douze derniers mois, vous est-il arrivé ... ?

- De ne pas avoir retiré un médicament sur ordonnance ou de ne pas avoir pris des doses de votre médicament pour des raisons de coût. (A1)
- D’avoir eu un problème médical mais de ne pas avoir consulté un docteur à cause du coût. (A2)
- De ne pas avoir effectué pour des raisons de coût un test médical, un traitement ou un examen de contrôle recommandé par un médecin. (A3)
- De ne pas avoir consulté un dentiste quand vous en aviez besoin à cause du coût. (A4)

Base : Tous les répondants sauf les « non concernés ».

Tableau 6.13 Renoncement à différents types de soins de santé pour des raisons de coûts, comparaison internationale (2017, en %)

| Médicaments | | | | Consultation médicale | | | | Test/traitement/examen de contrôle | | | | Consultation chez le dentiste | | | | Échantillon |
|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 14,0 | 11,5 | 16,5 | US | 9,8 | 7,6 | 12,0 | US | 12,5 | 10,1 | 14,9 | AU | 23,0 | 19,7 | 26,2 | 2439 |
| AU | 5,9 | 3,8 | 8,0 | AU | 6,9 | 4,6 | 9,1 | AU | 8,2 | 6,0 | 10,4 | US | 20,7 | 17,8 | 23,7 | 1362 |
| NZ | 5,3 | 2,9 | 7,6 | CH | 6,6 | 5,3 | 7,9 | NZ | 6,7 | 4,3 | 9,1 | NZ | 17,5 | 13,9 | 21,2 | 496 |
| CA | 5,0 | 4,1 | 6,0 | NZ | 6,4 | 4,2 | 8,6 | CH | 5,3 | 4,2 | 6,5 | CA | 17,4 | 15,9 | 19,0 | 4417 |
| CH | 4,6 | 3,5 | 5,7 | DE | 3,6 | 2,0 | 5,1 | DE | 5,2 | 3,3 | 7,0 | CH | 12,7 | 11,1 | 14,3 | 3048 |
| DE | 4,5 | 2,7 | 6,2 | NL | 3,0 | 1,7 | 4,2 | CA | 3,8 | 3,0 | 4,6 | NO | 7,2 | 4,9 | 9,4 | 747 |
| NL | 3,0 | 1,6 | 4,4 | CA | 2,8 | 2,2 | 3,5 | NL | 3,8 | 2,3 | 5,4 | SE | 7,1 | 6,3 | 7,8 | 6771 |
| FR | 1,9 | 0,9 | 3,0 | FR | 2,3 | 1,2 | 3,5 | UK | 2,5 | 1,2 | 3,8 | UK | 7,1 | 5,0 | 9,2 | 727 |
| NO | 1,8 | 0,7 | 3,0 | UK | 1,5 | 0,6 | 2,3 | FR | 2,3 | 1,3 | 3,3 | FR | 6,0 | 4,2 | 7,8 | 746 |
| SE | 1,6 | 1,2 | 2,0 | NO | 0,9 | 0,1 | 1,8 | NO | 2,0 | 0,8 | 3,2 | DE | 4,4 | 2,8 | 6,0 | 736 |
| UK | 0,8 | 0,2 | 1,5 | SE | 0,8 | 0,6 | 1,1 | SE | 0,8 | 0,6 | 1,1 | NL | 4,3 | 2,7 | 5,9 | 713 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.14 Renoncement à différents types de soins de santé pour des raisons de coûts, comparaison internationale (2014, en %)

| Médicaments | | | | Consultation médicale | | | | Test/traitement/examen de contrôle | | | | Échantillon |
|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 11,5 | 8,9 | 14,1 | US | 9,3 | 6,8 | 11,9 | US | 10,0 | 7,5 | 12,4 | 1108 |
| CA | 4,7 | 3,7 | 5,7 | NZ | 5,3 | 2,1 | 8,5 | NZ | 5,5 | 2,1 | 8,9 | 375 |
| NZ | 4,2 | 1,4 | 7,0 | AU | 3,6 | 2,0 | 5,2 | AU | 5,4 | 2,8 | 8,1 | 1657 |
| AU | 4,0 | 1,7 | 6,4 | CA | 3,3 | 2,5 | 4,1 | CA | 4,1 | 3,2 | 5,1 | 3133 |
| DE | 3,3 | 1,7 | 4,9 | DE | 3,0 | 1,1 | 4,9 | DE | 3,5 | 1,6 | 5,3 | 547 |
| NL | 2,3 | 0,9 | 3,7 | NL | 2,7 | 1,4 | 4,0 | CH | 3,3 | 2,0 | 4,6 | 1058 |
| CH | 2,2 | 1,2 | 3,2 | UK | 2,4 | 1,1 | 3,7 | NL | 3,1 | 1,2 | 4,9 | 576 |
| UK | 2,1 | 0,8 | 3,3 | CH | 2,1 | 1,2 | 3,1 | UK | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 579 |
| NO | 1,5 | 0,3 | 2,7 | FR | 2,0 | 1,0 | 2,9 | FR | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 860 |
| SE | 1,5 | 1,0 | 2,0 | SE | 1,5 | 1,0 | 1,9 | SE | 1,6 | 1,0 | 2,1 | 4950 |
| FR | 1,2 | 0,5 | 1,9 | NO | 1,2 | 0,3 | 2,1 | NO | 1,2 | 0,1 | 2,3 | 645 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.15 Renoncement à différents types de soins de santé pour des raisons de coûts, Suisse (2017, en %)

| | Médicaments | | | Consultation médicale | | | Test/traitement/examen de contrôle | | | Consultation chez le dentiste | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 4,6 | 3,5 | 5,7 | 6,6 | 5,3 | 7,9 | 5,3 | 4,2 | 6,5 | 12,7 | 11,1 | 14,3 | 3003 |
| Homme | 5,2 | 3,5 | 6,9 | 7,6 | 5,5 | 9,7 | 6,3 | 4,5 | 8,2 | 13,2 | 10,7 | 15,7 | 1419 |
| Femme | 4,1 | 2,7 | 5,5 | 5,8 | 4,2 | 7,5 | 4,5 | 3,1 | 5,9 | 12,3 | 10,1 | 14,4 | 1584 |
| 65-69 ans | 5,4 | 3,1 | 7,7 | 8,1 | 5,4 | 10,8 | 6,0 | 3,8 | 8,2 | 16,3 | 12,8 | 19,9 | 764 |
| 70-74 ans | 6,0 | 3,6 | 8,4 | 8,9 | 6,0 | 11,9 | 7,7 | 5,0 | 10,3 | 13,9 | 10,8 | 17,1 | 883 |
| 75-79 ans | 4,5 | 2,3 | 6,7 | 4,5 | 2,3 | 6,7 | 3,6 | 1,5 | 5,6 | 9,8 | 6,8 | 12,8 | 656 |
| 80+ ans | 2,6 | 0,9 | 4,2 | 4,4 | 2,2 | 6,6 | 3,8 | 1,8 | 5,8 | 9,7 | 6,6 | 12,8 | 710 |
| Scolarité obligatoire | 6,1 | 3,5 | 8,8 | 8,5 | 5,5 | 11,4 | 6,1 | 3,5 | 8,7 | 15,9 | 12,1 | 19,7 | 665 |
| Secondaire II | 3,8 | 2,6 | 5,1 | 5,7 | 4,1 | 7,3 | 4,1 | 2,9 | 5,4 | 11,7 | 9,7 | 13,8 | 1628 |
| Tertiaire | 5,5 | 2,5 | 8,6 | 7,6 | 4,4 | 10,9 | 9,7 | 5,9 | 13,6 | 11,6 | 8,0 | 15,3 | 683 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 4,4 | 3,2 | 5,7 | 5,8 | 4,4 | 7,2 | 5,2 | 3,9 | 6,5 | 9,8 | 8,1 | 11,5 | 2260 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 5,2 | 3,0 | 7,4 | 8,8 | 5,8 | 11,7 | 5,9 | 3,6 | 8,2 | 20,8 | 16,9 | 24,8 | 743 |
| Né en Suisse | 4,1 | 2,9 | 5,2 | 5,5 | 4,2 | 6,9 | 4,8 | 3,5 | 6,1 | 10,5 | 8,7 | 12,3 | 2053 |
| Né à l'étranger | 6,6 | 3,8 | 9,4 | 10,6 | 7,2 | 13,9 | 7,0 | 4,4 | 9,5 | 21,0 | 17,0 | 25,1 | 945 |
| Medical Home | 4,8 | 3,0 | 6,6 | 4,7 | 2,9 | 6,5 | 5,4 | 3,6 | 7,2 | 12,2 | 9,7 | 14,7 | 1204 |
| Sans Medical Home | 7,6 | 4,4 | 10,7 | 15,4 | 10,9 | 19,8 | 7,3 | 4,3 | 10,3 | 22,8 | 17,9 | 27,7 | 1191 |
| Malade | 3,8 | 1,9 | 5,6 | 5,8 | 3,5 | 8,1 | 5,5 | 3,3 | 7,8 | 14,9 | 11,6 | 18,1 | 687 |
| Non-malade | 5,1 | 3,7 | 6,5 | 6,7 | 5,1 | 8,3 | 5,3 | 3,9 | 6,6 | 11,5 | 9,6 | 13,4 | 900 |
| Malade avec Medical Home | 3,8 | 1,2 | 6,5 | 3,6 | 1,1 | 6,0 | 6,3 | 2,9 | 9,8 | 13,2 | 9,1 | 17,2 | 2054 |
| Malade sans Medical Home | 9,0 | 1,9 | 16,1 | 16,8 | 7,4 | 26,2 | 7,1 | 1,1 | 13,0 | 30,9 | 20,0 | 41,7 | 441 |
| Ville | 3,5 | 1,9 | 5,1 | 5,7 | 3,6 | 7,8 | 5,3 | 3,2 | 7,4 | 13,7 | 10,6 | 16,8 | 205 |
| Agglomération | 4,8 | 3,2 | 6,5 | 6,7 | 4,7 | 8,6 | 5,7 | 4,0 | 7,5 | 12,3 | 10,0 | 14,6 | 1534 |
| Zone rurale | 6,6 | 3,6 | 9,5 | 8,1 | 4,9 | 11,4 | 5,2 | 2,6 | 7,8 | 11,1 | 7,5 | 14,8 | 415 |
| Suisse alémanique | 4,3 | 2,9 | 5,8 | 6,7 | 5,0 | 8,5 | 5,5 | 3,9 | 7,1 | 10,2 | 8,2 | 12,3 | 914 |
| Suisse romande | 5,5 | 4,0 | 7,0 | 6,4 | 4,7 | 8,0 | 5,3 | 4,0 | 6,6 | 19,8 | 16,9 | 22,6 | 1775 |
| Suisse italienne | 4,4 | 2,0 | 6,8 | 6,1 | 3,3 | 8,8 | 3,9 | 1,6 | 6,2 | 12,3 | 8,7 | 16,0 | 314 |
| ZH | 2,9 | 1,0 | 4,8 | 5,0 | 2,4 | 7,5 | 4,8 | 2,4 | 7,2 | 12,2 | 8,4 | 16,0 | 304 |
| CH sans ZH | 5,0 | 3,7 | 6,2 | 6,9 | 5,5 | 8,4 | 5,5 | 4,2 | 6,7 | 12,8 | 11,0 | 14,6 | 2699 |
| VD | 5,5 | 2,8 | 8,2 | 4,1 | 1,8 | 6,5 | 3,5 | 1,5 | 5,5 | 19,4 | 14,8 | 24,0 | 305 |
| CH sans VD | 4,5 | 3,4 | 5,7 | 6,8 | 5,4 | 8,3 | 5,5 | 4,3 | 6,8 | 12,0 | 10,3 | 13,8 | 2698 |
| VS | 5,9 | 2,9 | 8,9 | 9,1 | 4,9 | 13,2 | 5,4 | 2,3 | 8,5 | 12,8 | 8,4 | 17,2 | 295 |
| CH sans VS | 4,6 | 3,4 | 5,7 | 6,5 | 5,1 | 7,8 | 5,3 | 4,2 | 6,5 | 12,7 | 11,0 | 14,4 | 2708 |
| GE | 5,8 | 4,3 | 7,3 | 7,1 | 5,5 | 8,8 | 8,5 | 6,7 | 10,3 | 21,5 | 18,8 | 24,2 | 1107 |
| CH sans GE | 4,5 | 3,4 | 5,7 | 6,6 | 5,2 | 7,9 | 5,2 | 3,9 | 6,4 | 12,2 | 10,4 | 13,9 | 1896 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.16 Renoncement à différents types de soins de santé pour des raisons de coûts, Suisse (2014, en %)

| | Médicaments | | | Consultation médicale | | | Test/traitement/examen de contrôle | | | Échantillon n |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 2,2 | 1,2 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 3,3 | 2,0 | 4,6 | 1058 |
| Homme | 1,9 | 0,4 | 3,4 | 2,7 | 1,0 | 4,4 | 2,4 | 0,7 | 4,2 | 485 |
| Femme | 2,4 | 1,0 | 3,7 | 1,8 | 0,7 | 2,8 | 3,9 | 2,0 | 5,8 | 573 |
| 65-69 ans | 2,5 | 0,7 | 4,3 | 3,8 | 1,5 | 6,1 | 2,5 | 0,6 | 4,4 | 339 |
| 70-74 ans | 2,2 | 0,1 | 4,3 | 2,0 | 0,3 | 3,6 | 2,9 | 0,8 | 5,1 | 295 |
| 75-79 ans | 3,9 | 0,8 | 6,9 | 1,1 | 0,0 | 2,6 | 5,3 | 1,5 | 9,1 | 206 |
| 80+ ans | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 3,1 | 2,6 | 0,0 | 5,2 | 218 |
| Scolarité obligatoire | 2,0 | 0,0 | 4,4 | 1,8 | 0,2 | 3,3 | 2,9 | 0,5 | 5,2 | 209 |
| Secondaire II | 2,4 | 1,1 | 3,6 | 2,5 | 1,2 | 3,9 | 3,5 | 1,7 | 5,3 | 615 |
| Tertiaire | 1,2 | 0,0 | 2,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | 0,1 | 3,4 | 219 |
| Revenu sup. à la moyenne | 1,2 | 0,0 | 3,2 | 1,9 | 0,0 | 4,4 | 1,9 | 0,0 | 4,4 | 176 |
| Revenu dans la moyenne | 1,3 | 0,0 | 2,7 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 2,3 | 0,0 | 4,6 | 200 |
| Revenu inf. à la moyenne | 2,7 | 1,2 | 4,1 | 2,2 | 1,0 | 3,4 | 3,8 | 2,0 | 5,5 | 630 |
| Né en Suisse | 1,8 | 0,8 | 2,8 | 2,2 | 1,1 | 3,2 | 2,7 | 1,4 | 4,1 | 841 |
| Né à l'étranger | 3,9 | 0,5 | 7,2 | 2,2 | 0,3 | 4,0 | 5,6 | 1,9 | 9,3 | 216 |
| Ville | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 0,0 | 2,5 | 2,1 | 0,3 | 3,8 | 286 |
| Agglomération | 2,2 | 0,6 | 3,7 | 2,3 | 1,1 | 3,6 | 3,6 | 1,7 | 5,6 | 528 |
| Zone rurale | 3,9 | 1,3 | 6,4 | 2,8 | 0,3 | 5,3 | 3,8 | 0,7 | 6,9 | 244 |
| Medical Home | 1,9 | 0,4 | 3,5 | 2,8 | 0,9 | 4,8 | 4,3 | 1,5 | 7,0 | 390 |
| Sans Medical Home | 3,4 | 0,4 | 6,4 | 2,6 | 0,3 | 4,9 | 2,3 | 0,0 | 4,8 | 173 |
| Malade | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 3,0 | 0,9 | 5,1 | 4,1 | 1,2 | 7,1 | 304 |
| Non-malade | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 1,8 | 0,8 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | 4,4 | 751 |
| Malade avec Medical Home | 2,0 | 0,0 | 5,2 | 5,5 | 0,8 | 10,2 | 6,1 | 0,0 | 12,1 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 3,3 | 0,0 | 8,0 | 1,7 | 0,0 | 5,0 | 52 |
| Suisse alémanique | 2,0 | 0,7 | 3,2 | 1,4 | 0,4 | 2,5 | 2,7 | 1,1 | 4,2 | 541 |
| Suisse romande | 2,6 | 0,8 | 4,4 | 3,9 | 1,6 | 6,3 | 4,6 | 1,9 | 7,3 | 350 |
| Suisse italienne | 3,4 | 0,0 | 7,0 | 4,0 | 0,3 | 7,7 | 5,3 | 0,5 | 10,1 | 167 |
| VD | 1,9 | 0,0 | 3,8 | 1,9 | 0,0 | 3,9 | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 177 |
| CH sans VD | 2,2 | 1,1 | 3,3 | 2,2 | 1,2 | 3,2 | 3,4 | 2,0 | 4,9 | 881 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.17 Renoncement à des soins de santé pour des raisons de coûts (A1-A3), comparaison internationale (2017, en %)

| Au moins un type de renoncement | | | | Trois types de renoncement | | | | Échantillon | |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| US | 22,9 | 19,9 | 26,0 | US | 4,6 | 2,9 | 6,4 | 1151 | |
| AU | 13,7 | 10,8 | 16,6 | NZ | 3,3 | 1,5 | 5,0 | 455 | |
| CH | 13,2 | 11,4 | 15,0 | AU | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 2210 | |
| DE | 10,7 | 8,2 | 13,3 | CH | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 2586 | |
| NZ | 10,7 | 7,6 | 13,8 | NL | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 686 | |
| CA | 9,0 | 7,8 | 10,2 | CA | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 4104 | |
| NL | 7,1 | 5,0 | 9,1 | DE | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 654 | |
| FR | 4,6 | 3,1 | 6,1 | FR | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 711 | |
| UK | 4,2 | 2,6 | 5,8 | SE | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 6436 | |
| NO | 3,9 | 2,2 | 5,6 | NO | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 709 | |
| SE | 2,7 | 2,2 | 3,2 | UK | . | . | . | 682 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.18 Renoncement à des soins de santé pour des raisons de coûts (A1-A3), comparaison internationale (2014, en %)

| Au moins un type de renoncement | | | | Trois types de renoncement | | | | Échantillon | |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| US | 19,0 | 15,9 | 22,2 | US | 4,0 | 2,1 | 6,0 | 931 | |
| NZ | 9,7 | 5,6 | 13,7 | AU | 1,4 | 0,1 | 2,7 | 1515 | |
| CA | 8,9 | 7,6 | 10,2 | NZ | 1,4 | 0,0 | 3,5 | 337 | |
| AU | 7,9 | 5,1 | 10,8 | CA | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2865 | |
| DE | 7,3 | 4,7 | 9,9 | NL | 1,0 | 0,1 | 1,9 | 539 | |
| CH | 6,3 | 4,5 | 8,0 | DE | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 507 | |
| NL | 5,8 | 3,5 | 8,1 | UK | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 549 | |
| UK | 5,0 | 3,0 | 7,0 | FR | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 828 | |
| NO | 3,7 | 1,9 | 5,5 | CH | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 985 | |
| SE | 3,6 | 2,8 | 4,3 | SE | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 4725 | |
| FR | 3,2 | 2,0 | 4,4 | NO | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 621 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.19 Renoncement à des soins de santé pour des raisons de coûts (A1-A3), Suisse (2017, en %)

| | Au moins un type de renoncement | | | Trois types de renoncement | | | Échantillon | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| Total | 13,2 | 11,4 | 15 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 2586 | |
| Homme | 15,5 | 12,6 | 18,4 | 1,0 | 0,2 | 1,9 | 1210 | |
| Femme | 11,4 | 9,1 | 13,6 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 1376 | |
| 65–69 ans | 14,9 | 11,4 | 18,5 | 1,9 | 0,3 | 3,5 | 641 | |
| 70–74 ans | 17,9 | 13,9 | 22,0 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 744 | |
| 75–79 ans | 10,7 | 7,1 | 14,2 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 562 | |
| 80+ ans | 8,7 | 5,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 639 | |
| Scolarité obligatoire | 15,5 | 11,5 | 19,5 | 1,3 | 0,1 | 2,5 | 568 | |
| Secondaire II | 11,3 | 9,1 | 13,5 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 1419 | |
| Tertiaire | 17,9 | 13,0 | 22,8 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 577 | |
| En dessus du seuil de pauvreté | 12,3 | 10,3 | 14,3 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 1959 | |
| En dessous du seuil de pauvreté | 15,8 | 12,0 | 19,6 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 627 | |
| Né en Suisse | 12,0 | 10,0 | 14,0 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 1791 | |
| Né à l'étranger | 17,4 | 13,3 | 21,4 | 1,9 | 0,1 | 3,7 | 792 | |
| Medical Home | 12,2 | 9,4 | 14,9 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 1067 | |
| Sans Medical Home | 24,2 | 18,9 | 29,5 | 2,6 | 0,1 | 5,1 | 524 | |
| Malade | 11,6 | 8,5 | 14,8 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 809 | |
| Non-malade | 13,7 | 11,5 | 15,9 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 1696 | |
| Malade avec Medical Home | 10,1 | 5,9 | 14,3 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 397 | |
| Malade sans Medical Home | 25,7 | 15,3 | 36,1 | 3,4 | 0,0 | 9,5 | 167 | |
| Ville | 11,8 | 8,7 | 14,9 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 818 | |
| Agglomération | 13,7 | 11,0 | 16,4 | 1,1 | 0,2 | 2,1 | 1332 | |
| Zone rurale | 15,6 | 11,2 | 20,0 | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 345 | |
| Suisse alémanique | 13,8 | 11,3 | 16,3 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 763 | |
| Suisse romande | 12,5 | 10,3 | 14,7 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 1542 | |
| Suisse italienne | 9,8 | 6,3 | 13,2 | 1,2 | 0,0 | 2,5 | 281 | |
| ZH | 10,8 | 7,1 | 14,5 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 260 | |
| CH sans ZH | 13,7 | 11,7 | 15,7 | 1,0 | 0,4 | 1,7 | 2326 | |
| VD | 10,8 | 7,1 | 14,5 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 267 | |
| CH sans VD | 13,4 | 11,5 | 15,4 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 2319 | |
| VS | 14,8 | 9,8 | 19,7 | 1,1 | 0,0 | 2,6 | 251 | |
| CH sans VS | 13,1 | 11,3 | 15,0 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 2335 | |
| GE | 13,7 | 11,5 | 16,0 | 2,2 | 1,1 | 3,2 | 965 | |
| CH sans GE | 13,2 | 11,3 | 15,1 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 1621 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.20 Renoncement à des soins de santé pour des raisons de coûts (A1-A3), Suisse (2014, en %)

| | Au moins un type de renoncement | | | Trois types de renoncement | | | Échantillon n |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 6,3 | 4,5 | 8,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 985 |
| Homme | 5,6 | 3,0 | 8,2 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 459 |
| Femme | 6,7 | 4,4 | 9,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 526 |
| 65–69 ans | 6,8 | 3,7 | 9,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 313 |
| 70–74 ans | 5,4 | 2,5 | 8,3 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 278 |
| 75–79 ans | 8,5 | 3,8 | 13,2 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 189 |
| 80+ ans | 4,3 | 1,1 | 7,6 | . | . | . | 205 |
| Scolarité obligatoire | 5,3 | 1,8 | 8,8 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 196 |
| Secondaire II | 7,0 | 4,6 | 9,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 571 |
| Tertiaire | 2,9 | 0,7 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 207 |
| Revenu sup. à la moyenne | 2,4 | 0,0 | 4,9 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 171 |
| Revenu dans la moyenne | 5,3 | 1,8 | 8,9 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 188 |
| Revenu inf. à la moyenne | 7,4 | 5,0 | 9,8 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 579 |
| Né en Suisse | 5,4 | 3,6 | 7,2 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 788 |
| Né à l'étranger | 10,3 | 5,2 | 15,4 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 196 |
| Ville | 3,2 | 1,0 | 5,3 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 274 |
| Agglomération | 7,1 | 4,5 | 9,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 485 |
| Zone rurale | 8,0 | 3,9 | 12,1 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 226 |
| Medical Home | 6,9 | 3,7 | 10,1 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 368 |
| Sans Medical Home | 7,5 | 3,1 | 11,9 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 156 |
| Malade | 6,8 | 3,2 | 10,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 285 |
| Non-malade | 6,1 | 4,1 | 8,1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 697 |
| Malade avec Medical Home | 10,7 | 3,5 | 17,9 | . | . | . | 136 |
| Malade sans Medical Home | 6,6 | 0,4 | 12,9 | . | . | . | 47 |
| Suisse alémanique | 5,6 | 3,4 | 7,7 | . | . | . | 500 |
| Suisse romande | 8,0 | 4,6 | 11,3 | 1,1 | 0,0 | 2,5 | 327 |
| Suisse italienne | 8,1 | 2,5 | 13,6 | 1,9 | 0,0 | 4,7 | 158 |
| VD | 4,1 | 1,2 | 7,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 169 |
| CH sans VD | 6,5 | 4,6 | 8,4 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 816 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q830 : Sans se rendre aux urgences d'un hôpital ou dans un cabinet de garde ou une permanence, dans quelle mesure est-il facile ou difficile de recevoir des soins médicaux le soir, durant les week-ends ou les jours fériés ? Est-ce...?

Base : Répondants ayant eu besoin de soins le soir, durant les week-ends ou les jours fériés, non concernés exclus.

Tableau 6.21 Difficulté à recevoir des soins médicaux le soir, le week-end ou les jours fériés, comparaison internationale (2017, en %)

| | Très/assez facile | | | Très/assez difficile | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| NL | 74,3 | 69,8 | 78,9 | 23,0 | 18,6 | 27,4 | 2,7 | 1,0 | 4,3 | 407 |
| NO | 63,5 | 58,7 | 68,2 | 29,0 | 24,4 | 33,5 | 7,6 | 5,1 | 10,0 | 559 |
| NZ | 57,5 | 52,0 | 63,0 | 38,6 | 33,3 | 44,0 | 3,8 | 1,4 | 6,2 | 430 |
| US | 54,3 | 50,6 | 58,0 | 41,3 | 37,6 | 44,9 | 4,5 | 3,1 | 5,8 | 1175 |
| FR | 52,3 | 48,0 | 56,6 | 46,4 | 42,1 | 50,8 | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 602 |
| DE | 47,5 | 42,9 | 52,2 | 46,5 | 41,8 | 51,2 | 6,0 | 3,5 | 8,4 | 542 |
| AU | 44,2 | 40,1 | 48,4 | 50,8 | 46,7 | 55,0 | 4,9 | 3,6 | 6,3 | 2157 |
| CH | 42,7 | 39,5 | 45,9 | 54,4 | 51,2 | 57,6 | 2,9 | 1,9 | 4,0 | 1902 |
| CA | 36,0 | 33,8 | 38,1 | 58,2 | 56,0 | 60,4 | 5,8 | 4,8 | 6,9 | 3656 |
| UK | 34,4 | 30,0 | 38,8 | 54,1 | 49,5 | 58,7 | 11,5 | 8,5 | 14,4 | 557 |
| SE | 25,9 | 24,1 | 27,7 | 63,7 | 61,8 | 65,7 | 10,3 | 9,1 | 11,6 | 3511 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.22 Difficulté à recevoir des soins médicaux le soir, le week-end ou les jours fériés, Suisse (2017, en %)

| | Très/assez facile | | | Très/assez difficile | | | NSP/NR | | | Échantillon n | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | |
| Total | 42,7 | 39,5 | 45,9 | 54,4 | 51,2 | 57,6 | 2,9 | 1,9 | 4,0 | 1902 | |
| Homme | | 41,2 | 36,7 | 45,7 | 57,2 | 52,6 | 61,7 | 1,6 | 0,4 | 2,8 | 926 |
| Femme | | 44,0 | 39,5 | 48,5 | 51,9 | 47,4 | 56,5 | 4,1 | 2,4 | 5,7 | 976 |
| 65–69 ans | | 35,1 | 29,2 | 41,0 | 62,6 | 56,6 | 68,5 | 2,4 | 0,6 | 4,2 | 477 |
| 70–74 ans | | 43,3 | 37,1 | 49,5 | 55,9 | 49,7 | 62,1 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 539 |
| 75–79 ans | | 46,5 | 39,4 | 53,6 | 50,6 | 43,5 | 57,7 | 2,9 | 0,7 | 5,1 | 390 |
| 80+ ans | | 47,2 | 40,8 | 53,6 | 47,2 | 40,8 | 53,7 | 5,6 | 2,6 | 8,6 | 496 |
| Scolarité obligatoire | | 41,1 | 34,6 | 47,7 | 55,4 | 48,8 | 62,0 | 3,5 | 1,3 | 5,7 | 436 |
| Secondaire II | | 42,9 | 38,7 | 47,1 | 54,3 | 50,0 | 58,5 | 2,9 | 1,5 | 4,2 | 1012 |
| Tertiaire | | 43,7 | 36,6 | 50,7 | 55,5 | 48,5 | 62,6 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 438 |
| En dessus du seuil de pauvreté | | 41,3 | 37,6 | 45,0 | 56,4 | 52,6 | 60,1 | 2,4 | 1,2 | 3,5 | 1414 |
| En dessous du seuil de pauvreté | | 46,6 | 40,3 | 52,9 | 49,0 | 42,7 | 55,3 | 4,4 | 2,1 | 6,7 | 488 |
| Né en Suisse | | 42,8 | 39,1 | 46,4 | 54,4 | 50,7 | 58,1 | 2,8 | 1,6 | 4,0 | 1294 |
| Né à l'étranger | | 41,7 | 35,3 | 48,1 | 55,1 | 48,6 | 61,5 | 3,2 | 0,9 | 5,6 | 602 |
| Medical Home | | 40,8 | 35,9 | 45,6 | 56,5 | 51,6 | 61,4 | 2,7 | 1,1 | 4,4 | 815 |
| Sans Medical Home | | 31,4 | 24,8 | 38,0 | 66,9 | 60,3 | 73,6 | 1,7 | 0,1 | 3,2 | 451 |
| Malade | | 42,4 | 36,8 | 48,0 | 54,9 | 49,2 | 60,6 | 2,7 | 0,9 | 4,5 | 629 |
| Non-malade | | 43,7 | 39,7 | 47,8 | 53,2 | 49,1 | 57,2 | 3,1 | 1,7 | 4,4 | 1199 |
| Malade avec Medical Home | | 43,4 | 35,7 | 51,0 | 53,5 | 45,7 | 61,2 | 3,2 | 0,4 | 6,0 | 334 |
| Malade sans Medical Home | | 36,9 | 24,6 | 49,3 | 59,5 | 46,8 | 72,1 | 3,6 | 0,0 | 8,6 | 149 |
| Ville | | 41,9 | 36,0 | 47,7 | 54,7 | 48,8 | 60,7 | 3,4 | 1,1 | 5,7 | 618 |
| Agglomération | | 42,0 | 37,3 | 46,7 | 53,9 | 49,1 | 58,6 | 4,1 | 2,3 | 5,9 | 950 |
| Zone rurale | | 42,6 | 35,3 | 49,9 | 57,0 | 49,7 | 64,3 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 265 |
| Suisse alémanique | | 42,1 | 37,8 | 46,4 | 55,2 | 50,8 | 59,5 | 2,7 | 1,3 | 4,1 | 603 |
| Suisse romande | | 42,9 | 38,6 | 47,2 | 54,5 | 50,1 | 58,8 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 1108 |
| Suisse italienne | | 48,9 | 41,6 | 56,3 | 44,5 | 37,2 | 51,8 | 6,6 | 3,1 | 10,1 | 191 |
| ZH | | 39,7 | 32,5 | 46,9 | 55,4 | 48,1 | 62,7 | 4,9 | 1,7 | 8,2 | 190 |
| CH sans ZH | | 43,3 | 39,7 | 46,9 | 54,2 | 50,6 | 57,8 | 2,5 | 1,4 | 3,6 | 1712 |
| VD | | 45,8 | 38,2 | 53,3 | 50,3 | 42,7 | 57,9 | 3,9 | 0,8 | 7,1 | 181 |
| CH sans VD | | 42,4 | 39,0 | 45,8 | 54,8 | 51,3 | 58,2 | 2,8 | 1,7 | 3,9 | 1721 |
| VS | | 40,7 | 33,3 | 48,2 | 58,2 | 50,7 | 65,7 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 188 |
| CH sans VS | | 42,8 | 39,4 | 46,1 | 54,2 | 50,8 | 57,6 | 3,0 | 1,9 | 4,1 | 1714 |
| GE | | 50,2 | 46,3 | 54,1 | 46,8 | 42,9 | 50,7 | 3,0 | 1,7 | 4,3 | 715 |
| CH sans GE | | 42,2 | 38,8 | 45,6 | 54,9 | 51,5 | 58,3 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 1187 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q832 : La dernière fois que avez été malade ou que vous avez eu besoin de soins, combien de temps a-t-il fallu pour obtenir un rendez-vous ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.23 Délai pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, comparaison internationale (2017, en %)

| | Le même jour/le lendemain | | | 2-5 jours | | | 6 jours ou plus/jamais | | | Il n'était pas nécessaire de fixer un rendez-vous | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| NZ | 71,4 | 66,8 | 76,1 | 16,8 | 13,0 | 20,5 | 7,2 | 4,5 | 9,8 | 3,5 | 1,3 | 5,6 | 1,2 | 0,0 | 2,5 | 500 |
| AU | 65,9 | 62,2 | 69,5 | 22,0 | 18,8 | 25,3 | 8,8 | 6,5 | 11,2 | 2,1 | 1,4 | 2,7 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 2500 |
| NL | 60,7 | 56,9 | 64,5 | 14,0 | 11,3 | 16,7 | 7,2 | 5,1 | 9,2 | 15,3 | 12,5 | 18,1 | 2,8 | 1,5 | 4,1 | 750 |
| US | 52,3 | 48,9 | 55,7 | 22,5 | 19,7 | 25,4 | 16,6 | 13,9 | 19,3 | 5,9 | 4,4 | 7,4 | 2,7 | 1,6 | 3,7 | 1392 |
| FR | 48,9 | 45,1 | 52,8 | 24,1 | 20,8 | 27,4 | 21,0 | 17,8 | 24,2 | 5,3 | 3,6 | 6,9 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 750 |
| UK | 46,9 | 42,9 | 50,9 | 21,7 | 18,3 | 25,0 | 23,2 | 19,8 | 26,5 | 5,1 | 3,2 | 6,9 | 3,2 | 1,8 | 4,6 | 753 |
| CH | 46,5 | 44,0 | 49,0 | 30,7 | 28,4 | 32,9 | 10,8 | 9,4 | 12,3 | 10,7 | 9,1 | 12,2 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 3238 |
| NO | 41,2 | 37,0 | 45,4 | 23,0 | 19,4 | 26,6 | 23,8 | 20,1 | 27,4 | 8,3 | 5,9 | 10,8 | 3,8 | 2,2 | 5,3 | 750 |
| DE | 40,4 | 36,5 | 44,3 | 16,6 | 13,6 | 19,6 | 30,5 | 26,9 | 34,2 | 9,0 | 6,7 | 11,2 | 3,4 | 2,0 | 4,9 | 751 |
| SE | 38,0 | 36,5 | 39,4 | 18,3 | 17,2 | 19,4 | 24,5 | 23,2 | 25,8 | 13,3 | 12,3 | 14,2 | 6 | 5,3 | 6,7 | 7000 |
| CA | 36,7 | 34,8 | 38,6 | 25,1 | 23,3 | 26,9 | 26,6 | 25,0 | 28,3 | 8,9 | 7,8 | 10,0 | 2,7 | 2,2 | 3,3 | 4549 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.24 Délai pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, comparaison internationale (2014, en %)

| | Le même jour/le lendemain | | | 2-5 jours | | | 6 jours ou plus/jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| FR | 82,3 | 79,2 | 85,5 | 10,5 | 7,9 | 13,1 | 5,8 | 4,0 | 7,7 | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 860 |
| NZ | 81,3 | 76,3 | 86,2 | 11,6 | 7,6 | 15,7 | 5,4 | 2,4 | 8,4 | 1,7 | 0,5 | 2,8 | 379 |
| DE | 79,1 | 74,9 | 83,4 | 11,7 | 8,2 | 15,1 | 7,1 | 4,5 | 9,8 | 2,1 | 0,8 | 3,3 | 547 |
| NL | 67,6 | 62,8 | 72,4 | 12,4 | 9,0 | 15,8 | 9,4 | 6,3 | 12,5 | 10,7 | 7,7 | 13,6 | 582 |
| AU | 67,5 | 62,4 | 72,6 | 19,3 | 15,2 | 23,4 | 8,6 | 5,6 | 11,6 | 4,6 | 2,4 | 6,8 | 1670 |
| CH | 63,9 | 60,4 | 67,3 | 20,5 | 17,7 | 23,4 | 7,7 | 5,9 | 9,6 | 7,9 | 5,8 | 10,0 | 1084 |
| UK | 62,2 | 57,5 | 67,0 | 21,7 | 17,7 | 25,7 | 11,8 | 8,7 | 14,8 | 4,3 | 1,9 | 6,6 | 581 |
| US | 52,3 | 48,6 | 56,0 | 22,4 | 19,3 | 25,5 | 17,9 | 14,9 | 20,8 | 7,5 | 5,7 | 9,2 | 1116 |
| NO | 47,8 | 43,1 | 52,6 | 19,6 | 15,9 | 23,4 | 21,9 | 17,9 | 25,9 | 10,7 | 7,9 | 13,4 | 651 |
| SE | 43,9 | 42,0 | 45,9 | 17,8 | 16,4 | 19,3 | 21,5 | 19,9 | 23,1 | 16,8 | 15,3 | 18,2 | 5000 |
| CA | 42,2 | 39,8 | 44,5 | 21,9 | 20,0 | 23,9 | 29,1 | 26,9 | 31,3 | 6,8 | 5,7 | 7,9 | 3147 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.25 Délai pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, Suisse (2017, en %)

| | Le même jour/le lendemain | | | 2-5 jours | | | 6 jours ou plus/jamais | | | Il n'était pas nécessaire de fixer un rendez-vous | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 46,5 | 44,0 | 49,0 | 30,7 | 28,4 | 32,9 | 10,8 | 9,4 | 12,3 | 10,7 | 9,1 | 12,2 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 3238 |
| Homme | 43,6 | 40,0 | 47,2 | 33,2 | 29,9 | 36,6 | 11,5 | 9,3 | 13,6 | 10,8 | 8,5 | 13,1 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 1526 |
| Femme | 48,8 | 45,5 | 52,2 | 28,6 | 25,6 | 31,6 | 10,4 | 8,5 | 12,2 | 10,6 | 8,4 | 12,7 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 1712 |
| 65-69 ans | 48,7 | 43,9 | 53,4 | 29,7 | 25,5 | 34,0 | 10,9 | 8,2 | 13,7 | 9,6 | 6,8 | 12,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 828 |
| 70-74 ans | 45,4 | 40,8 | 50,1 | 32,2 | 28,0 | 36,5 | 11,0 | 8,4 | 13,6 | 10,9 | 7,9 | 13,9 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 954 |
| 75-79 ans | 42,4 | 37,1 | 47,7 | 32,6 | 27,7 | 37,6 | 12,2 | 9,0 | 15,5 | 11,1 | 7,6 | 14,5 | 1,6 | 0,4 | 2,9 | 697 |
| 80+ ans | 48,7 | 43,6 | 53,7 | 28,4 | 23,9 | 33,0 | 9,4 | 6,6 | 12,2 | 11,3 | 8,1 | 14,6 | 2,2 | 0,9 | 3,5 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 50,8 | 45,7 | 55,9 | 29,9 | 25,3 | 34,6 | 11,5 | 8,4 | 14,7 | 6,3 | 3,9 | 8,8 | 1,4 | 0,2 | 2,6 | 706 |
| Secondaire II | 45,9 | 42,7 | 49,0 | 31,2 | 28,3 | 34,2 | 10,0 | 8,2 | 11,8 | 11,6 | 9,5 | 13,8 | 1,2 | 0,6 | 1,9 | 1765 |
| Tertiaire | 40,7 | 35,2 | 46,1 | 30,7 | 25,7 | 35,7 | 14,2 | 10,6 | 17,8 | 13,6 | 9,7 | 17,5 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 46,1 | 43,2 | 49,0 | 30,2 | 27,6 | 32,8 | 10,6 | 9,0 | 12,3 | 12,1 | 10,1 | 14,0 | 1,0 | 0,5 | 1,4 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 47,7 | 42,8 | 52,5 | 31,9 | 27,5 | 36,4 | 11,5 | 8,6 | 14,3 | 6,7 | 4,3 | 9,0 | 2,3 | 0,8 | 3,8 | 807 |
| Né en Suisse | 48,0 | 45,2 | 50,9 | 29,5 | 27,0 | 32,1 | 9,7 | 8,1 | 11,2 | 11,4 | 9,6 | 13,3 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | 2217 |
| Né à l'étranger | 40,7 | 35,9 | 45,6 | 35,1 | 30,4 | 39,8 | 15,4 | 12,0 | 18,8 | 7,9 | 5,3 | 10,6 | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 1015 |
| Malade | 48,4 | 43,8 | 53,0 | 33,5 | 29,2 | 37,8 | 11,4 | 8,8 | 14,0 | 5,2 | 3,2 | 7,2 | 1,5 | 0,4 | 2,7 | 948 |
| Non-malade | 45,9 | 42,9 | 48,9 | 29,3 | 26,6 | 32,0 | 10,5 | 8,7 | 12,2 | 13,2 | 11,1 | 15,2 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 2188 |
| Ville | 42,9 | 38,3 | 47,4 | 30,7 | 26,5 | 34,9 | 11,1 | 8,5 | 13,6 | 14,0 | 10,7 | 17,3 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 1026 |
| Agglomération | 45,0 | 41,5 | 48,6 | 32,4 | 29,0 | 35,7 | 11,0 | 8,9 | 13,1 | 10,5 | 8,2 | 12,8 | 1,1 | 0,4 | 1,8 | 1643 |
| Zone rurale | 53,3 | 47,7 | 59,0 | 27,5 | 22,5 | 32,4 | 11,0 | 7,7 | 14,3 | 7,0 | 4,2 | 9,9 | 1,2 | 0,1 | 2,3 | 454 |
| Suisse alémanique | 50,1 | 46,8 | 53,4 | 28,9 | 25,9 | 31,9 | 8,3 | 6,5 | 10,1 | 11,6 | 9,5 | 13,7 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 1040 |
| Suisse romande | 35,2 | 31,9 | 38,4 | 36,5 | 33,3 | 39,7 | 17,9 | 15,4 | 20,3 | 8,7 | 6,8 | 10,6 | 1,7 | 0,9 | 2,6 | 1869 |
| Suisse italienne | 49,7 | 44,1 | 55,3 | 27,6 | 22,7 | 32,6 | 12,3 | 8,6 | 15,9 | 7,9 | 4,8 | 10,9 | 2,5 | 0,9 | 4,1 | 329 |
| ZH | 51,0 | 45,4 | 56,6 | 28,1 | 23,1 | 33,1 | 8,4 | 5,3 | 11,5 | 11,6 | 8,1 | 15,2 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 332 |
| CH sans ZH | 45,6 | 42,8 | 48,3 | 31,2 | 28,7 | 33,7 | 11,3 | 9,8 | 12,9 | 10,5 | 8,8 | 12,2 | 1,4 | 0,8 | 2,0 | 2906 |
| VD | 32,9 | 27,5 | 38,2 | 37,3 | 31,8 | 42,8 | 15,5 | 11,5 | 19,6 | 11,3 | 7,7 | 15,0 | 2,9 | 1,0 | 4,9 | 324 |
| CH sans VD | 47,8 | 45,2 | 50,4 | 30,0 | 27,6 | 32,4 | 10,4 | 8,9 | 11,9 | 10,6 | 8,9 | 12,3 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | 2914 |
| VS | 40,4 | 34,7 | 46,1 | 35,3 | 29,6 | 41,0 | 15,5 | 11,1 | 19,9 | 7,4 | 4,3 | 10,5 | 1,3 | 0,2 | 2,5 | 321 |
| CH sans VS | 46,8 | 44,2 | 49,3 | 30,5 | 28,1 | 32,8 | 10,6 | 9,2 | 12,1 | 10,8 | 9,2 | 12,5 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 2917 |
| GE | 30,1 | 27,3 | 32,9 | 37,5 | 34,5 | 40,5 | 24,7 | 22,0 | 27,4 | 6,4 | 4,9 | 7,9 | 1,3 | 0,6 | 2,0 | 1160 |
| CH sans GE | 47,5 | 44,9 | 50,1 | 30,3 | 27,9 | 32,6 | 10,0 | 8,5 | 11,5 | 10,9 | 9,3 | 12,6 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.26 Délai pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, Suisse (2014, en %)

| | Le même jour/le lendemain | | | 2-5 jours | | | 6 jours ou plus/jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 63,9 | 60,4 | 67,3 | 20,5 | 17,7 | 23,4 | 7,7 | 5,9 | 9,6 | 7,9 | 5,8 | 10,0 | 1084 |
| Homme | 66,1 | 60,9 | 71,3 | 20,0 | 15,8 | 24,1 | 5,6 | 3,3 | 7,9 | 8,3 | 5,0 | 11,6 | 493 |
| Femme | 62,1 | 57,4 | 66,8 | 21,0 | 17,1 | 24,8 | 9,3 | 6,5 | 12,1 | 7,6 | 4,8 | 10,3 | 591 |
| 65-69 ans | 65,2 | 58,9 | 71,4 | 20,6 | 15,7 | 25,6 | 6,8 | 3,6 | 9,9 | 7,4 | 3,3 | 11,5 | 349 |
| 70-74 ans | 68,5 | 62,5 | 74,6 | 18,9 | 13,9 | 23,9 | 6,9 | 3,9 | 10,0 | 5,6 | 2,7 | 8,6 | 300 |
| 75-79 ans | 59,0 | 50,8 | 67,1 | 22,9 | 15,9 | 29,9 | 8,4 | 3,9 | 13,0 | 9,7 | 4,2 | 15,2 | 209 |
| 80+ ans | 62,1 | 54,6 | 69,6 | 19,9 | 14,0 | 25,8 | 9,1 | 4,6 | 13,6 | 8,9 | 4,8 | 13,1 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 57,8 | 49,6 | 66,1 | 18,8 | 12,9 | 24,7 | 11,9 | 6,5 | 17,3 | 11,5 | 5,8 | 17,2 | 216 |
| Secondaire II | 65,8 | 61,5 | 70,2 | 21,2 | 17,5 | 24,9 | 6,4 | 4,3 | 8,5 | 6,6 | 4,1 | 9,1 | 628 |
| Tertiaire | 64,3 | 56,7 | 71,8 | 19,2 | 13,3 | 25,1 | 8,3 | 4,3 | 12,3 | 8,2 | 4,1 | 12,4 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 64,2 | 55,6 | 72,9 | 18,7 | 11,7 | 25,6 | 9,1 | 3,6 | 14,6 | 8,0 | 3,0 | 13,0 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 63,0 | 54,6 | 71,3 | 20,5 | 14,2 | 26,8 | 7,9 | 2,8 | 12,9 | 8,7 | 2,8 | 14,6 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 63,9 | 59,4 | 68,3 | 21,9 | 18,2 | 25,7 | 7,2 | 5,1 | 9,4 | 7,0 | 4,5 | 9,5 | 645 |
| Né en Suisse | 63,8 | 60,0 | 67,6 | 21,4 | 18,1 | 24,6 | 7,2 | 5,1 | 9,2 | 7,6 | 5,6 | 9,7 | 863 |
| Né à l'étranger | 63,8 | 55,3 | 72,4 | 16,8 | 11,5 | 22,2 | 10,4 | 5,5 | 15,3 | 8,9 | 1,9 | 16,0 | 220 |
| Ville | 61,2 | 54,0 | 68,4 | 20,6 | 15,2 | 26 | 10,3 | 5,9 | 14,8 | 7,9 | 2,6 | 13,1 | 293 |
| Agglomération | 62,8 | 57,8 | 67,7 | 22,4 | 18,2 | 26,6 | 6,7 | 4,3 | 9,2 | 8,1 | 5,3 | 10,9 | 540 |
| Zone rurale | 68,8 | 62,2 | 75,5 | 16,8 | 11,4 | 22,2 | 7,0 | 3,5 | 10,5 | 7,4 | 4,0 | 10,7 | 251 |
| Malade | 67,0 | 60,5 | 73,5 | 17,6 | 12,8 | 22,4 | 8,4 | 4,3 | 12,4 | 7,1 | 3,5 | 10,7 | 305 |
| Non-malade | 62,6 | 58,4 | 66,7 | 21,8 | 18,3 | 25,2 | 7,6 | 5,4 | 9,7 | 8,1 | 5,5 | 10,6 | 776 |
| Suisse alémanique | 69,5 | 65,2 | 73,9 | 17,4 | 13,9 | 20,9 | 5,2 | 3,3 | 7,1 | 7,9 | 5,1 | 10,6 | 551 |
| Suisse romande | 47,6 | 41,5 | 53,6 | 28,8 | 23,5 | 34,2 | 15,4 | 10,1 | 20,6 | 8,2 | 5,2 | 11,3 | 355 |
| Suisse italienne | 59,2 | 51,0 | 67,4 | 26,5 | 19,4 | 33,7 | 8,1 | 3,2 | 13,0 | 6,2 | 1,8 | 10,6 | 178 |
| VD | 53,0 | 44,8 | 61,2 | 25,1 | 17,9 | 32,3 | 11,2 | 6,5 | 15,9 | 10,7 | 5,2 | 16,2 | 178 |
| CH sans VD | 64,8 | 61,1 | 68,6 | 20,1 | 17,1 | 23,1 | 7,4 | 5,4 | 9,4 | 7,6 | 5,4 | 9,9 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q915 : Consultez-vous généralement le même médecin quand vous avez besoin de vous faire soigner ? Si non, consultez-vous généralement le même groupe de médecins, le même centre de santé ou la même clinique quand vous avez besoin de vous faire soigner ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.27 Recours à un médecin ou à un lieu de traitement régulier pour les soins médicaux, comparaison internationale (2017, en %)

| | Médecin régulier | | | Lieu de traitement régulier | | | Aucun des deux | | | Échantillon | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| FR | 99,5 | 99,0 | 100,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 750 | |
| DE | 98,3 | 97,3 | 99,3 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 751 | |
| NO | 98,3 | 97,2 | 99,5 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 750 | |
| NL | 97,7 | 96,6 | 98,8 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 750 | |
| AU | 96,8 | 95,8 | 97,8 | 2,5 | 1,6 | 3,5 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 2500 | |
| NZ | 96,8 | 94,9 | 98,6 | 2,5 | 0,9 | 4,2 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 500 | |
| CH | 96,8 | 96,0 | 97,6 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 2,4 | 1,7 | 3,1 | 3238 | |
| CA | 95,5 | 94,8 | 96,2 | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 2,1 | 1,6 | 2,6 | 4549 | |
| US | 93,7 | 91,8 | 95,5 | 3,3 | 2,0 | 4,6 | 3,0 | 1,7 | 4,3 | 1392 | |
| UK | 84,1 | 81,1 | 87,1 | 14,5 | 11,6 | 17,4 | 1,4 | 0,5 | 2,3 | 753 | |
| SE | 60,5 | 59,0 | 61,9 | 37,8 | 36,3 | 39,2 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 7000 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.28 Recours à un médecin ou à un lieu de traitement régulier pour les soins médicaux, comparaison internationale (2014, en %)

| | Médecin régulier | | | Lieu de traitement régulier | | | Aucun des deux | | | Échantillon | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| FR | 99,7 | 99,4 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 860 | |
| NL | 99,4 | 98,6 | 100,0 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 582 | |
| DE | 98,9 | 97,7 | 100,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | 547 | |
| NO | 97,4 | 96,0 | 98,9 | 2,3 | 0,9 | 3,6 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 651 | |
| CH | 97,0 | 95,6 | 98,3 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 2,2 | 1,0 | 3,5 | 1084 | |
| CA | 96,7 | 96,0 | 97,4 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3147 | |
| AU | 96,4 | 94,7 | 98,1 | 2,4 | 1,2 | 3,6 | 1,2 | 0,0 | 2,3 | 1670 | |
| NZ | 94,4 | 90,7 | 98,0 | 2,9 | 0,7 | 5,1 | 2,7 | 0,0 | 5,7 | 379 | |
| UK | 92,5 | 90,2 | 94,8 | 5,4 | 3,5 | 7,2 | 2,2 | 0,7 | 3,6 | 581 | |
| US | 92,0 | 89,8 | 94,2 | 4,2 | 2,7 | 5,7 | 3,8 | 2,2 | 5,4 | 1116 | |
| SE | 67,9 | 66,1 | 69,7 | 27,9 | 26,2 | 29,6 | 4,2 | 3,4 | 5,0 | 5000 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.29 Recours à un médecin ou à un lieu de traitement régulier pour les soins médicaux, Suisse (2017, en %)

| | Médecin régulier | | | Lieu de traitement régulier | | | Aucun des deux | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 96,8 | 96,0 | 97,6 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 2,4 | 1,7 | 3,1 | 3238 |
| Homme | 96,7 | 95,5 | 98,0 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 2,4 | 1,3 | 3,4 | 1526 |
| Femme | 96,9 | 95,7 | 98,0 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 2,4 | 1,4 | 3,3 | 1712 |
| 65–69 ans | 97,1 | 95,8 | 98,4 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 828 |
| 70–74 ans | 96,1 | 94,4 | 97,7 | 1,4 | 0,3 | 2,6 | 2,5 | 1,2 | 3,7 | 954 |
| 75–79 ans | 96,4 | 94,3 | 98,5 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,9 | 1,0 | 4,8 | 697 |
| 80+ ans | 97,5 | 95,9 | 99,1 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 1,6 | 0,3 | 2,9 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 96,3 | 94,4 | 98,2 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 3,2 | 1,4 | 5,0 | 706 |
| Secondaire II | 97,3 | 96,3 | 98,3 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 2,5 | 1765 |
| Tertiaire | 94,9 | 92,5 | 97,2 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 4,4 | 2,2 | 6,7 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 96,7 | 95,7 | 97,6 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 2,4 | 1,6 | 3,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 97,1 | 95,6 | 98,7 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 3,5 | 807 |
| Né en Suisse | 97,2 | 96,3 | 98,1 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 2,1 | 1,3 | 2,9 | 2217 |
| Né à l'étranger | 95,2 | 93,4 | 97,0 | 1,3 | 0,1 | 2,4 | 3,5 | 2,1 | 4,9 | 1015 |
| Malade | 99,0 | 98,1 | 99,8 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 948 |
| Non-malade | 96,0 | 94,9 | 97,1 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 3,1 | 2,1 | 4,1 | 2188 |
| Ville | 96,6 | 95,1 | 98,1 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 2,6 | 1,2 | 4,0 | 1026 |
| Agglomération | 97,3 | 96,2 | 98,4 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 1,9 | 1,0 | 2,8 | 1643 |
| Zone rurale | 96,5 | 94,4 | 98,5 | 1,0 | 0,0 | 2,2 | 2,6 | 0,9 | 4,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 97,1 | 96,1 | 98,2 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 3,0 | 1040 |
| Suisse romande | 96,0 | 94,7 | 97,2 | 1,1 | 0,5 | 1,8 | 2,9 | 1,8 | 3,9 | 1869 |
| Suisse italienne | 95,9 | 93,8 | 98,0 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 3,8 | 1,8 | 5,8 | 329 |
| ZH | 96,1 | 93,9 | 98,3 | 1,5 | 0,1 | 2,9 | 2,3 | 0,6 | 4,1 | 332 |
| CH sans ZH | 96,9 | 96,0 | 97,8 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 1,6 | 3,2 | 2906 |
| VD | 96,0 | 93,9 | 98,2 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 2,8 | 1,0 | 4,7 | 324 |
| CH sans VD | 96,9 | 96,0 | 97,7 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 2914 |
| VS | 95,4 | 92,5 | 98,3 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 3,8 | 1,1 | 6,6 | 321 |
| CH sans VS | 96,9 | 96,0 | 97,7 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 2,3 | 1,6 | 3,0 | 2917 |
| GE | 95,6 | 94,4 | 96,8 | 1,5 | 0,8 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 3,9 | 1160 |
| CH sans GE | 96,9 | 96,0 | 97,7 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.30 Recours à un médecin ou à un lieu de traitement régulier pour les soins médicaux, Suisse (2014, en %)

| | Médecin régulier | | | Lieu de traitement régulier | | | Aucun des deux | | | Échantillon n |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 97,0 | 95,6 | 98,3 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 2,2 | 1,0 | 3,5 | 1084 |
| Homme | 94,9 | 92,1 | 97,7 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 4,0 | 1,3 | 6,7 | 493 |
| Femme | 98,5 | 97,6 | 99,4 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 591 |
| 65–69 ans | 93,3 | 89,4 | 97,1 | 1,6 | 0,5 | 2,7 | 5,1 | 1,4 | 8,9 | 349 |
| 70–74 ans | 98,3 | 96,8 | 99,7 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 300 |
| 75–79 ans | 98,9 | 97,2 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 2,7 | 209 |
| 80+ ans | 98,3 | 96,6 | 99,9 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 2,7 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 95,5 | 91,0 | 100,0 | . | . | . | 4,5 | 0,0 | 9,0 | 216 |
| Secondaire II | 97,7 | 96,5 | 98,9 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | 2,4 | 628 |
| Tertiaire | 95,5 | 92,6 | 98,3 | 1,8 | 0,0 | 3,6 | 2,7 | 0,5 | 4,9 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 98,2 | 96,5 | 99,9 | 1,4 | 0,0 | 2,9 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 98,8 | 97,8 | 99,9 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 96,1 | 94,2 | 98,1 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 2,9 | 1,1 | 4,8 | 645 |
| Né en Suisse | 97,5 | 96,4 | 98,6 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 863 |
| Né à l'étranger | 94,5 | 89,1 | 100,0 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 5,1 | 0,0 | 10,5 | 220 |
| Ville | 94,3 | 90,3 | 98,3 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 4,7 | 0,8 | 8,6 | 293 |
| Agglomération | 97,6 | 96,3 | 99,0 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 1,5 | 0,3 | 2,7 | 540 |
| Zone rurale | 98,5 | 96,9 | 100,0 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 251 |
| Malade | 99,0 | 97,8 | 100,0 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 305 |
| Non-malade | 96,2 | 94,4 | 97,9 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 2,8 | 1,1 | 4,5 | 776 |
| Suisse alémanique | 97,3 | 95,6 | 99,0 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 2,1 | 0,5 | 3,7 | 551 |
| Suisse romande | 96,2 | 93,8 | 98,5 | 1,3 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 4,6 | 355 |
| Suisse italienne | 95,9 | 93,2 | 98,6 | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 0,5 | 5,1 | 178 |
| VD | 96,6 | 93,2 | 100,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,3 | 0,0 | 5,4 | 178 |
| CH sans VD | 97,0 | 95,6 | 98,4 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 2,2 | 0,9 | 3,5 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q935 : Quand vous contactez votre médecin habituel en raison d'un problème médical durant les heures de consultation régulières, à quelle fréquence recevez-vous une réponse le même jour ?

Base : Répondants ayant un médecin ou un lieu de traitement habituel et ayant essayé de le contacter

Tableau 6.31 Reçoit une réponse du médecin le jour-même, comparaison internationale (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| AU | 87,9 | 85,3 | 90,4 | 11,0 | 8,5 | 13,6 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 2327 |
| CH | 91,1 | 89,6 | 92,6 | 8,1 | 6,7 | 9,6 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 2814 |
| DE | 88,0 | 85,3 | 90,7 | 8,6 | 6,3 | 11,0 | 3,4 | 2,0 | 4,8 | 686 |
| NZ | 88,0 | 84,5 | 91,4 | 10,5 | 7,3 | 13,8 | 1,5 | 0,1 | 2,9 | 470 |
| NL | 85,9 | 82,9 | 88,9 | 10,3 | 7,7 | 12,9 | 3,8 | 2,2 | 5,4 | 622 |
| FR | 85,7 | 83,0 | 88,5 | 13,2 | 10,5 | 15,8 | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 697 |
| NO | 77,1 | 73,1 | 81,1 | 19,7 | 16,0 | 23,5 | 3,2 | 1,6 | 4,8 | 635 |
| US | 76,1 | 73,0 | 79,3 | 21,6 | 18,5 | 24,6 | 2,3 | 1,2 | 3,4 | 1300 |
| UK | 74,4 | 70,7 | 78,1 | 22,1 | 18,5 | 25,6 | 3,5 | 2,2 | 4,9 | 651 |
| SE | 73,6 | 72,1 | 75,1 | 21,2 | 19,8 | 22,6 | 5,1 | 4,4 | 5,9 | 5258 |
| CA | 70,5 | 68,5 | 72,5 | 25,8 | 23,9 | 27,8 | 3,7 | 3,0 | 4,4 | 4055 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.32 Reçoit une réponse du médecin le jour-même, comparaison internationale (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| CH | 93,1 | 90,9 | 95,3 | 5,2 | 3,2 | 7,2 | 1,7 | 0,6 | 2,7 | 920 |
| FR | 90,2 | 87,6 | 92,7 | 9,1 | 6,7 | 11,6 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 797 |
| DE | 89,3 | 85,8 | 92,7 | 8,3 | 5,2 | 11,4 | 2,4 | 0,7 | 4,1 | 418 |
| NL | 87,4 | 83,6 | 91,2 | 10,3 | 6,9 | 13,8 | 2,3 | 0,5 | 4,0 | 462 |
| NZ | 82,2 | 75,9 | 88,4 | 14,9 | 9,1 | 20,7 | 2,9 | 0,0 | 5,9 | 320 |
| NO | 80,6 | 76,5 | 84,8 | 14,9 | 11,2 | 18,6 | 4,4 | 2,3 | 6,6 | 515 |
| SE | 80,4 | 78,7 | 82,1 | 13,7 | 12,3 | 15,2 | 5,9 | 4,9 | 6,9 | 4211 |
| US | 79,0 | 75,7 | 82,3 | 19,6 | 16,3 | 22,9 | 1,4 | 0,7 | 2,0 | 1024 |
| UK | 78,6 | 74,4 | 82,8 | 20,2 | 16,0 | 24,3 | 1,3 | 0,3 | 2,3 | 539 |
| AU | 77,6 | 72,5 | 82,6 | 21,8 | 16,7 | 26,8 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1345 |
| CA | 72,1 | 69,9 | 74,3 | 25,0 | 22,8 | 27,1 | 2,9 | 2,1 | 3,8 | 2741 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.33 Reçoit une réponse du médecin le jour-même, Suisse (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| Total | 91,1 | 89,6 | 92,6 | 8,1 | 6,7 | 9,6 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 2814 | |
| Homme | 90,9 | 88,7 | 93,1 | 8,4 | 6,3 | 10,5 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 1328 | |
| Femme | 91,3 | 89,3 | 93,3 | 7,9 | 6,0 | 9,8 | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 1486 | |
| 65–69 ans | 89,6 | 86,4 | 92,8 | 10,0 | 6,9 | 13,1 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 714 | |
| 70–74 ans | 90,2 | 87,3 | 93,1 | 9,1 | 6,3 | 11,9 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 820 | |
| 75–79 ans | 92,2 | 89,2 | 95,2 | 7,5 | 4,5 | 10,5 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 601 | |
| 80+ ans | 92,8 | 90,2 | 95,4 | 5,7 | 3,4 | 8,0 | 1,4 | 0,1 | 2,8 | 679 | |
| Scolarité obligatoire | 88,6 | 85,2 | 92,1 | 10,2 | 7,0 | 13,4 | 1,1 | 0,0 | 2,5 | 625 | |
| Secondaire II | 92,0 | 90,2 | 93,9 | 7,4 | 5,6 | 9,2 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 1535 | |
| Tertiaire | 91,5 | 88,7 | 94,4 | 7,9 | 5,2 | 10,6 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 629 | |
| En dessus du seuil de pauvreté | 91,4 | 89,7 | 93,1 | 7,9 | 6,3 | 9,5 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 2102 | |
| En dessous du seuil de pauvreté | 90,4 | 87,3 | 93,5 | 8,8 | 5,9 | 11,8 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 712 | |
| Né en Suisse | 92,3 | 90,7 | 93,9 | 6,9 | 5,4 | 8,4 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 1923 | |
| Né à l'étranger | 86,8 | 83,0 | 90,6 | 12,7 | 9,0 | 16,4 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 887 | |
| Malade | 91,9 | 89,3 | 94,5 | 7,3 | 4,9 | 9,7 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 869 | |
| Non-malade | 91,6 | 89,8 | 93,3 | 7,8 | 6,1 | 9,5 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 1854 | |
| Ville | 89,9 | 86,9 | 92,9 | 9,3 | 6,4 | 12,2 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 887 | |
| Agglomération | 90,0 | 87,7 | 92,2 | 9,4 | 7,2 | 11,6 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 1441 | |
| Zone rurale | 94,7 | 92,1 | 97,3 | 4,6 | 2,2 | 7,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 385 | |
| Suisse alémanique | 92,3 | 90,4 | 94,3 | 6,9 | 5,1 | 8,7 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 900 | |
| Suisse romande | 87,4 | 85,0 | 89,7 | 12,1 | 9,7 | 14,4 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 1628 | |
| Suisse italienne | 91,9 | 88,7 | 95,2 | 6,7 | 3,7 | 9,7 | 1,4 | 0,0 | 2,8 | 286 | |
| ZH | 93,6 | 90,6 | 96,7 | 6,4 | 3,3 | 9,4 | . | . | . | 284 | |
| CH sans ZH | 90,6 | 88,9 | 92,3 | 8,5 | 6,9 | 10,1 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 2530 | |
| VD | 88,1 | 84,1 | 92,0 | 11,7 | 7,8 | 15,6 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 280 | |
| CH sans VD | 91,4 | 89,8 | 93,0 | 7,8 | 6,3 | 9,3 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 2534 | |
| VS | 90,0 | 86,4 | 93,6 | 8,7 | 5,3 | 12,1 | 1,3 | 0,0 | 2,5 | 276 | |
| CH sans VS | 91,2 | 89,6 | 92,7 | 8,1 | 6,7 | 9,6 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 2538 | |
| GE | 85,1 | 82,7 | 87,5 | 14,2 | 11,9 | 16,6 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 1018 | |
| CH sans GE | 91,5 | 89,9 | 93,0 | 7,8 | 6,3 | 9,3 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 1796 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.34 Reçoit une réponse du médecin le jour-même, Suisse (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| Total | 93,1 | 90,9 | 95,3 | 5,2 | 3,2 | 7,2 | 1,7 | 0,6 | 2,7 | 920 | |
| Homme | 96,3 | 94,4 | 98,2 | 2,9 | 1,3 | 4,5 | 0,8 | 0 | 1,7 | 422 | |
| Femme | 90,8 | 87,2 | 94,3 | 6,9 | 3,7 | 10,1 | 2,3 | 0,7 | 4 | 498 | |
| 65–69 ans | 95,7 | 92,8 | 98,6 | 4 | 1,1 | 6,9 | 0,3 | 0 | 0,7 | 291 | |
| 70–74 ans | 91,7 | 86,9 | 96,5 | 6,3 | 1,9 | 10,8 | 2 | 0 | 3,9 | 267 | |
| 75–79 ans | 92,1 | 86,1 | 98,1 | 7,9 | 1,9 | 13,9 | . | . | . | 177 | |
| 80+ ans | 92,5 | 88,2 | 96,8 | 3 | 0,8 | 5,2 | 4,6 | 0,8 | 8,3 | 185 | |
| Scolarité obligatoire | 94,6 | 91,1 | 98,1 | 4,7 | 1,4 | 8,1 | 0,7 | 0 | 1,7 | 175 | |
| Secondaire II | 92,3 | 89,2 | 95,5 | 5,5 | 2,7 | 8,3 | 2,2 | 0,6 | 3,7 | 539 | |
| Tertiaire | 95,7 | 92,9 | 98,4 | 3,5 | 1 | 5,9 | 0,9 | 0 | 2,3 | 193 | |
| Revenu sup. à la moyenne | 97,1 | 94,4 | 99,9 | 2,9 | 0,1 | 5,6 | . | . | . | 162 | |
| Revenu dans la moyenne | 87,2 | 79,1 | 95,3 | 9,5 | 1,9 | 17,1 | 3,3 | 0 | 6,8 | 178 | |
| Revenu inf. à la moyenne | 93,9 | 91,7 | 96,2 | 4,8 | 2,8 | 6,9 | 1,2 | 0,2 | 2,3 | 537 | |
| Né en Suisse | 94,9 | 93,1 | 96,7 | 3,8 | 2,3 | 5,4 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | 731 | |
| Né à l'étranger | 84,7 | 75,9 | 93,5 | 11,6 | 3,2 | 20 | 3,7 | 0 | 7,4 | 188 | |
| Ville | 91,7 | 86,5 | 96,9 | 7,4 | 2,3 | 12,4 | 0,9 | 0 | 2,3 | 245 | |
| Agglomération | 93,9 | 91,2 | 96,6 | 3,8 | 1,7 | 5,8 | 2,3 | 0,5 | 4,1 | 462 | |
| Zone rurale | 93 | 88,2 | 97,8 | 5,8 | 1,3 | 10,2 | 1,3 | 0 | 3,1 | 213 | |
| Malade | 94 | 89,8 | 98,2 | 5,4 | 1,3 | 9,4 | 0,7 | 0 | 2 | 276 | |
| Non-malade | 93,1 | 90,5 | 95,6 | 5,2 | 2,9 | 7,5 | 1,7 | 0,5 | 2,9 | 643 | |
| Suisse alémanique | 94,1 | 91,2 | 97,1 | 4,3 | 1,6 | 6,9 | 1,6 | 0,3 | 2,9 | 431 | |
| Suisse romande | 89,8 | 85,9 | 93,7 | 8,1 | 4,6 | 11,5 | 2,1 | 0,1 | 4,2 | 322 | |
| Suisse italienne | 95,9 | 92,6 | 99,1 | 3,6 | 0,5 | 6,6 | 0,6 | 0 | 1,7 | 167 | |
| VD | 94,9 | 91,6 | 98,2 | 3,6 | 0,8 | 6,3 | 1,6 | 0 | 3,5 | 161 | |
| CH sans VD | 92,9 | 90,5 | 95,4 | 5,4 | 3,2 | 7,6 | 1,7 | 0,5 | 2,8 | 759 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q940A1 : À quelle fréquence votre médecin habituel ou le personnel de santé que vous rencontrez dans votre centre médical habituel connaît les informations importantes sur votre passé au niveau de la santé ?

Base : Répondants ayant un médecin ou un lieu de traitement habituel, non concernés exclus.

Tableau 6.35 Le médecin habituel ou le personnel de santé connaît les informations importantes du passé médical, comparaison internationale (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| NZ | 91,1 | 88,2 | 94,1 | 6,7 | 4,3 | 9,2 | 2,1 | 0,4 | 3,9 | 496 |
| CH | 89,3 | 87,8 | 90,8 | 7,5 | 6,1 | 8,8 | 3,2 | 2,4 | 4,1 | 3147 |
| AU | 89,0 | 86,5 | 91,5 | 9,8 | 7,4 | 12,3 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 2472 |
| FR | 87,9 | 85,4 | 90,4 | 9,6 | 7,3 | 11,8 | 2,5 | 1,3 | 3,8 | 747 |
| NL | 86,7 | 84,1 | 89,2 | 7,4 | 5,5 | 9,4 | 5,9 | 4,1 | 7,7 | 744 |
| US | 86,3 | 83,8 | 88,7 | 12,2 | 9,8 | 14,6 | 1,6 | 0,8 | 2,3 | 1360 |
| CA | 85,9 | 84,4 | 87,4 | 10,2 | 8,8 | 11,7 | 3,9 | 3,2 | 4,6 | 4444 |
| DE | 84,7 | 81,9 | 87,5 | 11,0 | 8,5 | 13,4 | 4,3 | 2,8 | 5,9 | 742 |
| UK | 74,5 | 70,9 | 78,0 | 17,1 | 14,1 | 20,2 | 8,4 | 6,1 | 10,7 | 743 |
| NO | 73,9 | 70,1 | 77,8 | 18,0 | 14,6 | 21,4 | 8,1 | 5,6 | 10,5 | 748 |
| SE | 61,0 | 59,6 | 62,5 | 18,5 | 17,4 | 19,7 | 20,4 | 19,3 | 21,6 | 6865 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.36 Le médecin habituel ou le personnel de santé connaît les informations importantes du passé médical, comparaison internationale (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| DE | 96,0 | 94,0 | 98,1 | 2,9 | 1,3 | 4,4 | 1,1 | 0,0 | 2,5 | 541 |
| NL | 94,2 | 91,8 | 96,6 | 3,0 | 1,4 | 4,6 | 2,8 | 1,0 | 4,6 | 534 |
| AU | 93,1 | 90,6 | 95,6 | 6,3 | 3,9 | 8,8 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 1645 |
| FR | 93,1 | 91,0 | 95,1 | 6,8 | 4,8 | 8,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 856 |
| CH | 91,0 | 88,6 | 93,3 | 7,0 | 4,8 | 9,3 | 2,0 | 1,1 | 2,9 | 1027 |
| NZ | 90,9 | 86,9 | 95,0 | 8,7 | 4,7 | 12,7 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 368 |
| UK | 90,4 | 87,5 | 93,2 | 9,3 | 6,5 | 12,1 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 568 |
| CA | 89,0 | 87,5 | 90,5 | 9,5 | 8,1 | 10,9 | 1,5 | 0,9 | 2,1 | 3058 |
| US | 87,7 | 85,2 | 90,2 | 11,1 | 8,7 | 13,5 | 1,2 | 0,4 | 1,9 | 1073 |
| NO | 81,1 | 77,2 | 85,0 | 12,9 | 9,6 | 16,2 | 6,0 | 3,5 | 8,4 | 625 |
| SE | 70,2 | 68,4 | 72,1 | 19,7 | 18,1 | 21,3 | 10,1 | 8,8 | 11,3 | 4486 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.37 Le médecin habituel ou le personnel de santé connaît les informations importantes du passé médical, Suisse (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| Total | 89,3 | 87,8 | 90,8 | 7,5 | 6,1 | 8,8 | 3,2 | 2,4 | 4,1 | 3147 | |
| Homme | 89,5 | 87,2 | 91,8 | 7,8 | 5,8 | 9,8 | 2,7 | 1,5 | 3,8 | 1484 | |
| Femme | 89,1 | 87,0 | 91,2 | 7,2 | 5,5 | 8,9 | 3,7 | 2,5 | 5,0 | 1663 | |
| 65–69 ans | 86,9 | 83,7 | 90,1 | 9,9 | 7,0 | 12,7 | 3,2 | 1,6 | 4,8 | 802 | |
| 70–74 ans | 89,3 | 86,4 | 92,3 | 6,8 | 4,4 | 9,2 | 3,8 | 1,9 | 5,7 | 921 | |
| 75–79 ans | 91,5 | 88,5 | 94,4 | 6,9 | 4,1 | 9,7 | 1,7 | 0,7 | 2,7 | 679 | |
| 80+ ans | 90,1 | 87,1 | 93,1 | 5,8 | 3,5 | 8,2 | 4,0 | 2,0 | 6,1 | 745 | |
| Scolarité obligatoire | 88,8 | 85,6 | 92,1 | 7,5 | 4,8 | 10,2 | 3,7 | 1,7 | 5,7 | 686 | |
| Secondaire II | 89,4 | 87,4 | 91,4 | 7,6 | 5,9 | 9,3 | 3,0 | 1,9 | 4,1 | 1724 | |
| Tertiaire | 91,2 | 88,2 | 94,1 | 5,9 | 3,3 | 8,4 | 3,0 | 1,3 | 4,6 | 710 | |
| En dessus du seuil de pauvreté | 90,1 | 88,4 | 91,8 | 7,1 | 5,6 | 8,6 | 2,8 | 1,9 | 3,7 | 2364 | |
| En dessous du seuil de pauvreté | 87,0 | 83,7 | 90,3 | 8,5 | 5,7 | 11,2 | 4,5 | 2,4 | 6,6 | 783 | |
| Né en Suisse | 89,7 | 88,0 | 91,5 | 7,3 | 5,8 | 8,9 | 2,9 | 2,0 | 3,8 | 2172 | |
| Né à l'étranger | 87,6 | 84,3 | 91,0 | 7,9 | 5,2 | 10,6 | 4,4 | 2,2 | 6,7 | 970 | |
| Malade | 93,2 | 91,0 | 95,4 | 5,3 | 3,3 | 7,3 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 938 | |
| Non-malade | 88,0 | 86,1 | 90,0 | 8,0 | 6,4 | 9,7 | 3,9 | 2,8 | 5,1 | 2110 | |
| Ville | 89,8 | 87,1 | 92,5 | 8,0 | 5,6 | 10,5 | 2,2 | 0,9 | 3,4 | 998 | |
| Agglomération | 89,3 | 87,0 | 91,6 | 7,6 | 5,7 | 9,6 | 3,1 | 1,9 | 4,2 | 1600 | |
| Zone rurale | 89,1 | 85,5 | 92,7 | 6,5 | 3,7 | 9,3 | 4,4 | 2,1 | 6,8 | 438 | |
| Suisse alémanique | 90,0 | 88,0 | 92,0 | 6,9 | 5,2 | 8,6 | 3,1 | 1,9 | 4,2 | 1019 | |
| Suisse romande | 87,6 | 85,3 | 89,9 | 8,9 | 6,8 | 10,9 | 3,6 | 2,3 | 4,8 | 1813 | |
| Suisse italienne | 87,6 | 83,9 | 91,4 | 8,2 | 5,1 | 11,4 | 4,1 | 1,9 | 6,4 | 315 | |
| ZH | 91,8 | 88,7 | 94,9 | 5,4 | 2,9 | 8,0 | 2,7 | 0,9 | 4,6 | 325 | |
| CH sans ZH | 88,8 | 87,0 | 90,5 | 7,9 | 6,4 | 9,4 | 3,3 | 2,4 | 4,3 | 2822 | |
| VD | 88,5 | 84,8 | 92,2 | 7,0 | 4,0 | 10,0 | 4,5 | 2,2 | 6,9 | 314 | |
| CH sans VD | 89,4 | 87,7 | 91,0 | 7,5 | 6,1 | 8,9 | 3,1 | 2,2 | 4,0 | 2833 | |
| VS | 82,8 | 78,1 | 87,5 | 14,2 | 9,8 | 18,7 | 3,0 | 1,1 | 4,9 | 313 | |
| CH sans VS | 89,6 | 88,0 | 91,2 | 7,2 | 5,8 | 8,5 | 3,3 | 2,3 | 4,2 | 2834 | |
| GE | 87,9 | 85,8 | 90,0 | 8,5 | 6,8 | 10,3 | 3,5 | 2,4 | 4,7 | 1125 | |
| CH sans GE | 89,4 | 87,8 | 91,0 | 7,4 | 6,0 | 8,8 | 3,2 | 2,3 | 4,1 | 2'022 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.38 Le médecin habituel ou le personnel de santé connaît les informations importantes du passé médical, Suisse (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| Total | 91,0 | 88,6 | 93,3 | 7,0 | 4,8 | 9,3 | 2,0 | 1,1 | 2,9 | 1027 | |
| Homme | 92,6 | 90,0 | 95,3 | 5,5 | 3,1 | 8,0 | 1,8 | 0,7 | 2,9 | 468 | |
| Femme | 89,7 | 86,1 | 93,3 | 8,1 | 4,7 | 11,5 | 2,2 | 0,8 | 3,5 | 559 | |
| 65–69 ans | 92,2 | 88,7 | 95,7 | 5,3 | 2,3 | 8,3 | 2,5 | 0,6 | 4,5 | 325 | |
| 70–74 ans | 94,4 | 91,6 | 97,2 | 3,5 | 1,2 | 5,8 | 2,1 | 0,5 | 3,7 | 288 | |
| 75–79 ans | 88,2 | 81,7 | 94,6 | 10,4 | 4,1 | 16,7 | 1,4 | 0,0 | 3,4 | 201 | |
| 80+ ans | 88,7 | 83,0 | 94,3 | 9,4 | 3,9 | 14,9 | 1,9 | 0,3 | 3,5 | 213 | |
| Scolarité obligatoire | 87,0 | 80,3 | 93,7 | 10,2 | 3,6 | 16,7 | 2,8 | 0,7 | 4,9 | 198 | |
| Secondaire II | 91,9 | 89,2 | 94,7 | 6,6 | 4,0 | 9,1 | 1,5 | 0,4 | 2,5 | 607 | |
| Tertiaire | 92,9 | 89,1 | 96,8 | 3,2 | 0,8 | 5,6 | 3,9 | 0,9 | 7,0 | 206 | |
| Revenu sup. à la moyenne | 92,1 | 87,1 | 97,1 | 4,4 | 0,8 | 8,1 | 3,5 | 0,0 | 7,1 | 171 | |
| Revenu dans la moyenne | 86,3 | 78,7 | 93,9 | 10,4 | 3,2 | 17,7 | 3,3 | 0,2 | 6,4 | 190 | |
| Revenu inf. à la moyenne | 92,3 | 89,6 | 94,9 | 6,3 | 3,8 | 8,9 | 1,4 | 0,6 | 2,2 | 612 | |
| Né en Suisse | 92,3 | 89,9 | 94,7 | 6,1 | 3,8 | 8,3 | 1,6 | 0,7 | 2,6 | 822 | |
| Né à l'étranger | 85,5 | 78,6 | 92,4 | 10,7 | 4,1 | 17,4 | 3,8 | 1,3 | 6,2 | 204 | |
| Ville | 91,5 | 86,4 | 96,7 | 7,1 | 2,1 | 12,2 | 1,3 | 0,1 | 2,5 | 275 | |
| Agglomération | 91,2 | 88,3 | 94,2 | 6,0 | 3,5 | 8,6 | 2,7 | 1,1 | 4,3 | 513 | |
| Zone rurale | 89,8 | 84,7 | 95,0 | 8,8 | 3,8 | 13,8 | 1,4 | 0,0 | 2,8 | 239 | |
| Malade | 91,8 | 87,6 | 96,1 | 6,3 | 2,4 | 10,1 | 1,9 | 0,0 | 3,7 | 297 | |
| Non-malade | 90,6 | 87,7 | 93,4 | 7,4 | 4,6 | 10,1 | 2,1 | 1,0 | 3,1 | 727 | |
| Suisse alémanique | 91,3 | 88,4 | 94,3 | 6,6 | 3,9 | 9,4 | 2,1 | 0,9 | 3,2 | 525 | |
| Suisse romande | 88,5 | 83,9 | 93,1 | 9,3 | 4,9 | 13,8 | 2,2 | 0,7 | 3,6 | 337 | |
| Suisse italienne | 96,9 | 93,9 | 99,9 | 2,5 | 0,0 | 5,3 | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 165 | |
| VD | 90,1 | 85,4 | 94,9 | 7,1 | 3,1 | 11,2 | 2,7 | 0,0 | 5,4 | 169 | |
| CH sans VD | 91,0 | 88,5 | 93,6 | 7,0 | 4,6 | 9,4 | 2,0 | 1,0 | 2,9 | 858 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q940A2 : À quelle fréquence votre médecin habituel ou le personnel de santé que vous rencontrez dans votre centre médical habituel passe assez de temps avec vous ?

Base : Répondants ayant un médecin ou un lieu de traitement habituel, non concernés exclus.

Tableau 6.39 Le médecin habituel ou le personnel de santé passe assez de temps avec le patient, comparaison internationale (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| AU | 90,7 | 88,5 | 93,0 | 8,7 | 6,5 | 10,9 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 2472 | |
| NL | 90,5 | 88,3 | 92,7 | 7,1 | 5,2 | 9,0 | 2,5 | 1,3 | 3,7 | 744 | |
| NZ | 90,3 | 87,2 | 93,5 | 8,1 | 5,3 | 10,9 | 1,6 | 0,0 | 3,2 | 496 | |
| CH | 88,5 | 87,0 | 90,1 | 9,6 | 8,1 | 11,0 | 1,9 | 1,3 | 2,5 | 3147 | |
| FR | 85,3 | 82,5 | 88,0 | 12,5 | 9,9 | 15,0 | 2,3 | 1,0 | 3,5 | 747 | |
| DE | 84,7 | 81,9 | 87,6 | 12,4 | 9,8 | 15,0 | 2,8 | 1,5 | 4,2 | 742 | |
| US | 84,7 | 82,1 | 87,3 | 14,3 | 11,7 | 16,9 | 1,0 | 0,3 | 1,6 | 1360 | |
| CA | 83,2 | 81,5 | 84,8 | 14,4 | 12,8 | 15,9 | 2,5 | 1,9 | 3,0 | 4444 | |
| NO | 81,2 | 77,8 | 84,7 | 17,0 | 13,7 | 20,3 | 1,8 | 0,6 | 3,0 | 748 | |
| UK | 75,8 | 72,4 | 79,3 | 19,3 | 16,1 | 22,4 | 4,9 | 3,0 | 6,8 | 743 | |
| SE | 72,8 | 71,4 | 74,1 | 18,5 | 17,4 | 19,7 | 8,7 | 7,9 | 9,5 | 6865 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.40 Le médecin habituel ou le personnel de santé passe assez de temps avec le patient, comparaison internationale (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| NL | 94,1 | 91,7 | 96,5 | 5,7 | 3,3 | 8,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 534 | |
| FR | 94,0 | 92,0 | 96,0 | 5,8 | 3,8 | 7,8 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 858 | |
| NZ | 92,5 | 89,5 | 95,6 | 6,9 | 3,9 | 9,8 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 372 | |
| CH | 92,5 | 90,4 | 94,6 | 7,0 | 4,9 | 9,0 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 1036 | |
| DE | 91,7 | 88,9 | 94,6 | 8,1 | 5,3 | 11,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 543 | |
| AU | 90,5 | 87,2 | 93,9 | 9,4 | 6,0 | 12,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1651 | |
| US | 85,5 | 82,6 | 88,3 | 13,8 | 11,0 | 16,6 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 1074 | |
| UK | 85,0 | 81,4 | 88,6 | 14,5 | 11,0 | 18,1 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 566 | |
| CA | 83,2 | 81,3 | 85,0 | 15,4 | 13,6 | 17,2 | 1,4 | 0,8 | 2,0 | 3071 | |
| NO | 78,8 | 74,9 | 82,7 | 18,7 | 14,9 | 22,4 | 2,5 | 1,0 | 4,1 | 637 | |
| SE | 75,4 | 73,6 | 77,1 | 20,6 | 19,0 | 22,3 | 4,0 | 3,2 | 4,8 | 4606 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.41 Le médecin habituel ou le personnel de santé passe assez de temps avec le patient, Suisse (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 88,5 | 87,0 | 90,1 | 9,6 | 8,1 | 11,0 | 1,9 | 1,3 | 2,5 | 3147 |
| Homme | 88,6 | 86,3 | 91,0 | 9,8 | 7,6 | 12,1 | 1,5 | 0,8 | 2,3 | 1484 |
| Femme | 88,4 | 86,3 | 90,6 | 9,4 | 7,4 | 11,3 | 2,2 | 1,3 | 3,2 | 1663 |
| 65–69 ans | 86,9 | 83,7 | 90,0 | 11,6 | 8,5 | 14,6 | 1,6 | 0,5 | 2,7 | 802 |
| 70–74 ans | 89,4 | 86,5 | 92,3 | 8,3 | 5,7 | 10,9 | 2,3 | 0,9 | 3,8 | 921 |
| 75–79 ans | 91,0 | 88,0 | 94,1 | 6,9 | 4,2 | 9,6 | 2,1 | 0,7 | 3,4 | 679 |
| 80+ ans | 87,4 | 84,1 | 90,8 | 10,9 | 7,7 | 14,1 | 1,7 | 0,6 | 2,8 | 745 |
| Scolarité obligatoire | 83,8 | 79,9 | 87,7 | 13,5 | 9,9 | 17,1 | 2,7 | 1,1 | 4,3 | 686 |
| Secondaire II | 90,1 | 88,2 | 92,0 | 8,3 | 6,5 | 10,0 | 1,7 | 0,9 | 2,4 | 1724 |
| Tertiaire | 90,1 | 86,8 | 93,3 | 8,6 | 5,5 | 11,7 | 1,3 | 0,3 | 2,4 | 710 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 88,5 | 86,7 | 90,3 | 9,6 | 7,9 | 11,3 | 1,9 | 1,2 | 2,6 | 2364 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 88,6 | 85,5 | 91,6 | 9,5 | 6,7 | 12,4 | 1,9 | 0,6 | 3,2 | 783 |
| Né en Suisse | 90,0 | 88,3 | 91,7 | 8,2 | 6,6 | 9,7 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 2172 |
| Né à l'étranger | 83,0 | 79,0 | 87,0 | 14,8 | 11,0 | 18,6 | 2,2 | 0,7 | 3,6 | 970 |
| Medical Home | 94,6 | 92,8 | 96,4 | 5,4 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1249 |
| Sans Medical Home | 70,2 | 64,6 | 75,7 | 26,6 | 21,3 | 32,0 | 3,2 | 1,1 | 5,2 | 635 |
| Malade | 89,0 | 86,1 | 91,9 | 10,4 | 7,5 | 13,2 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 938 |
| Non-malade | 88,9 | 87,0 | 90,7 | 8,9 | 7,2 | 10,5 | 2,3 | 1,5 | 3,1 | 2110 |
| Malade avec Medical Home | 94,0 | 90,8 | 97,2 | 6,0 | 2,7 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 71,1 | 60,6 | 81,7 | 28,6 | 18,1 | 39,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 200 |
| Ville | 87,7 | 84,6 | 90,7 | 10,5 | 7,6 | 13,4 | 1,8 | 0,7 | 2,9 | 998 |
| Agglomération | 89,1 | 86,9 | 91,3 | 9,4 | 7,3 | 11,5 | 1,5 | 0,8 | 2,2 | 1600 |
| Zone rurale | 88,3 | 84,7 | 92,0 | 9,0 | 5,8 | 12,2 | 2,6 | 0,8 | 4,5 | 438 |
| Suisse alémanique | 89,7 | 87,6 | 91,7 | 8,9 | 7,0 | 10,9 | 1,4 | 0,6 | 2,2 | 1019 |
| Suisse romande | 86,0 | 83,5 | 88,4 | 11,1 | 8,9 | 13,4 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 1813 |
| Suisse italienne | 85,1 | 81,2 | 89,1 | 11,0 | 7,5 | 14,5 | 3,9 | 1,7 | 6,1 | 315 |
| ZH | 91,6 | 88,4 | 94,7 | 7,2 | 4,3 | 10,2 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 325 |
| CH sans ZH | 87,9 | 86,1 | 89,7 | 10,1 | 8,4 | 11,7 | 2,0 | 1,3 | 2,8 | 2822 |
| VD | 86,8 | 82,8 | 90,8 | 10,7 | 7,0 | 14,4 | 2,6 | 0,8 | 4,3 | 314 |
| CH sans VD | 88,7 | 87,0 | 90,4 | 9,5 | 7,9 | 11,0 | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 2833 |
| VS | 87,8 | 83,9 | 91,7 | 8,5 | 5,1 | 11,9 | 3,7 | 1,6 | 5,8 | 313 |
| CH sans VS | 88,6 | 86,9 | 90,2 | 9,6 | 8,1 | 11,1 | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 2834 |
| GE | 86,5 | 84,3 | 88,7 | 10,4 | 8,3 | 12,4 | 3,1 | 2,1 | 4,2 | 1125 |
| CH sans GE | 88,6 | 87,0 | 90,3 | 9,5 | 8,0 | 11,1 | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 2022 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.42 Le médecin habituel ou le personnel de santé passe assez de temps avec le patient, Suisse (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 92,5 | 90,4 | 94,6 | 7,0 | 4,9 | 9,0 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 1036 |
| Homme | 94,9 | 92,6 | 97,1 | 4,6 | 2,5 | 6,8 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 468 |
| Femme | 90,8 | 87,6 | 94,0 | 8,7 | 5,5 | 11,8 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 568 |
| 65–69 ans | 95,9 | 93,4 | 98,4 | 4,0 | 1,5 | 6,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 327 |
| 70–74 ans | 91,7 | 87,3 | 96,2 | 7,2 | 2,9 | 11,4 | 1,1 | 0,0 | 2,7 | 292 |
| 75–79 ans | 90,3 | 84,7 | 95,8 | 8,9 | 3,5 | 14,3 | 0,8 | 0,0 | 2,4 | 202 |
| 80+ ans | 91,4 | 87,1 | 95,6 | 8,5 | 4,3 | 12,7 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 215 |
| Scolarité obligatoire | 94,4 | 91,2 | 97,6 | 5,5 | 2,3 | 8,7 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 203 |
| Secondaire II | 91,8 | 89,0 | 94,7 | 7,9 | 5,1 | 10,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 611 |
| Tertiaire | 95,1 | 91,9 | 98,3 | 4,9 | 1,7 | 8,1 | . | . | . | 206 |
| Revenu sup. à la moyenne | 95,7 | 92,7 | 98,8 | 4,3 | 1,2 | 7,3 | . | . | . | 175 |
| Revenu dans la moyenne | 88,1 | 80,3 | 95,9 | 10,1 | 2,5 | 17,6 | 1,8 | 0,0 | 4,4 | 190 |
| Revenu inf. à la moyenne | 92,8 | 90,6 | 95,0 | 6,9 | 4,7 | 9,1 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 618 |
| Né en Suisse | 94,2 | 92,3 | 96,0 | 5,2 | 3,5 | 7,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 828 |
| Né à l'étranger | 84,6 | 76,8 | 92,4 | 15,2 | 7,4 | 23,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 207 |
| Ville | 94,4 | 90,3 | 98,5 | 5,6 | 1,5 | 9,7 | . | . | . | 273 |
| Agglomération | 92,4 | 89,7 | 95,2 | 6,6 | 4,0 | 9,1 | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 517 |
| Zone rurale | 90,8 | 86,0 | 95,5 | 9,1 | 4,4 | 13,8 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 246 |
| Medical Home | 96,5 | 94,1 | 98,8 | 3,1 | 0,9 | 5,3 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 391 |
| Sans Medical Home | 78,5 | 69,9 | 87,0 | 20,6 | 12,2 | 29,1 | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 154 |
| Malade | 92,8 | 88,7 | 96,9 | 7,2 | 3,1 | 11,3 | . | . | . | 301 |
| Non-malade | 92,4 | 89,9 | 94,8 | 6,9 | 4,5 | 9,2 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 733 |
| Malade avec Medical Home | 94,4 | 88,9 | 99,9 | 5,6 | 0,1 | 11,1 | . | . | . | 146 |
| Malade sans Medical Home | 83,5 | 72,9 | 94,1 | 16,5 | 5,9 | 27,1 | . | . | . | 50 |
| Suisse alémanique | 92,9 | 90,3 | 95,6 | 6,4 | 3,8 | 9,0 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 529 |
| Suisse romande | 92,0 | 88,4 | 95,5 | 7,9 | 4,4 | 11,5 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 340 |
| Suisse italienne | 88,8 | 83,5 | 94,2 | 10,6 | 5,4 | 15,8 | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 167 |
| VD | 94,7 | 91,1 | 98,3 | 5,3 | 1,7 | 8,9 | . | . | . | 171 |
| CH sans VD | 92,3 | 90,0 | 94,6 | 7,1 | 4,9 | 9,3 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 865 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q940A3 : À quelle fréquence votre médecin habituel ou le personnel de santé que vous rencontrez dans votre centre médical habituel vous encourage à poser des questions ?

Base : Répondants ayant un médecin ou un lieu de traitement habituel, non concernés exclus.

Tableau 6.43 Patient encouragé à poser des questions, comparaison internationale (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| NZ | 85,9 | 82,3 | 89,5 | 12,1 | 8,7 | 15,4 | 2,0 | 0,5 | 3,6 | 496 |
| AU | 84,9 | 82,1 | 87,7 | 11,9 | 9,4 | 14,4 | 3,2 | 1,8 | 4,6 | 2472 |
| US | 81,3 | 78,5 | 84,0 | 16,0 | 13,4 | 18,6 | 2,7 | 1,6 | 3,8 | 1360 |
| FR | 75,7 | 72,4 | 79,0 | 23,0 | 19,7 | 26,2 | 1,3 | 0,6 | 2,1 | 747 |
| CA | 69,6 | 67,7 | 71,5 | 25,7 | 23,9 | 27,5 | 4,7 | 3,9 | 5,5 | 4444 |
| CH | 63,6 | 61,1 | 66,0 | 30,2 | 27,9 | 32,5 | 6,2 | 5,0 | 7,4 | 3147 |
| DE | 60,6 | 56,7 | 64,5 | 30,5 | 26,8 | 34,1 | 9,0 | 6,8 | 11,2 | 742 |
| UK | 58,3 | 54,3 | 62,3 | 32,7 | 28,8 | 36,5 | 9,0 | 6,7 | 11,4 | 743 |
| NL | 51,8 | 47,9 | 55,7 | 33,1 | 29,5 | 36,7 | 15,1 | 12,3 | 18,0 | 744 |
| NO | 37,8 | 33,6 | 41,9 | 55,1 | 50,9 | 59,4 | 7,1 | 4,9 | 9,3 | 748 |
| SE | 35,4 | 34,0 | 36,8 | 43,3 | 41,8 | 44,8 | 21,3 | 20,1 | 22,5 | 6865 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.44 Patient encouragé à poser des questions, comparaison internationale (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| FR | 87,4 | 84,7 | 90,1 | 12,2 | 9,5 | 14,8 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 854 |
| DE | 80,5 | 76,2 | 84,9 | 18,1 | 13,9 | 22,3 | 1,4 | 0,0 | 2,7 | 516 |
| US | 79,9 | 76,9 | 83,0 | 18,5 | 15,6 | 21,5 | 1,5 | 0,7 | 2,4 | 1067 |
| NZ | 78,5 | 72,5 | 84,5 | 19,9 | 14,0 | 25,9 | 1,6 | 0,4 | 2,8 | 356 |
| AU | 78,1 | 73,4 | 82,8 | 19,3 | 15,0 | 23,7 | 2,6 | 0,4 | 4,8 | 1605 |
| UK | 77,6 | 73,3 | 81,8 | 20,9 | 16,8 | 25,0 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 564 |
| CA | 71,0 | 68,9 | 73,2 | 27,3 | 25,2 | 29,4 | 1,7 | 1,1 | 2,3 | 3041 |
| CH | 69,1 | 65,3 | 72,9 | 29,6 | 25,8 | 33,3 | 1,3 | 0,5 | 2,1 | 943 |
| NL | 54,9 | 49,4 | 60,5 | 44,2 | 38,7 | 49,8 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 503 |
| SE | 39,5 | 37,5 | 41,5 | 52,0 | 50,0 | 54,1 | 8,5 | 7,3 | 9,6 | 4351 |
| NO | 37,2 | 32,5 | 41,9 | 56,8 | 52,0 | 61,7 | 6,0 | 3,7 | 8,2 | 603 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.45 Patient encouragé à poser des questions, Suisse (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | Échantillon | | |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 63,6 | 61,1 | 66,0 | 30,2 | 27,9 | 32,5 | 6,2 | 5,0 | 7,4 | 3147 |
| Homme | 61,8 | 58,2 | 65,4 | 32,9 | 29,4 | 36,4 | 5,3 | 3,6 | 6,9 | 1484 |
| Femme | 65,0 | 61,7 | 68,2 | 28,1 | 25,0 | 31,2 | 7,0 | 5,3 | 8,6 | 1663 |
| 65–69 ans | 62,2 | 57,5 | 66,9 | 32,2 | 27,7 | 36,8 | 5,6 | 3,4 | 7,7 | 802 |
| 70–74 ans | 64,1 | 59,6 | 68,7 | 29,1 | 24,8 | 33,4 | 6,8 | 4,3 | 9,3 | 921 |
| 75–79 ans | 62,0 | 56,8 | 67,3 | 32,7 | 27,6 | 37,8 | 5,3 | 3,1 | 7,5 | 679 |
| 80+ ans | 65,8 | 61,0 | 70,6 | 27,0 | 22,5 | 31,5 | 7,2 | 4,7 | 9,7 | 745 |
| Scolarité obligatoire | 64,2 | 59,2 | 69,3 | 30,5 | 25,6 | 35,4 | 5,3 | 2,9 | 7,6 | 686 |
| Secondaire II | 63,0 | 59,8 | 66,1 | 30,6 | 27,6 | 33,6 | 6,5 | 4,9 | 8,0 | 1724 |
| Tertiaire | 66,5 | 61,1 | 71,8 | 27,6 | 22,5 | 32,7 | 5,9 | 3,5 | 8,4 | 710 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 62,7 | 59,9 | 65,5 | 31,1 | 28,4 | 33,9 | 6,1 | 4,8 | 7,5 | 2364 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 66,0 | 61,3 | 70,6 | 27,6 | 23,2 | 32,0 | 6,4 | 4,1 | 8,7 | 783 |
| Né en Suisse | 62,7 | 59,9 | 65,5 | 30,5 | 27,9 | 33,2 | 6,7 | 5,3 | 8,1 | 2172 |
| Né à l'étranger | 66,7 | 62,0 | 71,5 | 29,0 | 24,4 | 33,6 | 4,3 | 2,2 | 6,3 | 970 |
| Medical Home | 73,8 | 70,2 | 77,3 | 23,6 | 20,2 | 27,0 | 2,6 | 1,4 | 3,8 | 1249 |
| Sans Medical Home | 40,3 | 34,4 | 46,1 | 57,3 | 51,4 | 63,1 | 2,5 | 1,2 | 3,7 | 635 |
| Malade | 66,3 | 61,9 | 70,7 | 29,5 | 25,2 | 33,8 | 4,2 | 2,3 | 6,0 | 938 |
| Non-malade | 62,9 | 60,0 | 65,9 | 30,0 | 27,2 | 32,9 | 7,0 | 5,5 | 8,5 | 2110 |
| Malade avec Medical Home | 76,0 | 70,3 | 81,7 | 22,1 | 16,5 | 27,7 | 1,9 | 0,3 | 3,4 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 41,4 | 30,6 | 52,3 | 56,7 | 45,8 | 67,6 | 1,9 | 0,0 | 4,1 | 200 |
| Ville | 64,1 | 59,7 | 68,6 | 30,7 | 26,4 | 35,1 | 5,1 | 3,2 | 7,1 | 998 |
| Agglomération | 63,4 | 59,9 | 66,9 | 31,2 | 27,8 | 34,6 | 5,4 | 4,0 | 6,9 | 1600 |
| Zone rurale | 63,8 | 58,3 | 69,4 | 27,1 | 22,0 | 32,2 | 9,1 | 5,6 | 12,5 | 438 |
| Suisse alémanique | 61,6 | 58,4 | 64,8 | 32,4 | 29,2 | 35,5 | 6,0 | 4,5 | 7,6 | 1019 |
| Suisse romande | 67,9 | 64,8 | 71,0 | 25,8 | 22,9 | 28,8 | 6,3 | 4,7 | 7,9 | 1813 |
| Suisse italienne | 69,7 | 64,5 | 74,9 | 22,1 | 17,3 | 26,9 | 8,2 | 5,2 | 11,2 | 315 |
| ZH | 59,2 | 53,7 | 64,8 | 33,7 | 28,4 | 39,1 | 7,0 | 4,2 | 9,9 | 325 |
| CH sans ZH | 64,4 | 61,8 | 67,1 | 29,5 | 26,9 | 32,1 | 6,0 | 4,7 | 7,3 | 2822 |
| VD | 66,3 | 60,9 | 71,7 | 25,5 | 20,5 | 30,5 | 8,2 | 5,2 | 11,3 | 314 |
| CH sans VD | 63,3 | 60,7 | 65,9 | 30,7 | 28,2 | 33,2 | 6,0 | 4,8 | 7,3 | 2833 |
| VS | 66,2 | 60,6 | 71,8 | 28,4 | 23,0 | 33,9 | 5,4 | 3,0 | 7,8 | 313 |
| CH sans VS | 63,4 | 60,9 | 66,0 | 30,3 | 27,9 | 32,7 | 6,2 | 5,0 | 7,5 | 2834 |
| GE | 69,6 | 66,7 | 72,5 | 24,7 | 22,0 | 27,4 | 5,7 | 4,3 | 7,2 | 1125 |
| CH sans GE | 63,2 | 60,7 | 65,8 | 30,6 | 28,1 | 33,0 | 6,2 | 5,0 | 7,5 | 2022 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.46 Patient encouragé à poser des questions, Suisse (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 69,1 | 65,3 | 72,9 | 29,6 | 25,8 | 33,4 | 1,3 | 0,5 | 2,1 | 943 |
| Homme | 70,4 | 64,7 | 76,0 | 28,3 | 22,7 | 33,9 | 1,3 | 0,0 | 2,6 | 428 |
| Femme | 68,2 | 63,0 | 73,3 | 30,5 | 25,4 | 35,6 | 1,3 | 0,3 | 2,4 | 515 |
| 65–69 ans | 73,8 | 67,6 | 80,1 | 24,8 | 18,7 | 30,9 | 1,4 | 0,0 | 3,0 | 302 |
| 70–74 ans | 67,6 | 60,7 | 74,5 | 30,5 | 23,7 | 37,3 | 1,9 | 0,0 | 3,8 | 263 |
| 75–79 ans | 72,1 | 63,9 | 80,3 | 26,7 | 18,6 | 34,8 | 1,2 | 0,0 | 3,0 | 184 |
| 80+ ans | 62,2 | 53,3 | 71,1 | 37,0 | 28,1 | 45,9 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 194 |
| Scolarité obligatoire | 59,4 | 50,3 | 68,5 | 38,8 | 29,7 | 48,0 | 1,8 | 0,0 | 3,7 | 182 |
| Secondaire II | 70,5 | 65,8 | 75,2 | 28,4 | 23,8 | 33,1 | 1,0 | 0,2 | 1,9 | 557 |
| Tertiaire | 79,8 | 73,0 | 86,5 | 19,5 | 12,9 | 26,2 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 191 |
| Revenu sup. à la moyenne | 73,2 | 64,3 | 82,1 | 26,8 | 17,9 | 35,7 | . | . | . | 147 |
| Revenu dans la moyenne | 67,8 | 58,5 | 77,0 | 30,5 | 21,4 | 39,7 | 1,7 | 0,0 | 3,9 | 178 |
| Revenu inf. à la moyenne | 69,4 | 64,6 | 74,2 | 29,3 | 24,6 | 34,0 | 1,3 | 0,4 | 2,3 | 581 |
| Né en Suisse | 70,4 | 66,2 | 74,5 | 28,1 | 24,0 | 32,2 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 749 |
| Né à l'étranger | 62,8 | 53,2 | 72,3 | 36,6 | 27,1 | 46,1 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 193 |
| Ville | 70,1 | 62,2 | 78,0 | 29,2 | 21,3 | 37,2 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 245 |
| Agglomération | 64,8 | 59,3 | 70,3 | 33,9 | 28,4 | 39,4 | 1,3 | 0,1 | 2,5 | 462 |
| Zone rurale | 75,7 | 68,7 | 82,6 | 22,3 | 15,5 | 29,1 | 2,0 | 0,0 | 4,1 | 236 |
| Medical Home | 80,7 | 75,6 | 85,8 | 18,2 | 13,2 | 23,2 | 1,1 | 0,0 | 2,6 | 363 |
| Sans Medical Home | 42,1 | 32,0 | 52,2 | 57,4 | 47,3 | 67,6 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 140 |
| Malade | 71,3 | 64,4 | 78,2 | 27,5 | 20,6 | 34,4 | 1,2 | 0,1 | 2,3 | 281 |
| Non-malade | 68,5 | 64,0 | 73,0 | 30,1 | 25,6 | 34,6 | 1,4 | 0,3 | 2,4 | 659 |
| Malade avec Medical Home | 85,9 | 78,9 | 92,8 | 13,9 | 7,0 | 20,8 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 137 |
| Malade sans Medical Home | 25,1 | 11,8 | 38,5 | 73,2 | 59,4 | 87,0 | 1,7 | 0,0 | 5,0 | 46 |
| Suisse alémanique | 67,6 | 62,8 | 72,5 | 30,9 | 26,0 | 35,7 | 1,5 | 0,4 | 2,6 | 479 |
| Suisse romande | 72,1 | 65,9 | 78,3 | 26,9 | 20,8 | 33,1 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 307 |
| Suisse italienne | 75,3 | 67,7 | 82,8 | 23,6 | 16,2 | 31,1 | 1,1 | 0,0 | 2,6 | 157 |
| VD | 72,8 | 65,1 | 80,6 | 25,0 | 17,4 | 32,6 | 2,1 | 0,0 | 4,6 | 157 |
| CH sans VD | 68,7 | 64,6 | 72,8 | 30,0 | 25,9 | 34,1 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 786 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q940A4 : À quelle fréquence votre médecin habituel ou le personnel de santé que vous rencontrez dans votre centre médical habituel explique les choses d'une manière facilement compréhensible ?

Base : Répondants ayant un médecin ou un lieu de traitement habituel, non concernés exclus.

Tableau 6.47 Le médecin habituel ou le personnel de santé explique les choses clairement, comparaison internationale (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| NZ | 94,3 | 91,7 | 97,0 | 5,2 | 2,7 | 7,7 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 496 | |
| AU | 93,7 | 91,8 | 95,6 | 5,6 | 3,9 | 7,2 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 2472 | |
| FR | 92,0 | 89,9 | 94,0 | 7,0 | 5,1 | 8,9 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 747 | |
| US | 91,0 | 88,9 | 93,0 | 8,3 | 6,3 | 10,3 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 1360 | |
| CH | 90,9 | 89,5 | 92,4 | 6,9 | 5,6 | 8,2 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 3147 | |
| NL | 89,3 | 87,0 | 91,6 | 6,3 | 4,6 | 8,1 | 4,3 | 2,8 | 5,9 | 744 | |
| CA | 88,7 | 87,2 | 90,2 | 9,5 | 8,1 | 11,0 | 1,7 | 1,3 | 2,2 | 4444 | |
| DE | 85,9 | 83,1 | 88,6 | 11,8 | 9,3 | 14,4 | 2,3 | 1,2 | 3,4 | 742 | |
| NO | 85,7 | 82,6 | 88,9 | 11,7 | 8,8 | 14,6 | 2,5 | 1,1 | 4,0 | 748 | |
| UK | 83,4 | 80,4 | 86,4 | 12,8 | 10,2 | 15,5 | 3,8 | 2,2 | 5,4 | 743 | |
| SE | 78,1 | 76,9 | 79,4 | 12,6 | 11,6 | 13,6 | 9,3 | 8,4 | 10,1 | 6865 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.48 Le médecin habituel ou le personnel de santé explique les choses clairement, comparaison internationale (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| FR | 96,6 | 95,1 | 98,0 | 2,9 | 1,6 | 4,1 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 855 | |
| CH | 95,4 | 93,9 | 97,0 | 4,2 | 2,7 | 5,6 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1034 | |
| DE | 93,6 | 91,0 | 96,1 | 6,0 | 3,5 | 8,5 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 542 | |
| AU | 92,3 | 89,4 | 95,2 | 7,6 | 4,7 | 10,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1650 | |
| NL | 91,5 | 88,4 | 94,6 | 7,8 | 4,8 | 10,8 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 527 | |
| US | 91,0 | 88,8 | 93,3 | 8,6 | 6,3 | 10,8 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 1078 | |
| NZ | 90,3 | 86,2 | 94,5 | 9,2 | 5,1 | 13,2 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 370 | |
| CA | 89,9 | 88,5 | 91,2 | 9,4 | 8,1 | 10,8 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 3069 | |
| UK | 87,6 | 84,2 | 91,0 | 11,9 | 8,6 | 15,2 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 565 | |
| NO | 84,1 | 80,4 | 87,7 | 14,1 | 10,6 | 17,6 | 1,8 | 0,5 | 3,1 | 624 | |
| SE | 81,9 | 80,3 | 83,5 | 14,6 | 13,2 | 16,1 | 3,4 | 2,7 | 4,2 | 4605 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.49 Le médecin habituel ou le personnel de santé explique les choses clairement, Suisse (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 90,9 | 89,5 | 92,4 | 6,9 | 5,6 | 8,2 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 3147 |
| Homme | 91,3 | 89,2 | 93,4 | 6,7 | 4,9 | 8,6 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1484 |
| Femme | 90,7 | 88,6 | 92,7 | 7,0 | 5,1 | 8,8 | 2,4 | 1,3 | 3,5 | 1663 |
| 65–69 ans | 90,1 | 87,1 | 93,1 | 7,4 | 4,8 | 10,0 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 802 |
| 70–74 ans | 92,5 | 89,9 | 95,0 | 5,6 | 3,4 | 7,8 | 1,9 | 0,5 | 3,3 | 921 |
| 75–79 ans | 90,1 | 86,7 | 93,5 | 8,8 | 5,5 | 12,1 | 1,1 | 0,1 | 2,2 | 679 |
| 80+ ans | 91,1 | 88,2 | 94,0 | 5,9 | 3,5 | 8,2 | 3,1 | 1,2 | 4,9 | 745 |
| Scolarité obligatoire | 88,2 | 84,7 | 91,8 | 9,3 | 6,1 | 12,6 | 2,4 | 0,7 | 4,2 | 686 |
| Secondaire II | 91,9 | 90,1 | 93,6 | 6,1 | 4,5 | 7,6 | 2,1 | 1,1 | 3,0 | 1724 |
| Tertiaire | 91,4 | 88,1 | 94,7 | 6,4 | 3,5 | 9,3 | 2,2 | 0,5 | 3,9 | 710 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 91,2 | 89,5 | 92,9 | 6,8 | 5,3 | 8,3 | 2,0 | 1,1 | 2,8 | 2364 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 90,1 | 87,1 | 93,1 | 7,0 | 4,4 | 9,5 | 2,9 | 1,2 | 4,6 | 783 |
| Né en Suisse | 92,2 | 90,6 | 93,8 | 5,7 | 4,3 | 7,0 | 2,2 | 1,3 | 3,0 | 2172 |
| Né à l'étranger | 86,5 | 82,8 | 90,2 | 11,5 | 7,9 | 15,0 | 2,0 | 0,7 | 3,4 | 970 |
| Medical Home | 96,3 | 94,7 | 97,9 | 3,7 | 2,1 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1249 |
| Sans Medical Home | 75,4 | 70,0 | 80,8 | 23,1 | 17,8 | 28,5 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 635 |
| Malade | 92,2 | 89,6 | 94,8 | 6,5 | 4,2 | 8,8 | 1,3 | 0,1 | 2,5 | 938 |
| Non-malade | 91,1 | 89,3 | 92,9 | 6,3 | 4,8 | 7,8 | 2,6 | 1,6 | 3,6 | 2110 |
| Malade avec Medical Home | 94,6 | 91,3 | 97,9 | 5,3 | 2,0 | 8,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 78,5 | 69,1 | 87,8 | 21,2 | 11,9 | 30,6 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 200 |
| Ville | 91,3 | 88,6 | 94,1 | 6,7 | 4,3 | 9,2 | 1,9 | 0,7 | 3,2 | 998 |
| Agglomération | 90,2 | 87,9 | 92,4 | 7,8 | 5,8 | 9,8 | 2,1 | 1,0 | 3,2 | 1600 |
| Zone rurale | 92,7 | 89,7 | 95,7 | 4,7 | 2,2 | 7,2 | 2,6 | 0,8 | 4,3 | 438 |
| Suisse alémanique | 90,4 | 88,4 | 92,4 | 7,1 | 5,4 | 8,9 | 2,4 | 1,4 | 3,5 | 1019 |
| Suisse romande | 92,3 | 90,5 | 94,1 | 6,2 | 4,7 | 7,8 | 1,4 | 0,5 | 2,3 | 1813 |
| Suisse italienne | 91,4 | 88,2 | 94,6 | 6,2 | 3,5 | 8,9 | 2,4 | 0,6 | 4,1 | 315 |
| ZH | 91,5 | 88,4 | 94,6 | 6,3 | 3,6 | 9,1 | 2,2 | 0,5 | 3,8 | 325 |
| CH sans ZH | 90,8 | 89,2 | 92,5 | 7,0 | 5,5 | 8,4 | 2,2 | 1,4 | 3,1 | 2822 |
| VD | 93,3 | 90,3 | 96,2 | 5,6 | 2,9 | 8,3 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 314 |
| CH sans VD | 90,7 | 89,1 | 92,3 | 7,0 | 5,6 | 8,4 | 2,3 | 1,5 | 3,1 | 2833 |
| VS | 91,8 | 88,6 | 94,9 | 5,9 | 3,2 | 8,7 | 2,3 | 0,7 | 3,9 | 313 |
| CH sans VS | 90,9 | 89,4 | 92,4 | 6,9 | 5,5 | 8,3 | 2,2 | 1,4 | 3,0 | 2834 |
| GE | 91,1 | 89,2 | 92,9 | 7,5 | 5,8 | 9,2 | 1,4 | 0,7 | 2,2 | 1125 |
| CH sans GE | 90,9 | 89,4 | 92,5 | 6,8 | 5,4 | 8,2 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 2022 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.50 Le médecin habituel ou le personnel de santé explique les choses clairement, Suisse (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 95,4 | 93,9 | 97,0 | 4,2 | 2,7 | 5,6 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1034 |
| Homme | 97,1 | 95,4 | 98,7 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 465 |
| Femme | 94,3 | 91,9 | 96,6 | 5,3 | 3,1 | 7,6 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 569 |
| 65–69 ans | 97,5 | 95,7 | 99,2 | 2,4 | 0,7 | 4,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 328 |
| 70–74 ans | 96,4 | 93,5 | 99,4 | 3,0 | 0,3 | 5,7 | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 290 |
| 75–79 ans | 95,0 | 91,5 | 98,4 | 5,0 | 1,6 | 8,5 | . | . | . | 199 |
| 80+ ans | 92,5 | 88,6 | 96,5 | 6,6 | 2,9 | 10,3 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 217 |
| Scolarité obligatoire | 94,2 | 90,8 | 97,6 | 5,0 | 1,8 | 8,2 | 0,8 | 0,0 | 2,1 | 206 |
| Secondaire II | 95,4 | 93,4 | 97,4 | 4,3 | 2,4 | 6,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 603 |
| Tertiaire | 97,8 | 95,9 | 99,6 | 1,9 | 0,2 | 3,6 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 210 |
| Revenu sup. à la moyenne | 99,1 | 97,9 | 100,0 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | . | . | . | 174 |
| Revenu dans la moyenne | 96,5 | 93,9 | 99,0 | 3,5 | 1,0 | 6,1 | . | . | . | 195 |
| Revenu inf. à la moyenne | 94,9 | 92,8 | 97,0 | 4,7 | 2,7 | 6,8 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 612 |
| Né en Suisse | 95,8 | 94,1 | 97,5 | 3,9 | 2,3 | 5,6 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 826 |
| Né à l'étranger | 93,8 | 90,2 | 97,3 | 5,2 | 2,0 | 8,4 | 1,0 | 0,0 | 2,7 | 207 |
| Ville | 94,9 | 91,7 | 98,1 | 5,0 | 1,8 | 8,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 272 |
| Agglomération | 95,5 | 93,3 | 97,7 | 3,8 | 1,8 | 5,8 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 522 |
| Zone rurale | 95,9 | 93,3 | 98,6 | 4,1 | 1,4 | 6,7 | . | . | . | 240 |
| Medical Home | 98,5 | 96,9 | 100,0 | 1,5 | 0,0 | 3,1 | . | . | . | 389 |
| Sans Medical Home | 86,9 | 80,7 | 93,0 | 11,8 | 6,1 | 17,5 | 1,3 | 0,0 | 3,9 | 151 |
| Malade | 95,8 | 93,2 | 98,3 | 4,2 | 1,7 | 6,8 | . | . | . | 302 |
| Non-malade | 95,3 | 93,4 | 97,2 | 4,1 | 2,4 | 5,9 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 729 |
| Malade avec Medical Home | 96,7 | 92,4 | 100,0 | 3,3 | 0,0 | 7,6 | . | . | . | 146 |
| Malade sans Medical Home | 87,5 | 78,0 | 97,1 | 12,5 | 2,9 | 22,0 | . | . | . | 50 |
| Suisse alémanique | 96,1 | 94,2 | 98,0 | 3,5 | 1,7 | 5,2 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 524 |
| Suisse romande | 93,6 | 90,7 | 96,5 | 6,2 | 3,3 | 9,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 339 |
| Suisse italienne | 95,1 | 91,9 | 98,2 | 4,4 | 1,4 | 7,3 | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 171 |
| VD | 94,6 | 91,1 | 98,1 | 5,4 | 1,9 | 8,9 | . | . | . | 173 |
| CH sans VD | 95,5 | 93,9 | 97,1 | 4,0 | 2,5 | 5,6 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 861 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q940A5 : À quelle fréquence votre médecin habituel ou le personnel de santé que vous rencontrez dans votre centre médical habituel vous implique autant que vous le souhaitez dans les décisions concernant vos soins et traitements ?

Base : Répondants ayant un médecin ou un lieu de traitement habituel, non concernés exclus.

Tableau 6.51 Patient impliqué dans les décisions concernant les soins et traitements, comparaison internationale (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| NZ | 92,3 | 89,4 | 95,2 | 5,9 | 3,4 | 8,4 | 1,8 | 0,2 | 3,3 | 496 |
| AU | 91,5 | 89,4 | 93,6 | 7,5 | 5,4 | 9,6 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 2472 |
| US | 87,6 | 85,3 | 89,9 | 10,9 | 8,7 | 13,2 | 1,4 | 0,7 | 2,2 | 1360 |
| CH | 84,4 | 82,6 | 86,2 | 10,3 | 8,8 | 11,9 | 5,3 | 4,2 | 6,4 | 3147 |
| CA | 83,8 | 82,2 | 85,4 | 12,0 | 10,6 | 13,5 | 4,2 | 3,5 | 4,9 | 4444 |
| NL | 78,7 | 75,6 | 81,9 | 11,0 | 8,6 | 13,4 | 10,3 | 8,0 | 12,6 | 744 |
| DE | 76,0 | 72,6 | 79,4 | 15,9 | 13,0 | 18,8 | 8,1 | 6,0 | 10,2 | 742 |
| NO | 74,9 | 71,1 | 78,7 | 18,4 | 15,0 | 21,8 | 6,7 | 4,5 | 8,9 | 748 |
| UK | 74,6 | 71,1 | 78,1 | 18,1 | 15,0 | 21,2 | 7,3 | 5,1 | 9,5 | 743 |
| SE | 64,1 | 62,6 | 65,5 | 17,5 | 16,3 | 18,6 | 18,5 | 17,3 | 19,6 | 6865 |
| FR | 55,0 | 51,2 | 58,9 | 41,4 | 37,6 | 45,2 | 3,6 | 2,1 | 5,1 | 747 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.52 Patient impliqué dans les décisions concernant les soins et traitements, Suisse (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 84,4 | 82,6 | 86,2 | 10,3 | 8,8 | 11,9 | 5,3 | 4,2 | 6,4 | 3147 |
| Homme | 84,5 | 81,8 | 87,2 | 10,7 | 8,4 | 13,0 | 4,8 | 3,2 | 6,4 | 1484 |
| Femme | 84,3 | 81,8 | 86,7 | 10,1 | 8,0 | 12,1 | 5,7 | 4,1 | 7,3 | 1663 |
| 65–69 ans | 82,9 | 79,3 | 86,6 | 11,7 | 8,6 | 14,9 | 5,3 | 3,2 | 7,5 | 802 |
| 70–74 ans | 86,1 | 82,8 | 89,4 | 9,0 | 6,3 | 11,8 | 4,9 | 2,8 | 6,9 | 921 |
| 75–79 ans | 84,5 | 80,6 | 88,4 | 11,1 | 7,6 | 14,5 | 4,5 | 2,3 | 6,6 | 679 |
| 80+ ans | 84,2 | 80,5 | 87,8 | 9,5 | 6,7 | 12,2 | 6,4 | 3,8 | 8,9 | 745 |
| Scolarité obligatoire | 77,6 | 73,1 | 82,0 | 15,1 | 11,3 | 18,9 | 7,3 | 4,4 | 10,2 | 686 |
| Secondaire II | 86,1 | 83,9 | 88,2 | 9,0 | 7,2 | 10,8 | 4,9 | 3,6 | 6,3 | 1724 |
| Tertiaire | 90,0 | 86,7 | 93,2 | 6,8 | 4,0 | 9,6 | 3,2 | 1,4 | 5,0 | 710 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 84,6 | 82,5 | 86,7 | 9,7 | 8,0 | 11,4 | 5,7 | 4,4 | 7,1 | 2364 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 83,8 | 80,2 | 87,3 | 12,2 | 9,0 | 15,5 | 4,0 | 2,2 | 5,8 | 783 |
| Né en Suisse | 85,6 | 83,6 | 87,6 | 9,4 | 7,7 | 11,1 | 5,0 | 3,8 | 6,3 | 2172 |
| Né à l'étranger | 80,0 | 75,9 | 84,2 | 13,6 | 10,0 | 17,2 | 6,3 | 3,7 | 9,0 | 970 |
| Medical Home | 94,3 | 92,5 | 96,2 | 4,4 | 2,8 | 6,0 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | 1249 |
| Sans Medical Home | 63,9 | 58,1 | 69,7 | 31,2 | 25,5 | 36,8 | 4,9 | 2,3 | 7,6 | 635 |
| Malade | 88,3 | 85,5 | 91,2 | 10,2 | 7,5 | 12,9 | 1,5 | 0,4 | 2,5 | 938 |
| Non-malade | 83,2 | 80,9 | 85,5 | 10,0 | 8,2 | 11,9 | 6,7 | 5,2 | 8,3 | 2110 |
| Malade avec Medical Home | 95,4 | 92,9 | 97,9 | 4,4 | 2,0 | 6,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 65,5 | 54,9 | 76,1 | 33,5 | 22,9 | 44,0 | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 200 |
| Ville | 87,1 | 84,0 | 90,1 | 8,8 | 6,3 | 11,3 | 4,1 | 2,2 | 6,0 | 998 |
| Agglomération | 84,1 | 81,5 | 86,8 | 10,7 | 8,4 | 12,9 | 5,2 | 3,6 | 6,8 | 1600 |
| Zone rurale | 82,3 | 77,9 | 86,8 | 10,6 | 7,0 | 14,2 | 7,0 | 4,0 | 10,1 | 438 |
| Suisse alémanique | 85,0 | 82,6 | 87,4 | 9,5 | 7,5 | 11,4 | 5,6 | 4,0 | 7,1 | 1019 |
| Suisse romande | 82,9 | 80,3 | 85,5 | 12,6 | 10,3 | 15,0 | 4,5 | 3,1 | 5,8 | 1813 |
| Suisse italienne | 82,9 | 78,7 | 87,1 | 11,6 | 8,1 | 15,2 | 5,5 | 2,9 | 8,0 | 315 |
| ZH | 85,8 | 81,8 | 89,8 | 8,0 | 4,9 | 11,1 | 6,2 | 3,4 | 9,0 | 325 |
| CH sans ZH | 84,1 | 82,0 | 86,1 | 10,8 | 9,1 | 12,5 | 5,1 | 3,9 | 6,3 | 2822 |
| VD | 82,3 | 77,8 | 86,7 | 13,8 | 9,8 | 17,8 | 3,9 | 1,7 | 6,1 | 314 |
| CH sans VD | 84,6 | 82,6 | 86,5 | 10,0 | 8,4 | 11,6 | 5,4 | 4,2 | 6,6 | 2833 |
| VS | 83,8 | 79,5 | 88,2 | 10,6 | 6,8 | 14,3 | 5,6 | 3,1 | 8,1 | 313 |
| CH sans VS | 84,4 | 82,5 | 86,3 | 10,3 | 8,8 | 11,9 | 5,3 | 4,1 | 6,5 | 2834 |
| GE | 83,5 | 81,1 | 85,8 | 11,4 | 9,4 | 13,4 | 5,2 | 3,8 | 6,5 | 1125 |
| CH sans GE | 84,4 | 82,5 | 86,3 | 10,3 | 8,7 | 11,9 | 5,3 | 4,1 | 6,5 | 2022 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.53 Relation avec le médecin régulier, comparaison internationale (2017, en %)

| Connait toujours ou souvent les informations importantes du passé médical | | | | Passe toujours ou souvent assez de temps avec le patient | | | | Patient toujours ou souvent encouragé à poser des questions | | | | Explique toujours ou souvent les choses clairement | | | Implique toujours ou souvent le patient dans les décisions | | | Échantillon n | | |
|---|-------------|----------------|----------------|--|-------------|----------------|----------------|---|-------------|----------------|----------------|--|-------------|----------------|--|-----------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| Pays | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part en % | | IC limite inf. | IC limite sup. |
| NZ | 91,1 | 88,2 | 94,1 | AU | 90,7 | 88,5 | 93 | NZ | 85,9 | 82,3 | 89,5 | NZ | 94,3 | 91,7 | 97,0 | NZ | 92,3 | 89,4 | 95,2 | 496 |
| CH | 89,3 | 87,8 | 90,8 | NL | 90,5 | 88,3 | 92,7 | AU | 84,9 | 82,1 | 87,7 | AU | 93,7 | 91,8 | 95,6 | AU | 91,5 | 89,4 | 93,6 | 2472 |
| AU | 89,0 | 86,5 | 91,5 | NZ | 90,3 | 87,2 | 93,5 | US | 81,3 | 78,5 | 84 | FR | 92,0 | 89,9 | 94,0 | US | 87,6 | 85,3 | 89,9 | 1360 |
| FR | 87,9 | 85,4 | 90,4 | CH | 88,5 | 87 | 90,1 | FR | 75,7 | 72,4 | 79 | US | 91,0 | 88,9 | 93,0 | CH | 84,4 | 82,6 | 86,2 | 3147 |
| NL | 86,7 | 84,1 | 89,2 | FR | 85,3 | 82,5 | 88 | CA | 69,6 | 67,7 | 71,5 | CH | 90,9 | 89,5 | 92,4 | CA | 83,8 | 82,2 | 85,4 | 4444 |
| US | 86,3 | 83,8 | 88,7 | DE | 84,7 | 81,9 | 87,6 | CH | 63,6 | 61,1 | 66 | NL | 89,3 | 87,0 | 91,6 | NL | 78,7 | 75,6 | 81,9 | 744 |
| CA | 85,9 | 84,4 | 87,4 | US | 84,7 | 82,1 | 87,3 | DE | 60,6 | 56,7 | 64,5 | CA | 88,7 | 87,2 | 90,2 | DE | 76,0 | 72,6 | 79,4 | 742 |
| DE | 84,7 | 81,9 | 87,5 | CA | 83,2 | 81,5 | 84,8 | UK | 58,3 | 54,3 | 62,3 | DE | 85,9 | 83,1 | 88,6 | NO | 74,9 | 71,1 | 78,7 | 748 |
| UK | 74,5 | 70,9 | 78,0 | NO | 81,2 | 77,8 | 84,7 | NL | 51,8 | 47,9 | 55,7 | NO | 85,7 | 82,6 | 88,9 | UK | 74,6 | 71,1 | 78,1 | 743 |
| NO | 73,9 | 70,1 | 77,8 | UK | 75,8 | 72,4 | 79,3 | NO | 37,8 | 33,6 | 41,9 | UK | 83,4 | 80,4 | 86,4 | SE | 64,1 | 62,6 | 65,5 | 6865 |
| SE | 61,0 | 59,6 | 62,5 | SE | 72,8 | 71,4 | 74,1 | SE | 35,4 | 34 | 36,8 | SE | 78,1 | 76,9 | 79,4 | FR | 55,0 | 51,2 | 58,9 | 747 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.54 Relation avec le médecin régulier, comparaison internationale (2014, en %)

| Connait toujours ou souvent les informations importantes du passé médical | | | | Passe toujours ou souvent assez de temps avec le patient | | | | Patient toujours ou souvent encouragé à poser des questions | | | | Explique toujours ou souvent les choses clairement | | | | Échantillon n |
|---|-------------|----------------|----------------|--|-------------|----------------|----------------|---|-------------|----------------|----------------|--|-------------|----------------|----------------|------------------|
| Pays | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| DE | 96,0 | 94,0 | 98,1 | NL | 94,1 | 91,7 | 96,5 | FR | 87,4 | 84,7 | 90,1 | FR | 96,6 | 95,1 | 98,0 | 768 |
| NL | 94,2 | 91,8 | 96,6 | FR | 94,0 | 92,0 | 96,0 | DE | 80,5 | 76,2 | 84,9 | CH | 95,4 | 93,9 | 97,0 | 647 |
| AU | 93,1 | 90,6 | 95,6 | NZ | 92,5 | 89,5 | 95,6 | US | 79,9 | 76,9 | 83,0 | DE | 93,6 | 91,0 | 96,1 | 265 |
| FR | 93,1 | 91,0 | 95,1 | CH | 92,5 | 90,4 | 94,6 | NZ | 78,5 | 72,5 | 84,5 | AU | 92,3 | 89,4 | 95,2 | 187 |
| CH | 91,0 | 88,6 | 93,3 | DE | 91,7 | 88,9 | 94,6 | AU | 78,1 | 73,4 | 82,8 | NL | 91,5 | 88,4 | 94,6 | 1084 |
| NZ | 90,9 | 86,9 | 95,0 | AU | 90,5 | 87,2 | 93,9 | UK | 77,6 | 73,3 | 81,8 | US | 91,0 | 88,8 | 93,3 | 1739 |
| UK | 90,4 | 87,5 | 93,2 | US | 85,5 | 82,6 | 88,3 | CA | 71,0 | 68,9 | 73,2 | NZ | 90,3 | 86,2 | 94,5 | 357 |
| CA | 89,0 | 87,5 | 90,5 | UK | 85,0 | 81,4 | 88,6 | CH | 69,1 | 65,3 | 72,9 | CA | 89,9 | 88,5 | 91,2 | 2380 |
| US | 87,7 | 85,2 | 90,2 | CA | 83,2 | 81,3 | 85,0 | NL | 54,9 | 49,4 | 60,5 | UK | 87,6 | 84,2 | 91,0 | 377 |
| NO | 81,1 | 77,2 | 85,0 | NO | 78,8 | 74,9 | 82,7 | SE | 39,5 | 37,5 | 41,5 | NO | 84,1 | 80,4 | 87,7 | 520 |
| SE | 70,2 | 68,4 | 72,1 | SE | 75,4 | 73,6 | 77,1 | NO | 37,2 | 32,5 | 41,9 | SE | 81,9 | 80,3 | 83,5 | 4605 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.55 Relation avec le médecin régulier, Suisse (2017, en %)

| | Connait toujours ou souvent les informations importantes du passé médical | | | Passe toujours ou souvent assez de temps avec le patient | | | Patient toujours ou souvent encouragé à poser des questions | | | Explique toujours ou souvent les choses clairement | | | Implique toujours ou souvent le patient dans les décisions | | | Échantillon n |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 89,3 | 87,8 | 90,8 | 88,5 | 87,0 | 90,1 | 63,6 | 61,1 | 66,0 | 90,9 | 89,5 | 92,4 | 84,4 | 82,6 | 86,2 | 3147 |
| Homme | 89,5 | 87,2 | 91,8 | 88,6 | 86,3 | 91,0 | 61,8 | 58,2 | 65,4 | 91,3 | 89,2 | 93,4 | 84,5 | 81,8 | 87,2 | 1484 |
| Femme | 89,1 | 87,0 | 91,2 | 88,4 | 86,3 | 90,6 | 65,0 | 61,7 | 68,2 | 90,7 | 88,6 | 92,7 | 84,3 | 81,8 | 86,7 | 1663 |
| 65–69 ans | 86,9 | 83,7 | 90,1 | 86,9 | 83,7 | 90,0 | 62,2 | 57,5 | 66,9 | 90,1 | 87,1 | 93,1 | 82,9 | 79,3 | 86,6 | 802 |
| 70–74 ans | 89,3 | 86,4 | 92,3 | 89,4 | 86,5 | 92,3 | 64,1 | 59,6 | 68,7 | 92,5 | 89,9 | 95,0 | 86,1 | 82,8 | 89,4 | 921 |
| 75–79 ans | 91,5 | 88,5 | 94,4 | 91,0 | 88,0 | 94,1 | 62,0 | 56,8 | 67,3 | 90,1 | 86,7 | 93,5 | 84,5 | 80,6 | 88,4 | 679 |
| 80+ ans | 90,1 | 87,1 | 93,1 | 87,4 | 84,1 | 90,8 | 65,8 | 61,0 | 70,6 | 91,1 | 88,2 | 94,0 | 84,2 | 80,5 | 87,8 | 745 |
| Scolarité obligatoire | 88,8 | 85,6 | 92,1 | 83,8 | 79,9 | 87,7 | 64,2 | 59,2 | 69,3 | 88,2 | 84,7 | 91,8 | 77,6 | 73,1 | 82,0 | 686 |
| Secondaire II | 89,4 | 87,4 | 91,4 | 90,1 | 88,2 | 92,0 | 63,0 | 59,8 | 66,1 | 91,9 | 90,1 | 93,6 | 86,1 | 83,9 | 88,2 | 1724 |
| Tertiaire | 91,2 | 88,2 | 94,1 | 90,1 | 86,8 | 93,3 | 66,5 | 61,1 | 71,8 | 91,4 | 88,1 | 94,7 | 90,0 | 86,7 | 93,2 | 710 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 90,1 | 88,4 | 91,8 | 88,5 | 86,7 | 90,3 | 62,7 | 59,9 | 65,5 | 91,2 | 89,5 | 92,9 | 84,6 | 82,5 | 86,7 | 2364 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 87,0 | 83,7 | 90,3 | 88,6 | 85,5 | 91,6 | 66,0 | 61,3 | 70,6 | 90,1 | 87,1 | 93,1 | 83,8 | 80,2 | 87,3 | 783 |
| Né en Suisse | 89,7 | 88,0 | 91,5 | 90,0 | 88,3 | 91,7 | 62,7 | 59,9 | 65,5 | 92,2 | 90,6 | 93,8 | 85,6 | 83,6 | 87,6 | 2172 |
| Né à l'étranger | 87,6 | 84,3 | 91,0 | 83,0 | 79,0 | 87,0 | 66,7 | 62,0 | 71,5 | 86,5 | 82,8 | 90,2 | 80,0 | 75,9 | 84,2 | 970 |
| Medical Home | - | - | - | 94,6 | 92,8 | 96,4 | 73,8 | 70,2 | 77,3 | 96,3 | 94,7 | 97,9 | 94,3 | 92,5 | 96,2 | 1249 |
| Sans Medical Home | - | - | - | 70,2 | 64,6 | 75,7 | 40,3 | 34,4 | 46,1 | 75,4 | 70,0 | 80,8 | 63,9 | 58,1 | 69,7 | 635 |
| Malade | 93,2 | 91,0 | 95,4 | 89,0 | 86,1 | 91,9 | 66,3 | 61,9 | 70,7 | 92,2 | 89,6 | 94,8 | 88,3 | 85,5 | 91,2 | 938 |
| Non-malade | 88,0 | 86,1 | 90,0 | 88,9 | 87,0 | 90,7 | 62,9 | 60,0 | 65,9 | 91,1 | 89,3 | 92,9 | 83,2 | 80,9 | 85,5 | 2110 |
| Malade avec Medical Home | - | - | - | 94,0 | 90,8 | 97,2 | 76,0 | 70,3 | 81,7 | 94,6 | 91,3 | 97,9 | 95,4 | 92,9 | 97,9 | 463 |
| Malade sans Medical Home | - | - | - | 71,1 | 60,6 | 81,7 | 41,4 | 30,6 | 52,3 | 78,5 | 69,1 | 87,8 | 65,5 | 54,9 | 76,1 | 200 |
| Ville | 89,8 | 87,1 | 92,5 | 87,7 | 84,6 | 90,7 | 64,1 | 59,7 | 68,6 | 91,3 | 88,6 | 94,1 | 87,1 | 84,0 | 90,1 | 998 |
| Agglomération | 89,3 | 87,0 | 91,6 | 89,1 | 86,9 | 91,3 | 63,4 | 59,9 | 66,9 | 90,2 | 87,9 | 92,4 | 84,1 | 81,5 | 86,8 | 1600 |
| Zone rurale | 89,1 | 85,5 | 92,7 | 88,3 | 84,7 | 92,0 | 63,8 | 58,3 | 69,4 | 92,7 | 89,7 | 95,7 | 82,3 | 77,9 | 86,8 | 438 |
| Suisse alémanique | 90,0 | 88,0 | 92,0 | 89,7 | 87,6 | 91,7 | 61,6 | 58,4 | 64,8 | 90,4 | 88,4 | 92,4 | 85,0 | 82,6 | 87,4 | 1019 |
| Suisse romande | 87,6 | 85,3 | 89,9 | 86,0 | 83,5 | 88,4 | 67,9 | 64,8 | 71,0 | 92,3 | 90,5 | 94,1 | 82,9 | 80,3 | 85,5 | 1813 |
| Suisse italienne | 87,6 | 83,9 | 91,4 | 85,1 | 81,2 | 89,1 | 69,7 | 64,5 | 74,9 | 91,4 | 88,2 | 94,6 | 82,9 | 78,7 | 87,1 | 315 |
| ZH | 91,8 | 88,7 | 94,9 | 91,6 | 88,4 | 94,7 | 59,2 | 53,7 | 64,8 | 91,5 | 88,4 | 94,6 | 85,8 | 81,8 | 89,8 | 325 |
| CH sans ZH | 88,8 | 87,0 | 90,5 | 87,9 | 86,1 | 89,7 | 64,4 | 61,8 | 67,1 | 90,8 | 89,2 | 92,5 | 84,1 | 82,0 | 86,1 | 2822 |
| VD | 88,5 | 84,8 | 92,2 | 86,8 | 82,8 | 90,8 | 66,3 | 60,9 | 71,7 | 93,3 | 90,3 | 96,2 | 82,3 | 77,8 | 86,7 | 314 |
| CH sans VD | 89,4 | 87,7 | 91,0 | 88,7 | 87,0 | 90,4 | 63,3 | 60,7 | 65,9 | 90,7 | 89,1 | 92,3 | 84,6 | 82,6 | 86,5 | 2833 |
| VS | 82,8 | 78,1 | 87,5 | 87,8 | 83,9 | 91,7 | 66,2 | 60,6 | 71,8 | 91,8 | 88,6 | 94,9 | 83,8 | 79,5 | 88,2 | 313 |
| CH sans VS | 89,6 | 88,0 | 91,2 | 88,6 | 86,9 | 90,2 | 63,4 | 60,9 | 66,0 | 90,9 | 89,4 | 92,4 | 84,4 | 82,5 | 86,3 | 2834 |
| GE | 87,9 | 85,8 | 90,0 | 86,5 | 84,3 | 88,7 | 69,6 | 66,7 | 72,5 | 91,1 | 89,2 | 92,9 | 83,5 | 81,1 | 85,8 | 1125 |
| CH sans GE | 89,4 | 87,8 | 91,0 | 88,6 | 87,0 | 90,3 | 63,2 | 60,7 | 65,8 | 90,9 | 89,4 | 92,5 | 84,4 | 82,5 | 86,3 | 2022 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.56 Relation avec le médecin régulier, Suisse (2014, en %)

| | Connait toujours ou souvent les informations importantes du passé médical | | | Passe toujours ou souvent assez de temps avec le patient | | | Patient toujours ou souvent encouragé à poser des questions | | | Explique toujours ou souvent les choses clairement | | | Échantillon n |
|--------------------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 91,0 | 88,6 | 93,3 | 92,5 | 90,4 | 94,6 | 69,1 | 65,3 | 72,9 | 95,4 | 93,9 | 97,0 | 647 |
| Homme | 92,6 | 90,0 | 95,3 | 94,9 | 92,6 | 97,1 | 70,4 | 64,7 | 76,0 | 97,1 | 95,4 | 98,7 | 310 |
| Femme | 89,7 | 86,1 | 93,3 | 90,8 | 87,6 | 94,0 | 68,2 | 63,0 | 73,3 | 94,3 | 91,9 | 96,6 | 337 |
| 65–69 ans | 92,2 | 88,7 | 95,7 | 95,9 | 93,4 | 98,4 | 73,8 | 67,6 | 80,1 | 97,5 | 95,7 | 99,2 | 222 |
| 70–74 ans | 94,4 | 91,6 | 97,2 | 91,7 | 87,3 | 96,2 | 67,6 | 60,7 | 74,5 | 96,4 | 93,5 | 99,4 | 195 |
| 75–79 ans | 88,2 | 81,7 | 94,6 | 90,3 | 84,7 | 95,8 | 72,1 | 63,9 | 80,3 | 95,0 | 91,5 | 98,4 | 122 |
| 80+ ans | 88,7 | 83,0 | 94,3 | 91,4 | 87,1 | 95,6 | 62,2 | 53,3 | 71,1 | 92,5 | 88,6 | 96,5 | 108 |
| Scolarité obligatoire | 87,0 | 80,3 | 93,7 | 94,4 | 91,2 | 97,6 | 59,4 | 50,3 | 68,5 | 94,2 | 90,8 | 97,6 | 96 |
| Secondaire II | 91,9 | 89,2 | 94,7 | 91,8 | 89,0 | 94,7 | 70,5 | 65,8 | 75,2 | 95,4 | 93,4 | 97,4 | 396 |
| Tertiaire | 92,9 | 89,1 | 96,8 | 95,1 | 91,9 | 98,3 | 79,8 | 73,0 | 86,5 | 97,8 | 95,9 | 99,6 | 148 |
| Revenu sup. à la moyenne | 92,1 | 87,1 | 97,1 | 95,7 | 92,7 | 98,8 | 73,2 | 64,3 | 82,1 | 99,1 | 97,9 | 100,0 | 124 |
| Revenu dans la moyenne | 86,3 | 78,7 | 93,9 | 88,1 | 80,3 | 95,9 | 67,8 | 58,5 | 77,0 | 96,5 | 93,9 | 99,0 | 120 |
| Revenu inf. à la moyenne | 92,3 | 89,6 | 94,9 | 92,8 | 90,6 | 95,0 | 69,4 | 64,6 | 74,2 | 94,9 | 92,8 | 97,0 | 380 |
| Né en Suisse | 92,3 | 89,9 | 94,7 | 94,2 | 92,3 | 96,0 | 70,4 | 66,2 | 74,5 | 95,8 | 94,1 | 97,5 | 526 |
| Né à l'étranger | 85,5 | 78,6 | 92,4 | 84,6 | 76,8 | 92,4 | 62,8 | 53,2 | 72,3 | 93,8 | 90,2 | 97,3 | 121 |
| Ville | 91,5 | 86,4 | 96,7 | 94,4 | 90,3 | 98,5 | 70,1 | 62,2 | 78,0 | 94,9 | 91,7 | 98,1 | 176 |
| Agglomération | 91,2 | 88,3 | 94,2 | 92,4 | 89,7 | 95,2 | 64,8 | 59,3 | 70,3 | 95,5 | 93,3 | 97,7 | 328 |
| Zone rurale | 89,8 | 84,7 | 95,0 | 90,8 | 86,0 | 95,5 | 75,7 | 68,7 | 82,6 | 95,9 | 93,3 | 98,6 | 143 |
| Medical Home | . | . | . | 96,5 | 94,1 | 98,8 | 80,7 | 75,6 | 85,8 | 98,5 | 96,9 | 100,0 | 419 |
| Sans Medical Home | . | . | . | 78,5 | 69,9 | 87,0 | 42,1 | 32,0 | 52,2 | 86,9 | 80,7 | 93,0 | 121 |
| Malade | 91,8 | 87,6 | 96,1 | 92,8 | 88,7 | 96,9 | 71,3 | 64,4 | 78,2 | 95,8 | 93,2 | 98,3 | 211 |
| Non-malade | 90,6 | 87,7 | 93,4 | 92,4 | 89,9 | 94,8 | 68,5 | 64,0 | 73,0 | 95,3 | 93,4 | 97,2 | 435 |
| Malade avec Medical Home | . | . | . | 94,4 | 88,9 | 99,9 | 85,9 | 78,9 | 92,8 | 96,7 | 92,4 | 100,0 | 147 |
| Malade sans Medical Home | . | . | . | 83,5 | 72,9 | 94,1 | 25,1 | 11,8 | 38,5 | 87,5 | 78,0 | 97,1 | 39 |
| Suisse alémanique | 91,3 | 88,4 | 94,3 | 92,9 | 90,3 | 95,6 | 67,6 | 62,8 | 72,5 | 96,1 | 94,2 | 98,0 | 352 |
| Suisse romande | 88,5 | 83,9 | 93,1 | 92,0 | 88,4 | 95,5 | 72,1 | 65,9 | 78,3 | 93,6 | 90,7 | 96,5 | 199 |
| Suisse italienne | 96,9 | 93,9 | 99,9 | 88,8 | 83,5 | 94,2 | 75,3 | 67,7 | 82,8 | 95,1 | 91,9 | 98,2 | 96 |
| VD | 90,1 | 85,4 | 94,9 | 94,7 | 91,1 | 98,3 | 72,8 | 65,1 | 80,6 | 94,6 | 91,1 | 98,1 | 107 |
| CH sans VD | 91,0 | 88,5 | 93,6 | 92,3 | 90,0 | 94,6 | 68,7 | 64,6 | 72,8 | 95,5 | 93,9 | 97,1 | 540 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1000 : Sans compter les éventuelles hospitalisations, combien de différents médecins avez-vous vu durant les douze derniers mois ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.57 Nombre de médecins différents consultés au cours des douze derniers mois, comparaison internationale (2017, en %)

| | Aucun | | | 1 médecin | | | 2 ou 3 médecins | | | 4 médecins ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| NL | 19,3 | 16,2 | 22,4 | 31,7 | 28,1 | 35,3 | 35,6 | 31,9 | 39,3 | 12,8 | 10,3 | 15,4 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 750 |
| SE | 19,1 | 18,0 | 20,3 | 32,5 | 31,1 | 33,9 | 32,3 | 30,9 | 33,7 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 7000 |
| UK | 11,8 | 9,2 | 14,4 | 27,0 | 23,5 | 30,6 | 41,4 | 37,5 | 45,3 | 18,1 | 14,9 | 21,2 | 1,7 | 0,6 | 2,7 | 753 |
| FR | 10,9 | 8,5 | 13,4 | 31,2 | 27,7 | 34,8 | 45,9 | 42,0 | 49,7 | 9,0 | 6,8 | 11,3 | 2,9 | 1,6 | 4,2 | 750 |
| CA | 8,6 | 7,6 | 9,7 | 34,1 | 32,3 | 35,9 | 41,8 | 39,8 | 43,8 | 14,7 | 13,3 | 16,1 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 4549 |
| NO | 8,6 | 6,0 | 11,2 | 50,9 | 46,7 | 55,2 | 32,6 | 28,6 | 36,6 | 7,1 | 5,0 | 9,2 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 750 |
| US | 7,8 | 5,7 | 9,8 | 22,8 | 19,9 | 25,8 | 43,7 | 40,4 | 47,1 | 24,4 | 21,5 | 27,3 | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 1392 |
| CH | 7,0 | 5,8 | 8,3 | 32,6 | 30,2 | 34,9 | 45,6 | 43,1 | 48,0 | 14,7 | 13,0 | 16,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| DE | 6,3 | 4,4 | 8,1 | 18,9 | 15,8 | 21,9 | 47,2 | 43,2 | 51,1 | 26,3 | 22,8 | 29,8 | 1,4 | 0,4 | 2,3 | 751 |
| AU | 5,1 | 3,3 | 6,9 | 25,4 | 22,4 | 28,4 | 57,8 | 54,2 | 61,5 | 11,1 | 9,1 | 13,1 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 2500 |
| NZ | 4,1 | 2,1 | 6,1 | 37,1 | 32,2 | 42,1 | 45,3 | 40,2 | 50,4 | 13,2 | 9,6 | 16,8 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 500 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.58 Nombre de médecins différents consultés au cours des douze mois, comparaison internationale (2014, en %)

| | Aucun | | | 1 médecin | | | 2 ou 3 médecins | | | 4 médecins ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| SE | 18,7 | 17,2 | 20,1 | 26,3 | 24,6 | 28,0 | 36,3 | 34,5 | 38,2 | 17,3 | 15,9 | 18,8 | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 5000 |
| NL | 17,6 | 13,7 | 21,5 | 27,0 | 22,6 | 31,5 | 36,3 | 31,4 | 41,3 | 16,1 | 12,2 | 20,0 | 2,9 | 0,7 | 5,1 | 582 |
| UK | 14,3 | 10,8 | 17,7 | 28,1 | 23,7 | 32,5 | 39,9 | 35,2 | 44,7 | 14,1 | 10,8 | 17,4 | 3,6 | 2,1 | 5,2 | 581 |
| NZ | 10,4 | 6,0 | 14,7 | 31,5 | 24,9 | 38,1 | 40,2 | 33,4 | 47,0 | 13,1 | 8,7 | 17,4 | 4,9 | 1,5 | 8,2 | 379 |
| FR | 9,7 | 7,5 | 12,0 | 40,7 | 36,7 | 44,8 | 42,6 | 38,6 | 46,7 | 6,1 | 4,5 | 7,8 | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 860 |
| CA | 9,6 | 8,2 | 11,0 | 32,3 | 30,1 | 34,5 | 44,6 | 42,2 | 47,0 | 12,9 | 11,3 | 14,4 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 3147 |
| CH | 7,4 | 5,6 | 9,2 | 35,6 | 32,0 | 39,3 | 48,7 | 45,0 | 52,4 | 8,1 | 6,0 | 10,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1084 |
| AU | 6,6 | 3,9 | 9,4 | 28,5 | 23,3 | 33,6 | 45,6 | 40,0 | 51,2 | 18,1 | 13,8 | 22,4 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 1670 |
| US | 6,3 | 4,3 | 8,3 | 20,5 | 17,5 | 23,6 | 47,1 | 43,4 | 50,8 | 25,2 | 22,0 | 28,4 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 1116 |
| NO | 5,7 | 3,5 | 7,8 | 41,7 | 36,9 | 46,4 | 41,8 | 37,2 | 46,5 | 10,5 | 7,7 | 13,3 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 651 |
| DE | 5,4 | 3,1 | 7,7 | 16,1 | 12,1 | 20,2 | 39,5 | 34,3 | 44,6 | 38,4 | 33,3 | 43,6 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 547 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.59 Nombre de médecins différents consultés au cours des douze derniers mois, Suisse (2017, en %)

| | Aucun | | | 1 médecin | | | 2 ou 3 médecins | | | 4 médecins ou plus | | | NSP/NR | | | Échan- tillon n |
|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 7,0 | 5,8 | 8,3 | 32,6 | 30,2 | 34,9 | 45,6 | 43,1 | 48,0 | 14,7 | 13,0 | 16,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| Homme | 7,3 | 5,4 | 9,3 | 35,1 | 31,6 | 38,6 | 43,3 | 39,8 | 46,9 | 14,1 | 11,8 | 16,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1526 |
| Femme | 6,8 | 5,1 | 8,4 | 30,5 | 27,3 | 33,7 | 47,4 | 44,0 | 50,8 | 15,1 | 12,9 | 17,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1712 |
| 65-69 ans | 7,9 | 5,4 | 10,3 | 31,4 | 26,9 | 36,0 | 44,8 | 40,0 | 49,5 | 16,0 | 12,6 | 19,3 | . | . | . | 828 |
| 70-74 ans | 7,6 | 5,1 | 10,1 | 27,4 | 23,1 | 31,6 | 48,6 | 44,0 | 53,2 | 16,3 | 13,1 | 19,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 954 |
| 75-79 ans | 6,0 | 3,6 | 8,5 | 33,9 | 28,7 | 39,0 | 44,1 | 38,8 | 49,4 | 15,8 | 12,1 | 19,5 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 697 |
| 80+ ans | 6,3 | 3,7 | 8,9 | 38,1 | 33,1 | 43,0 | 44,7 | 39,7 | 49,7 | 10,5 | 7,9 | 13,2 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 8,3 | 5,5 | 11,1 | 35,3 | 30,2 | 40,3 | 41,5 | 36,5 | 46,6 | 14,7 | 11,2 | 18,1 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 706 |
| Secondaire II | 6,4 | 4,8 | 7,9 | 32,7 | 29,7 | 35,7 | 46,8 | 43,6 | 50,0 | 14,0 | 12,0 | 16,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1765 |
| Tertiaire | 8,3 | 4,9 | 11,6 | 24,7 | 19,8 | 29,6 | 48,4 | 42,9 | 53,9 | 18,5 | 14,6 | 22,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 6,9 | 5,5 | 8,4 | 30,6 | 27,9 | 33,3 | 47,3 | 44,4 | 50,1 | 15,0 | 13,1 | 16,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 7,3 | 4,7 | 9,8 | 38,1 | 33,3 | 42,9 | 40,8 | 36,1 | 45,5 | 13,6 | 10,4 | 16,8 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 807 |
| Né en Suisse | 6,5 | 5,1 | 7,9 | 34,0 | 31,2 | 36,7 | 46,2 | 43,4 | 49,1 | 13,2 | 11,4 | 15,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2217 |
| Né à l'étranger | 8,9 | 6,1 | 11,7 | 27,1 | 22,6 | 31,6 | 43,4 | 38,6 | 48,3 | 20,4 | 16,5 | 24,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1015 |
| Medical Home | . | . | . | . | . | . | 45,7 | 41,7 | 49,6 | 54,3 | 50,4 | 58,3 | . | . | . | 1249 |
| Sans Medical Home | 11,5 | 7,8 | 15,1 | 20,6 | 15,9 | 25,4 | 30,6 | 25,4 | 35,8 | 37,2 | 32 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 726 |
| Malade | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 26,6 | 22,4 | 30,9 | 32,3 | 28 | 36,7 | 39,9 | 35,5 | 44,3 | . | . | . | 948 |
| Non-malade | 9,6 | 7,8 | 11,4 | 35,7 | 32,8 | 38,6 | 28 | 25,4 | 30,7 | 26,6 | 24,1 | 29,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | . | . | . | . | . | . | 42,6 | 36,1 | 49,1 | 57,4 | 50,9 | 63,9 | . | . | . | 463 |
| Malade sans Medical Home | 1,9 | 0 | 4,3 | 12,5 | 4,6 | 20,4 | 35 | 24,2 | 45,8 | 50,7 | 39,9 | 61,5 | . | . | . | 210 |
| Ville | 8,1 | 5,5 | 10,6 | 30,9 | 26,6 | 35,2 | 46,6 | 42,1 | 51,2 | 14,2 | 11,3 | 17,1 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1026 |
| Agglomération | 6,1 | 4,4 | 7,8 | 31,6 | 28,2 | 35,0 | 46,0 | 42,4 | 49,5 | 16,2 | 13,7 | 18,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1643 |
| Zone rurale | 7,5 | 4,6 | 10,5 | 36,8 | 31,2 | 42,4 | 42,8 | 37,2 | 48,5 | 12,6 | 9,1 | 16,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 454 |
| Suisse alémanique | 7,2 | 5,5 | 8,9 | 36,2 | 33,0 | 39,4 | 44,8 | 41,5 | 48,0 | 11,7 | 9,7 | 13,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1040 |
| Suisse romande | 5,2 | 3,8 | 6,6 | 23,1 | 20,2 | 25,9 | 48,4 | 45,0 | 51,7 | 23,1 | 20,3 | 25,9 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1869 |
| Suisse italienne | 12,8 | 9,1 | 16,4 | 27,5 | 22,4 | 32,5 | 44,2 | 38,6 | 49,7 | 15,4 | 11,4 | 19,5 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 329 |
| ZH | 5,7 | 3,1 | 8,4 | 29,2 | 24,2 | 34,3 | 49,1 | 43,5 | 54,7 | 15,5 | 11,4 | 19,5 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 332 |
| CH sans ZH | 7,3 | 5,9 | 8,7 | 33,3 | 30,6 | 35,9 | 44,9 | 42,2 | 47,6 | 14,5 | 12,7 | 16,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2906 |
| VD | 3,9 | 1,7 | 6,0 | 20,3 | 15,9 | 24,8 | 50,6 | 44,9 | 56,2 | 24,8 | 19,8 | 29,8 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 324 |
| CH sans VD | 7,3 | 5,9 | 8,7 | 33,7 | 31,2 | 36,3 | 45,1 | 42,5 | 47,8 | 13,7 | 12,0 | 15,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2914 |
| VS | 8,4 | 4,9 | 11,8 | 30,4 | 25,1 | 35,6 | 47,8 | 41,9 | 53,6 | 13,5 | 9,2 | 17,7 | . | . | . | 321 |
| CH sans VS | 7,0 | 5,6 | 8,3 | 32,7 | 30,2 | 35,1 | 45,5 | 42,9 | 48,0 | 14,7 | 13,0 | 16,4 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2917 |
| GE | 5,9 | 4,5 | 7,3 | 19,6 | 17,2 | 22,1 | 46,6 | 43,5 | 49,7 | 27,4 | 24,7 | 30,2 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1160 |
| CH sans GE | 7,1 | 5,7 | 8,4 | 33,3 | 30,8 | 35,8 | 45,5 | 42,9 | 48,1 | 13,9 | 12,2 | 15,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.60 Nombre de médecins différents consultés au cours des douze derniers mois, Suisse (2014, en %)

| | Aucun | | | 1 médecin | | | 2 ou 3 médecins | | | 4 médecins ou plus | | | NSP/NR | | | Échan- tillon n |
|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 7,4 | 5,6 | 9,2 | 35,6 | 32,0 | 39,3 | 48,7 | 45,0 | 52,4 | 8,1 | 6,0 | 10,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1084 |
| Homme | 7,8 | 5,0 | 10,6 | 35,7 | 30,2 | 41,3 | 47,4 | 41,7 | 53,1 | 8,8 | 5,3 | 12,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 493 |
| Femme | 7,0 | 4,7 | 9,4 | 35,5 | 30,8 | 40,3 | 49,7 | 44,8 | 54,6 | 7,6 | 5,1 | 10,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 591 |
| 65-69 ans | 11,2 | 7,4 | 15,0 | 30,6 | 24,3 | 36,9 | 48,8 | 42,1 | 55,5 | 9,4 | 5,1 | 13,6 | . | . | . | 349 |
| 70-74 ans | 6,8 | 3,3 | 10,3 | 33,4 | 26,4 | 40,4 | 49,9 | 42,9 | 57,0 | 9,8 | 5,8 | 13,9 | . | . | . | 300 |
| 75-79 ans | 6,5 | 2,4 | 10,6 | 31,1 | 23,9 | 38,4 | 53,4 | 45,2 | 61,5 | 8,5 | 3,4 | 13,6 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 209 |
| 80+ ans | 4,1 | 1,4 | 6,8 | 47,9 | 39,9 | 56,0 | 43,1 | 35,1 | 51,0 | 4,5 | 1,7 | 7,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 6,9 | 3,0 | 10,7 | 43,1 | 34,6 | 51,6 | 43,9 | 35,5 | 52,3 | 6,0 | 1,3 | 10,7 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 216 |
| Secondaire II | 7,4 | 5,1 | 9,7 | 34,2 | 29,7 | 38,7 | 50,2 | 45,5 | 54,9 | 8,2 | 5,6 | 10,8 | . | . | . | 628 |
| Tertiaire | 8,3 | 4,2 | 12,4 | 26,6 | 19,4 | 33,9 | 51,4 | 43,1 | 59,7 | 12,6 | 7,7 | 17,6 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 8,2 | 3,5 | 12,9 | 29,9 | 21,6 | 38,2 | 56,0 | 47,2 | 64,8 | 5,9 | 2,7 | 9,0 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 8,0 | 3,9 | 12,2 | 32,3 | 24,0 | 40,6 | 46,9 | 38,3 | 55,4 | 12,2 | 6,0 | 18,4 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 6,7 | 4,4 | 9,0 | 36,5 | 31,8 | 41,2 | 49,1 | 44,3 | 53,9 | 7,7 | 5,1 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 645 |
| Né en Suisse | 7,0 | 5,0 | 8,9 | 37,1 | 33,1 | 41,1 | 49,4 | 45,3 | 53,5 | 6,3 | 4,6 | 8,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 863 |
| Né à l'étranger | 9,3 | 4,5 | 14,0 | 28,6 | 19,9 | 37,3 | 45,9 | 37,0 | 54,7 | 16,3 | 8,3 | 24,2 | . | . | . | 220 |
| Ville | 6,4 | 3,2 | 9,6 | 31,4 | 24,4 | 38,5 | 51,8 | 44,3 | 59,2 | 10,1 | 4,8 | 15,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 293 |
| Agglomération | 6,8 | 4,3 | 9,3 | 38,7 | 33,5 | 43,9 | 46,1 | 40,9 | 51,3 | 8,1 | 5,4 | 10,8 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 540 |
| Zone rurale | 9,5 | 5,4 | 13,6 | 34,1 | 26,7 | 41,5 | 50,4 | 42,9 | 58,0 | 6,0 | 2,9 | 9,0 | . | . | . | 251 |
| Medical Home | . | . | . | 50,9 | 44,7 | 57,1 | 35,6 | 29,6 | 41,5 | 13,5 | 9,5 | 17,6 | . | . | . | 392 |
| Sans Medical Home | 8,4 | 3,7 | 13,1 | 52,1 | 42,8 | 61,5 | 22,6 | 15,2 | 29,9 | 16,9 | 8,7 | 25,1 | . | . | . | 180 |
| Malade | 2,7 | 0,6 | 4,7 | 63,8 | 57,2 | 70,4 | 20,8 | 15,3 | 26,4 | 12,5 | 8,4 | 16,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 305 |
| Non-malade | 9,2 | 6,8 | 11,5 | 67,2 | 63,1 | 71,3 | 17 | 13,9 | 20,2 | 6,3 | 3,9 | 8,7 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 776 |
| Malade avec Medical Home | . | . | . | 45,7 | 35,1 | 56,3 | 33,7 | 24,2 | 43,1 | 20,6 | 12,3 | 28,9 | . | . | . | 146 |
| Malade sans Medical Home | . | . | . | 47,7 | 30,2 | 65,3 | 29,9 | 12,4 | 47,4 | 22,4 | 10,3 | 34,5 | . | . | . | 52 |
| Suisse alémanique | 6,3 | 4,2 | 8,5 | 69,8 | 65,5 | 74,2 | 16,7 | 13,3 | 20,2 | 6,9 | 4,2 | 9,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 551 |
| Suisse romande | 9,3 | 5,7 | 12,9 | 58,7 | 52,7 | 64,7 | 21,2 | 16 | 26,4 | 10,6 | 7,4 | 13,8 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 355 |
| Suisse italienne | 12,7 | 6,8 | 18,5 | 52,4 | 44,2 | 60,7 | 21,1 | 14,4 | 27,9 | 13,2 | 8,2 | 18,2 | 0,6 | 0,0 | 1,8 | 178 |
| VD | 7,6 | 2,8 | 12,3 | 28,6 | 21,1 | 36,2 | 51,7 | 43,4 | 59,9 | 11,4 | 6,7 | 16,1 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 178 |
| CH sans VD | 7,4 | 5,4 | 9,3 | 36,3 | 32,4 | 40,2 | 48,4 | 44,4 | 52,4 | 7,8 | 5,6 | 10,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1003 : À quelle fréquence votre médecin habituel ou un membre du cabinet vous aide-t-il à coordonner ou à organiser des soins que vous recevez par d'autres médecins ou à d'autres endroits ?

Base : Répondants ayant un médecin ou un lieu de traitement habituel et ayant vu au moins deux médecins durant les douze derniers mois, non concernés exclus.

Tableau 6.61 Coordination du médecin habituel avec d'autres médecins ou d'autres endroits, comparaison internationale (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| NZ | 91,0 | 86,9 | 95,0 | 8,4 | 4,4 | 12,3 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 276 |
| AU | 88,0 | 84,6 | 91,4 | 11,1 | 7,8 | 14,4 | 0,9 | 0,0 | 1,7 | 1547 |
| CH | 85,3 | 83,0 | 87,5 | 14,2 | 12,0 | 16,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1812 |
| CA | 80,7 | 78,1 | 83,2 | 17,7 | 15,2 | 20,2 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | 2394 |
| DE | 80,6 | 76,8 | 84,4 | 18,6 | 14,8 | 22,3 | 0,9 | 0,2 | 1,5 | 493 |
| US | 76,1 | 72,5 | 79,7 | 22,2 | 18,7 | 25,7 | 1,7 | 0,6 | 2,8 | 962 |
| NO | 74,5 | 68,3 | 80,6 | 25,0 | 18,9 | 31,2 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 289 |
| FR | 72,7 | 67,8 | 77,6 | 26,7 | 21,8 | 31,6 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 383 |
| NL | 66,3 | 60,3 | 72,2 | 29,7 | 24,0 | 35,4 | 4,0 | 1,7 | 6,4 | 279 |
| UK | 61,6 | 56,2 | 67,0 | 31,9 | 26,8 | 37,1 | 6,5 | 3,6 | 9,3 | 397 |
| SE | 50,8 | 48,2 | 53,3 | 42,8 | 40,3 | 45,4 | 6,4 | 5,1 | 7,7 | 2257 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.62 Coordination du médecin habituel avec d'autres médecins ou d'autres endroits, comparaison internationale (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| AU | 82,2 | 78,2 | 86,3 | 15,5 | 11,6 | 19,4 | 2,2 | 0,8 | 3,6 | 1446 |
| UK | 81,5 | 77,8 | 85,3 | 17,3 | 13,6 | 20,9 | 1,2 | 0,1 | 2,3 | 541 |
| US | 79,5 | 76,3 | 82,8 | 18,8 | 15,6 | 22,0 | 1,6 | 0,9 | 2,4 | 1003 |
| CH | 78,7 | 75,2 | 82,1 | 17,2 | 14,0 | 20,3 | 4,2 | 2,5 | 5,9 | 833 |
| CA | 77,6 | 75,6 | 79,7 | 20,0 | 18,0 | 21,9 | 2,4 | 1,7 | 3,1 | 2800 |
| NZ | 75,5 | 68,9 | 82,0 | 21,2 | 14,9 | 27,6 | 3,3 | 1,3 | 5,3 | 308 |
| FR | 63,9 | 59,6 | 68,3 | 36,0 | 31,6 | 40,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 690 |
| DE | 57,6 | 51,7 | 63,5 | 36,3 | 30,6 | 42,1 | 6,1 | 3,2 | 9,0 | 429 |
| NL | 56,0 | 49,4 | 62,5 | 38,8 | 32,5 | 45,2 | 5,2 | 2,0 | 8,5 | 357 |
| NO | 54,2 | 48,3 | 60,1 | 36,3 | 30,6 | 41,9 | 9,5 | 5,8 | 13,2 | 426 |
| SE | 46,5 | 44,1 | 49,0 | 40,5 | 38,1 | 42,9 | 13,0 | 11,3 | 14,6 | 3107 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.63 Coordination du médecin habituel avec d'autres médecins ou d'autres endroits, Suisse (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NC/NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 85,3 | 83,0 | 87,5 | 14,2 | 12,0 | 16,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1812 |
| Homme | 85,8 | 82,4 | 89,1 | 14,1 | 10,8 | 17,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 870 |
| Femme | 84,8 | 81,7 | 88,0 | 14,3 | 11,2 | 17,3 | 0,9 | 0,0 | 1,7 | 942 |
| 65–69 ans | 84,0 | 79,4 | 88,5 | 16,0 | 11,4 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 471 |
| 70–74 ans | 85,5 | 81,2 | 89,7 | 13,3 | 9,3 | 17,3 | 1,2 | 0,0 | 2,8 | 555 |
| 75–79 ans | 84,4 | 79,0 | 89,8 | 14,9 | 9,6 | 20,3 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 382 |
| 80+ ans | 87,6 | 83,5 | 91,6 | 12,3 | 8,3 | 16,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 404 |
| Scolarité obligatoire | 79,0 | 73,4 | 84,6 | 20,4 | 14,8 | 25,9 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 383 |
| Secondaire II | 86,8 | 84,0 | 89,6 | 12,6 | 9,9 | 15,4 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 983 |
| Tertiaire | 88,9 | 84,6 | 93,1 | 11,0 | 6,8 | 15,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 434 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 86,1 | 83,5 | 88,6 | 13,5 | 11,0 | 16,1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1399 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 82,5 | 77,4 | 87,6 | 16,5 | 11,6 | 21,5 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 413 |
| Né en Suisse | 86,1 | 83,5 | 88,6 | 13,3 | 10,8 | 15,8 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 1198 |
| Né à l'étranger | 82,5 | 77,6 | 87,4 | 17,3 | 12,4 | 22,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 612 |
| Malade | 86,4 | 82,7 | 90,0 | 13,5 | 9,8 | 17,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 660 |
| Non-malade | 85,3 | 82,3 | 88,2 | 14,0 | 11,1 | 16,9 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 1079 |
| Ville | 83,2 | 78,7 | 87,7 | 16,7 | 12,2 | 21,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 565 |
| Agglomération | 84,7 | 81,3 | 88,1 | 14,7 | 11,3 | 18,0 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 968 |
| Zone rurale | 88,5 | 83,7 | 93,2 | 10,6 | 6,1 | 15,1 | 0,9 | 0,0 | 2,5 | 229 |
| Suisse alémanique | 88,5 | 85,4 | 91,5 | 11,0 | 8,0 | 14,0 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 489 |
| Suisse romande | 78,6 | 74,9 | 82,2 | 21,0 | 17,4 | 24,7 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1153 |
| Suisse italienne | 83,4 | 77,7 | 89,1 | 15,5 | 9,9 | 21,0 | 1,1 | 0,0 | 2,7 | 170 |
| ZH | 86,0 | 80,5 | 91,5 | 14,0 | 8,5 | 19,5 | . | . | . | 171 |
| CH sans ZH | 85,1 | 82,6 | 87,6 | 14,3 | 11,8 | 16,7 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 1641 |
| VD | 80,3 | 74,4 | 86,1 | 19,7 | 13,9 | 25,6 | . | . | . | 200 |
| CH sans VD | 85,9 | 83,4 | 88,3 | 13,6 | 11,1 | 16,0 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 1612 |
| VS | 84,7 | 78,9 | 90,6 | 14,8 | 9,0 | 20,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 165 |
| CH sans VS | 85,3 | 82,9 | 87,7 | 14,2 | 11,9 | 16,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1647 |
| GE | 77,8 | 74,6 | 80,9 | 21,7 | 18,6 | 24,9 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 737 |
| CH sans GE | 85,8 | 83,4 | 88,3 | 13,7 | 11,2 | 16,1 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1075 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.64 Coordination du médecin habituel avec d'autres médecins ou d'autres endroits, Suisse (2014, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois/rarement ou jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 78,2 | 73,8 | 82,6 | 18,0 | 13,9 | 22,0 | 3,8 | 1,7 | 5,9 | 557 |
| Homme | 80,9 | 75,0 | 86,8 | 16,3 | 10,7 | 21,9 | 2,8 | 0,4 | 5,1 | 257 |
| Femme | 76,2 | 69,9 | 82,5 | 19,2 | 13,4 | 25,0 | 4,6 | 1,4 | 7,8 | 300 |
| 65–69 ans | 83,0 | 76,8 | 89,2 | 14,8 | 9,0 | 20,6 | 2,2 | 0,0 | 4,7 | 186 |
| 70–74 ans | 81,0 | 74,3 | 87,7 | 15,4 | 9,3 | 21,6 | 3,5 | 0,3 | 6,7 | 174 |
| 75–79 ans | 69,3 | 57,6 | 81,0 | 24,6 | 13,5 | 35,8 | 6,0 | 0,1 | 12,0 | 104 |
| 80+ ans | 78,1 | 67,8 | 88,5 | 18,0 | 8,6 | 27,4 | 3,9 | 0,0 | 9,1 | 93 |
| Scolarité obligatoire | 67,0 | 54,4 | 79,5 | 23,9 | 12,4 | 35,4 | 9,1 | 1,3 | 16,9 | 96 |
| Secondaire II | 80,3 | 75,1 | 85,6 | 16,5 | 11,6 | 21,5 | 3,2 | 0,9 | 5,4 | 331 |
| Tertiaire | 83,2 | 75,6 | 90,8 | 16,8 | 9,2 | 24,4 | . | . | . | 123 |
| Revenu sup. à la moyenne | 77,1 | 67,0 | 87,3 | 21,6 | 11,7 | 31,6 | 1,2 | 0,0 | 3,7 | 99 |
| Revenu dans la moyenne | 75,1 | 62,9 | 87,3 | 24,1 | 12,0 | 36,3 | 0,8 | 0,0 | 2,3 | 106 |
| Revenu inf. à la moyenne | 79,2 | 73,9 | 84,6 | 15,3 | 10,7 | 19,9 | 5,4 | 2,2 | 8,6 | 334 |
| Né en Suisse | 80,2 | 75,6 | 84,8 | 16,3 | 12,1 | 20,6 | 3,5 | 1,3 | 5,7 | 432 |
| Né à l'étranger | 70,0 | 58,1 | 81,9 | 24,8 | 13,4 | 36,2 | 5,2 | 0,0 | 11,2 | 125 |
| Ville | 80,7 | 71,4 | 90,1 | 18,2 | 8,9 | 27,6 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 150 |
| Agglomération | 77,0 | 70,8 | 83,3 | 18,0 | 12,5 | 23,4 | 5,0 | 1,2 | 8,8 | 281 |
| Zone rurale | 77,9 | 69,6 | 86,3 | 17,7 | 10,0 | 25,3 | 4,4 | 0,4 | 8,4 | 126 |
| Malade | 81,3 | 74,3 | 88,4 | 16,0 | 9,5 | 22,6 | 2,7 | 0,0 | 5,7 | 200 |
| Malade sans Medical Home | 77,0 | 71,5 | 82,6 | 18,6 | 13,5 | 23,7 | 4,4 | 1,6 | 7,1 | 356 |
| Suisse alémanique | 82,6 | 77,1 | 88,2 | 13,0 | 8,0 | 18,0 | 4,4 | 1,4 | 7,4 | 256 |
| Suisse romande | 64,4 | 56,0 | 72,8 | 32,6 | 24,3 | 40,9 | 3,0 | 0,5 | 5,5 | 192 |
| Suisse italienne | 86,5 | 80,1 | 92,8 | 12,8 | 6,6 | 19,0 | 0,7 | 0,0 | 2,2 | 109 |
| VD | 60,8 | 50,1 | 71,6 | 37,1 | 26,3 | 47,8 | 2,1 | 0,0 | 5,1 | 102 |
| CH sans VD | 80,1 | 75,4 | 84,9 | 15,9 | 11,5 | 20,2 | 4,0 | 1,7 | 6,3 | 455 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1005 : Au cours des douze derniers mois, avez-vous eu besoin d'aide pour organiser ou coordonner les soins ou traitements reçus par différents professionnels de la santé ?

Base : Répondants dont le médecin ou le lieu de traitement habituel aide rarement ou jamais à coordonner ou à organiser des soins reçus par d'autres médecins ou à d'autres endroits.

Tableau 6.65 Besoin d'aide à la coordination des soins, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| AU | 38,0 | 22,2 | 53,8 | 60,6 | 44,9 | 76,4 | 1,4 | 0,0 | 3,2 | 161 |
| DE | 34,4 | 23,5 | 45,3 | 64,0 | 53,1 | 75,0 | 1,5 | 0,0 | 3,7 | 95 |
| SE | 34,3 | 30,5 | 38,0 | 61,2 | 57,4 | 65,1 | 4,5 | 2,9 | 6,0 | 986 |
| US | 31,1 | 22,4 | 39,8 | 67,3 | 58,5 | 76,0 | 1,6 | 0,0 | 3,9 | 179 |
| CA | 30,3 | 23,6 | 37,0 | 66,8 | 59,9 | 73,7 | 2,9 | 1,3 | 4,6 | 403 |
| UK | 28,2 | 19,6 | 36,8 | 67,0 | 58,0 | 76,0 | 4,8 | 0,9 | 8,7 | 124 |
| NL | 24,9 | 15,4 | 34,4 | 75,1 | 65,6 | 84,6 | . | . | . | 86 |
| NO | 20,8 | 8,9 | 32,8 | 76,1 | 63,8 | 88,5 | 3,0 | 0,0 | 7,4 | 73 |
| NZ | 20,2 | 2,9 | 37,4 | 79,8 | 62,6 | 97,1 | . | . | . | 19 |
| CH | 16,4 | 10,8 | 22,0 | 83,2 | 77,6 | 88,8 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 320 |
| FR | 12,3 | 4,8 | 19,9 | 85,6 | 77,6 | 93,6 | 2,1 | 0,0 | 5,3 | 96 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.66 Besoin d'aide à la coordination des soins, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 16,4 | 10,8 | 22,0 | 83,2 | 77,6 | 88,8 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 320 |
| Homme | 20,8 | 11,4 | 30,2 | 79,1 | 69,7 | 88,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 138 |
| Femme | 12,8 | 6,1 | 19,5 | 86,5 | 79,8 | 93,3 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | 182 |
| 65–69 ans | 18,0 | 6,5 | 29,4 | 82,0 | 70,6 | 93,5 | . | . | . | 81 |
| 70–74 ans | 11,9 | 2,2 | 21,6 | 86,7 | 76,8 | 96,7 | 1,3 | 0,0 | 4,0 | 90 |
| 75–79 ans | 15,6 | 4,9 | 26,2 | 84,4 | 73,8 | 95,1 | . | . | . | 71 |
| 80+ ans | 20,6 | 8,4 | 32,8 | 79,1 | 66,8 | 91,3 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 78 |
| Scolarité obligatoire | 18,7 | 8,1 | 29,2 | 80,2 | 69,6 | 90,9 | 1,1 | 0,0 | 3,2 | 81 |
| Secondaire II | 14,9 | 7,4 | 22,4 | 85,0 | 77,5 | 92,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 163 |
| Tertiaire | 14,4 | 3,0 | 25,8 | 85,6 | 74,2 | 97,0 | . | . | . | 73 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 12,2 | 7,1 | 17,4 | 87,2 | 82,0 | 92,4 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 237 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 27,9 | 13,4 | 42,4 | 72,1 | 57,6 | 86,6 | . | . | . | 83 |
| Né en Suisse | 12,5 | 6,7 | 18,3 | 86,9 | 81,1 | 92,8 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 190 |
| Né à l'étranger | 26,2 | 13,2 | 39,1 | 73,8 | 60,9 | 86,8 | . | . | . | 130 |
| Malade | 15,1 | 6,6 | 23,6 | 83,7 | 75,0 | 92,3 | 1,2 | 0,0 | 3,3 | 118 |
| Non-malade | 12,7 | 6,1 | 19,3 | 87,3 | 80,7 | 93,9 | . | . | . | 185 |
| Ville | 17,3 | 6,9 | 27,6 | 82,7 | 72,4 | 93,1 | . | . | . | 117 |
| Agglomération | 15,4 | 7,7 | 23,0 | 84,5 | 76,8 | 92,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 168 |
| Zone rurale | 15,5 | 3,0 | 28,1 | 84,5 | 71,9 | 97,0 | . | . | . | 28 |
| Suisse alémanique | 9,8 | 1,5 | 18,0 | 90,2 | 82,0 | 98,5 | . | . | . | 54 |
| Suisse romande | 20,3 | 12,3 | 28,3 | 78,8 | 70,7 | 86,8 | 0,9 | 0,0 | 2,5 | 239 |
| Suisse italienne | 41,7 | 22,3 | 61,0 | 58,3 | 39,0 | 77,7 | . | . | . | 27 |
| ZH | 14,5 | 0,0 | 30,5 | 85,5 | 69,5 | 100,0 | . | . | . | 22 |
| CH sans ZH | 16,8 | 11,0 | 22,6 | 82,7 | 76,8 | 88,6 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 298 |
| VD | 26,2 | 11,2 | 41,2 | 71,5 | 56,2 | 86,8 | 2,3 | 0,0 | 6,8 | 37 |
| CH sans VD | 14,7 | 8,7 | 20,6 | 85,3 | 79,3 | 91,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 283 |
| VS | 11,4 | 0,0 | 23,0 | 88,6 | 77,0 | 100,0 | . | . | . | 24 |
| CH sans VS | 16,6 | 10,8 | 22,4 | 82,9 | 77,1 | 88,8 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 296 |
| GE | 21,2 | 14,3 | 28,1 | 78,2 | 71,3 | 85,2 | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 163 |
| CH sans GE | 15,8 | 9,6 | 22,0 | 83,8 | 77,6 | 90,0 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 157 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1015 : Au cours des deux dernières années, en recevant des soins pour un problème de santé, vous est-il déjà arrivé ?

- Que des résultats d'un test ou votre dossier médical ne soient pas disponibles au moment du rendez-vous pour les soins. (A1)
- De recevoir des informations contradictoires de différents médecins ou professionnels de la santé. (A2)
- Que des médecins prescrivent un test médical que vous jugiez inutile parce que le test avait déjà été effectué. (A3)

Base : Tous les répondants, non concernés exclus.

Tableau 6.67 Problèmes de coordination, comparaison internationale (2017, en %)

| Résultats d'un test ou dossier médical ne sont pas disponibles au moment du rendez-vous | | | | Informations contradictoires reçues de différents médecins ou professionnels de la santé | | | | Test médical prescrit par un médecin jugé inutile parce que le test a déjà été effectué | | | | Échantillon |
|---|------------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 15,1 | 12,5 | 17,8 | DE | 16,6 | 13,5 | 19,6 | CH | 12,5 | 10,8 | 14,2 | 2975 |
| DE | 13,8 | 11,0 | 16,6 | US | 14,3 | 11,9 | 16,7 | US | 12,3 | 9,9 | 14,7 | 1384 |
| UK | 13,4 | 10,6 | 16,1 | SE | 12,6 | 11,6 | 13,6 | DE | 11,6 | 9,0 | 14,2 | 726 |
| CA | 11,4 | 10,1 | 12,7 | UK | 12,5 | 9,9 | 15,0 | AU | 11,0 | 8,7 | 13,3 | 2390 |
| CH | 9,6 | 8,1 | 11,0 | CH | 12,0 | 10,3 | 13,7 | CA | 6,7 | 5,4 | 7,9 | 4512 |
| NZ | 9,0 | 5,9 | 12,0 | CA | 11,4 | 10,1 | 12,6 | NO | 5,2 | 3,2 | 7,1 | 739 |
| AU | 8,2 | 6,2 | 10,2 | NZ | 10,5 | 7,2 | 13,8 | NZ | 4,9 | 2,6 | 7,1 | 496 |
| NO | 7,6 | 5,3 | 9,9 | AU | 9,7 | 7,5 | 11,9 | UK | 4,8 | 3,0 | 6,5 | 741 |
| SE | 7,1 | 6,3 | 7,9 | NO | 9,0 | 6,5 | 11,5 | NL | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 738 |
| NL | 5,7 | 3,9 | 7,5 | NL | 7,1 | 5,2 | 9,1 | FR | 3,5 | 2,1 | 4,9 | 746 |
| FR | 2,3 | 1,2 | 3,4 | FR | 2,4 | 1,2 | 3,5 | SE | 3,5 | 2,9 | 4,0 | 6530 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.68 Problèmes de coordination, comparaison internationale (2014, en %)

| Résultats d'un test ou dossier médical ne sont pas disponibles au moment du rendez-vous | | | | Informations contradictoires reçues de différents médecins ou professionnels de la santé | | | | Test médical prescrit par un médecin jugé inutile parce que le test a déjà été effectué | | | | Échantillon |
|---|------------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 14 | 11,3 | 16,7 | US | 15,9 | 13,2 | 18,6 | CH | 13,1 | 10,5 | 15,8 | 1032 |
| CA | 10,9 | 9,5 | 12,3 | DE | 13,8 | 10,2 | 17,5 | US | 12,9 | 10,3 | 15,6 | 1103 |
| SE | 7,5 | 6,4 | 8,5 | CA | 11,7 | 10,2 | 13,2 | DE | 9,8 | 6,8 | 12,7 | 542 |
| AU | 6,9 | 4,1 | 9,8 | SE | 11,5 | 10,3 | 12,7 | AU | 8,1 | 4,9 | 11,3 | 1615 |
| NZ | 6,9 | 3,4 | 10,5 | NO | 11,3 | 8,1 | 14,4 | UK | 7,6 | 4,8 | 10,4 | 566 |
| CH | 6,8 | 4,7 | 8,9 | UK | 10,2 | 6,9 | 13,5 | CA | 5,7 | 4,6 | 6,8 | 3122 |
| NL | 6,4 | 3,5 | 9,2 | AU | 10,0 | 7,0 | 12,9 | NO | 5,6 | 3,4 | 7,8 | 639 |
| UK | 6,3 | 3,8 | 8,7 | CH | 9,3 | 6,9 | 11,7 | NZ | 3,9 | 1,1 | 6,8 | 374 |
| DE | 5,9 | 3,2 | 8,5 | NZ | 8,7 | 4,5 | 12,9 | SE | 3,7 | 3,0 | 4,4 | 4792 |
| NO | 4,1 | 2,3 | 5,8 | NL | 6,5 | 4,0 | 9,0 | NL | 2,7 | 1,2 | 4,2 | 517 |
| FR | 2,3 | 1,1 | 3,5 | FR | 2,1 | 1,0 | 3,2 | FR | 1,9 | 0,8 | 3,0 | 858 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.69 Problèmes de coordination, Suisse (2017, en %)

| | Résultats d'un test ou dossier médical ne sont pas disponibles au moment du rendez-vous | | | Informations contradictoires reçues de différents médecins ou professionnels de la santé | | | Test médical prescrit par un médecin jugé inutile parce que le test a déjà été effectué | | | Échantillon n |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 9,6 | 8,1 | 11,0 | 12,0 | 10,3 | 13,7 | 12,5 | 10,8 | 14,2 | 2975 |
| Homme | 10,2 | 7,8 | 12,5 | 12,6 | 10,1 | 15,2 | 14,3 | 11,6 | 16,9 | 1403 |
| Femme | 9,1 | 7,1 | 11,0 | 11,5 | 9,2 | 13,7 | 11,1 | 8,9 | 13,4 | 1572 |
| 65–69 ans | 11,8 | 8,6 | 15,0 | 13,4 | 10,1 | 16,8 | 11,9 | 8,7 | 15,2 | 750 |
| 70–74 ans | 9,4 | 6,6 | 12,2 | 13,9 | 10,3 | 17,4 | 12,9 | 9,6 | 16,2 | 864 |
| 75–79 ans | 11,2 | 7,5 | 14,9 | 12,8 | 9,0 | 16,5 | 13,0 | 9,4 | 16,7 | 650 |
| 80+ ans | 5,7 | 3,7 | 7,7 | 7,8 | 5,1 | 10,5 | 12,4 | 8,9 | 16,0 | 711 |
| Scolarité obligatoire | 8,2 | 5,4 | 11,0 | 11,7 | 8,1 | 15,3 | 8,6 | 5,6 | 11,7 | 656 |
| Secondaire II | 9,9 | 7,9 | 11,9 | 11,4 | 9,3 | 13,5 | 13,8 | 11,5 | 16,2 | 1630 |
| Tertiaire | 10,5 | 7,0 | 13,9 | 16,5 | 12,0 | 21,0 | 13,2 | 9,4 | 17,0 | 664 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 9,9 | 8,1 | 11,6 | 12,3 | 10,3 | 14,3 | 12,4 | 10,5 | 14,4 | 2230 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 8,7 | 6,0 | 11,3 | 11,2 | 7,9 | 14,4 | 12,8 | 9,3 | 16,4 | 745 |
| Né en Suisse | 8,8 | 7,1 | 10,4 | 11,4 | 9,5 | 13,3 | 12,5 | 10,6 | 14,5 | 2046 |
| Né à l'étranger | 12,6 | 9,1 | 16,1 | 14,3 | 10,5 | 18,1 | 12,4 | 8,8 | 15,9 | 925 |
| Medical Home | 11,3 | 8,7 | 13,9 | 13,6 | 10,8 | 16,3 | 12,3 | 9,6 | 14,9 | 1216 |
| Sans Medical Home | 18,2 | 13,5 | 23,0 | 22,0 | 16,8 | 27,1 | 18,4 | 13,8 | 23,0 | 640 |
| Malade | 10,9 | 8,0 | 13,7 | 14,2 | 10,8 | 17,5 | 14,4 | 11,0 | 17,8 | 916 |
| Non-malade | 8,5 | 6,8 | 10,3 | 10,2 | 8,3 | 12,1 | 11,2 | 9,2 | 13,1 | 1968 |
| Malade avec Medical Home | 12,7 | 8,2 | 17,1 | 14,9 | 10,0 | 19,7 | 10,8 | 6,7 | 15,0 | 453 |
| Malade sans Medical Home | 18,7 | 9,8 | 27,6 | 26,0 | 15,9 | 36,0 | 23,2 | 13,5 | 33,0 | 199 |
| Ville | 8,8 | 6,3 | 11,3 | 11,7 | 8,7 | 14,6 | 13,1 | 9,8 | 16,3 | 934 |
| Agglomération | 10,4 | 8,1 | 12,7 | 11,9 | 9,4 | 14,4 | 13,7 | 11,1 | 16,3 | 1517 |
| Zone rurale | 8,3 | 5,1 | 11,5 | 13,0 | 9,0 | 17,0 | 10,5 | 6,8 | 14,2 | 417 |
| Suisse alémanique | 8,8 | 6,9 | 10,8 | 12,2 | 9,9 | 14,4 | 13,8 | 11,4 | 16,1 | 958 |
| Suisse romande | 11,6 | 9,4 | 13,8 | 11,6 | 9,4 | 13,8 | 9,3 | 7,5 | 11,1 | 1713 |
| Suisse italienne | 9,7 | 6,3 | 13,1 | 11,6 | 7,8 | 15,4 | 10,8 | 7,2 | 14,4 | 304 |
| ZH | 6,5 | 3,6 | 9,3 | 10,6 | 7,0 | 14,3 | 15,9 | 11,7 | 20,1 | 310 |
| CH sans ZH | 10,2 | 8,5 | 11,9 | 12,3 | 10,4 | 14,2 | 11,8 | 10,0 | 13,7 | 2665 |
| VD | 12,6 | 8,7 | 16,6 | 12,1 | 8,2 | 16,0 | 8,3 | 5,2 | 11,4 | 296 |
| CH sans VD | 9,3 | 7,7 | 10,8 | 12,0 | 10,2 | 13,8 | 12,9 | 11,1 | 14,8 | 2679 |
| VS | 11,8 | 7,4 | 16,2 | 11,0 | 6,9 | 15,2 | 9,0 | 5,2 | 12,7 | 288 |
| CH sans VS | 9,5 | 7,9 | 11,0 | 12,0 | 10,3 | 13,8 | 12,7 | 10,9 | 14,5 | 2687 |
| GE | 10,2 | 8,3 | 12,2 | 13,1 | 10,8 | 15,3 | 13,8 | 11,5 | 16,0 | 1061 |
| CH sans GE | 9,5 | 7,9 | 11,1 | 11,9 | 10,2 | 13,7 | 12,5 | 10,6 | 14,3 | 1914 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.70 Problèmes de coordination, Suisse (2014, en %)

| | Résultats d'un test ou dossier médical ne sont pas disponibles au moment du rendez-vous | | | Informations contradictoires reçues de différents médecins ou professionnels de la santé | | | Test médical prescrit par un médecin jugé inutile parce que le test a déjà été effectué | | | Échantillon n |
|--------------------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 6,8 | 4,7 | 8,9 | 9,3 | 6,9 | 11,7 | 13,1 | 10,5 | 15,8 | 1044 |
| Homme | 6,5 | 4,0 | 8,9 | 8,7 | 5,4 | 12,1 | 13,2 | 9,5 | 16,9 | 474 |
| Femme | 7,0 | 3,9 | 10,2 | 9,7 | 6,4 | 13,1 | 13,1 | 9,4 | 16,7 | 570 |
| 65–69 ans | 6,6 | 3,4 | 9,7 | 8,8 | 5,2 | 12,4 | 11,9 | 7,4 | 16,3 | 333 |
| 70–74 ans | 5,8 | 1,8 | 9,8 | 12,4 | 6,9 | 18,0 | 12,5 | 8,0 | 16,9 | 292 |
| 75–79 ans | 7,5 | 2,2 | 12,8 | 10,7 | 4,6 | 16,8 | 17,5 | 10,7 | 24,4 | 201 |
| 80+ ans | 7,4 | 2,8 | 12,1 | 5,4 | 1,6 | 9,3 | 11,2 | 6,1 | 16,3 | 218 |
| Scolarité obligatoire | 8,0 | 3,1 | 13,0 | 3,5 | 1,1 | 5,9 | 5,5 | 2,1 | 8,9 | 204 |
| Secondaire II | 6,4 | 3,7 | 9,2 | 11,0 | 7,5 | 14,4 | 16,1 | 12,4 | 19,8 | 608 |
| Tertiaire | 6,9 | 3,1 | 10,7 | 11,1 | 6,1 | 16,1 | 12,2 | 6,9 | 17,5 | 217 |
| Revenu sup. à la moyenne | 5,0 | 1,7 | 8,3 | 6,9 | 2,7 | 11,2 | 9,3 | 4,0 | 14,6 | 174 |
| Revenu dans la moyenne | 10,0 | 2,5 | 17,4 | 14,9 | 6,8 | 23,1 | 13,7 | 6,5 | 21,0 | 198 |
| Revenu inf. à la moyenne | 6,7 | 4,3 | 9,1 | 8,6 | 5,9 | 11,2 | 14,3 | 11,0 | 17,5 | 623 |
| Né en Suisse | 6,3 | 4,2 | 8,3 | 7,9 | 5,7 | 10,1 | 13,0 | 10,2 | 15,9 | 829 |
| Né à l'étranger | 9,2 | 2,1 | 16,2 | 15,8 | 7,1 | 24,5 | 13,8 | 7,0 | 20,6 | 214 |
| Ville | 6,6 | 2,0 | 11,1 | 8,5 | 3,7 | 13,2 | 12,8 | 7,1 | 18,5 | 279 |
| Agglomération | 6,5 | 3,8 | 9,2 | 9,7 | 6,4 | 13,0 | 14,3 | 10,5 | 18,0 | 522 |
| Zone rurale | 7,6 | 3,1 | 12,2 | 9,4 | 4,2 | 14,6 | 11,3 | 6,7 | 16,0 | 243 |
| Medical Home | 4,3 | 2,0 | 6,6 | 10,6 | 6,5 | 14,7 | 16,5 | 11,7 | 21,4 | 389 |
| Sans Medical Home | 13,9 | 6,3 | 21,5 | 16,0 | 8,3 | 23,8 | 16,6 | 8,8 | 24,5 | 166 |
| Malade | 6,8 | 2,7 | 11,0 | 12,2 | 6,8 | 17,6 | 14,3 | 9,4 | 19,1 | 303 |
| Non-malade | 6,8 | 4,4 | 9,3 | 8,2 | 5,6 | 10,8 | 12,7 | 9,6 | 15,9 | 727 |
| Malade avec Medical Home | 4,0 | 0,2 | 7,8 | 18,1 | 8,6 | 27,5 | 17,7 | 9,4 | 26,1 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 8,9 | 0,4 | 17,4 | 7,2 | 1,3 | 13,2 | 15,7 | 3,9 | 27,6 | 51 |
| Suisse alémanique | 6,8 | 4,1 | 9,6 | 9,7 | 6,6 | 12,9 | 14,0 | 10,6 | 17,5 | 527 |
| Suisse romande | 7,4 | 4,3 | 10,5 | 8,1 | 4,7 | 11,5 | 11,6 | 7,8 | 15,4 | 346 |
| Suisse italienne | 3,4 | 0,9 | 6,0 | 8,9 | 4,4 | 13,4 | 8,0 | 3,7 | 12,3 | 171 |
| VD | 3,5 | 0,8 | 6,2 | 7,6 | 3,0 | 12,3 | 10,2 | 5,2 | 15,2 | 173 |
| CH sans VD | 7,1 | 4,8 | 9,4 | 9,5 | 6,9 | 12,1 | 13,4 | 10,6 | 16,2 | 871 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1015 : Au cours des deux dernières années, en recevant des soins pour un problème de santé, vous est-il déjà arrivé ?

– De penser qu'une erreur médicale ait été faite dans votre traitement ou vos soins. (A4)

Base : Tous les répondants, non concernés exclus.

Tableau 6.71 Erreur médicale constatée par le patient, comparaison internationale (2017, en%)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| SE | 12,2 | 11,2 | 13,2 | 86,0 | 84,9 | 87,0 | 1,9 | 1,5 | 2,3 | 6568 |
| AU | 11,8 | 9,1 | 14,5 | 87,4 | 84,7 | 90,1 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 2455 |
| CH | 11,3 | 9,6 | 12,9 | 88,2 | 86,5 | 89,9 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 3012 |
| NZ | 10,2 | 6,8 | 13,6 | 89,7 | 86,3 | 93,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 495 |
| US | 9,9 | 7,8 | 12,0 | 89,2 | 86,9 | 91,4 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 1390 |
| DE | 9,8 | 7,4 | 12,2 | 88,8 | 86,3 | 91,4 | 1,4 | 0,4 | 2,3 | 737 |
| NO | 8,8 | 6,4 | 11,2 | 91,0 | 88,6 | 93,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 743 |
| CA | 8,4 | 7,3 | 9,5 | 90,8 | 89,7 | 92,0 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 4516 |
| NL | 8,1 | 6,1 | 10,1 | 91,5 | 89,5 | 93,6 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 739 |
| UK | 7,2 | 5,1 | 9,2 | 92,1 | 89,9 | 94,2 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 746 |
| FR | 2,8 | 1,6 | 4,1 | 97,1 | 95,8 | 98,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 745 |

Note : Non concernés exclus.

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.72 Erreur médicale constatée par le patient, comparaison internationale (2014, en%)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| SE | 11,4 | 10,2 | 12,7 | 86,9 | 85,6 | 88,2 | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 5000 |
| US | 9,2 | 7,1 | 11,3 | 90,1 | 88,0 | 92,3 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 1116 |
| CH | 8,1 | 5,9 | 10,3 | 91,1 | 88,9 | 93,4 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 1084 |
| DE | 7,8 | 5,0 | 10,6 | 90,4 | 87,4 | 93,4 | 1,8 | 0,5 | 3,0 | 547 |
| CA | 7,5 | 6,3 | 8,7 | 91,8 | 90,5 | 93,0 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 3147 |
| NZ | 7,3 | 3,8 | 10,8 | 91,3 | 87,6 | 95,0 | 1,4 | 0,1 | 2,6 | 379 |
| AU | 7,1 | 4,2 | 10,0 | 92,2 | 89,2 | 95,2 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 1670 |
| NL | 6,8 | 4,1 | 9,5 | 89,3 | 85,9 | 92,7 | 3,9 | 1,6 | 6,2 | 582 |
| NO | 6,2 | 3,9 | 8,5 | 93,6 | 91,2 | 95,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 651 |
| UK | 6,2 | 3,9 | 8,5 | 93,3 | 90,9 | 95,7 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 581 |
| FR | 2,0 | 0,9 | 3,1 | 97,7 | 96,5 | 98,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 860 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.73 Erreur médicale constatée par le patient, Suisse (2017, en%)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 11,3 | 9,6 | 12,9 | 88,2 | 86,5 | 89,9 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 3012 |
| Homme | 10,9 | 8,5 | 13,3 | 88,6 | 86,2 | 91,1 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1412 |
| Femme | 11,6 | 9,3 | 13,8 | 87,8 | 85,5 | 90,1 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1600 |
| 65–69 ans | 12,8 | 9,4 | 16,2 | 87,2 | 83,8 | 90,6 | . | . | . | 755 |
| 70–74 ans | 13,2 | 9,8 | 16,6 | 86,1 | 82,6 | 89,5 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 874 |
| 75–79 ans | 12,2 | 8,4 | 16,1 | 87,3 | 83,3 | 91,2 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 648 |
| 80+ ans | 6,9 | 4,6 | 9,2 | 92,2 | 89,7 | 94,6 | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 735 |
| Scolarité obligatoire | 12,1 | 8,6 | 15,6 | 87,3 | 83,7 | 90,9 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 662 |
| Secondaire II | 10,8 | 8,7 | 12,9 | 88,8 | 86,7 | 91 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 1647 |
| Tertiaire | 12,6 | 8,9 | 16,3 | 86,6 | 82,8 | 90,4 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 678 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 11,2 | 9,3 | 13,1 | 88,4 | 86,5 | 90,4 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 2252 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 11,6 | 8,4 | 14,8 | 87,5 | 84,2 | 90,7 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 760 |
| Né en Suisse | 10,8 | 8,9 | 12,6 | 88,6 | 86,7 | 90,5 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 2072 |
| Né à l'étranger | 13,4 | 9,7 | 17,0 | 86,5 | 82,9 | 90,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 936 |
| Medical Home | 10,7 | 8,2 | 13,2 | 89,1 | 86,6 | 91,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1211 |
| Sans Medical Home | 18,8 | 14,0 | 23,5 | 80,8 | 76,0 | 85,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 649 |
| Malade | 12,8 | 9,7 | 16,0 | 85,8 | 82,6 | 89,1 | 1,4 | 0,3 | 2,4 | 930 |
| Non-malade | 10,0 | 8,1 | 11,9 | 89,9 | 88,0 | 91,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1989 |
| Malade avec Medical Home | 11,5 | 7,5 | 15,6 | 87,8 | 83,7 | 92 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 455 |
| Malade sans Medical Home | 20,7 | 11,9 | 29,4 | 77,9 | 69,1 | 86,7 | 1,4 | 0,0 | 3,2 | 204 |
| Ville | 9,6 | 6,9 | 12,3 | 89,4 | 86,5 | 92,2 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 959 |
| Agglomération | 12,2 | 9,7 | 14,8 | 87,3 | 84,8 | 89,9 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1521 |
| Zone rurale | 10,9 | 7,3 | 14,5 | 88,9 | 85,3 | 92,5 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 423 |
| Suisse alémanique | 11,6 | 9,3 | 13,8 | 88,0 | 85,7 | 90,2 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 973 |
| Suisse romande | 10,5 | 8,4 | 12,6 | 88,7 | 86,5 | 90,9 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 1732 |
| Suisse italienne | 11,2 | 7,5 | 14,8 | 88,5 | 84,8 | 92,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 307 |
| ZH | 9,3 | 5,8 | 12,7 | 90,1 | 86,6 | 93,6 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 318 |
| CH sans ZH | 11,7 | 9,9 | 13,6 | 87,8 | 85,9 | 89,7 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 2694 |
| VD | 10,5 | 6,9 | 14,1 | 88,9 | 85,3 | 92,6 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 301 |
| CH sans VD | 11,4 | 9,6 | 13,1 | 88,1 | 86,3 | 89,9 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 2711 |
| VS | 8,7 | 5,0 | 12,5 | 90,6 | 86,9 | 94,4 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 292 |
| CH sans VS | 11,4 | 9,7 | 13,1 | 88,1 | 86,3 | 89,8 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 2720 |
| GE | 10,1 | 8,2 | 12,0 | 89,6 | 87,7 | 91,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1072 |
| CH sans GE | 11,4 | 9,6 | 13,1 | 88,1 | 86,3 | 89,9 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 1940 |

Note : Non concernés exclus

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.74 Erreur médicale constatée par le patient, Suisse (2014, en%)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 8,1 | 5,8 | 10,3 | 91,1 | 88,9 | 93,4 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 1084 |
| Homme | 7,1 | 4,1 | 10,2 | 91,9 | 88,7 | 95,1 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 493 |
| Femme | 8,8 | 5,6 | 11,9 | 90,6 | 87,4 | 93,8 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 591 |
| 65–69 ans | 7,3 | 3,9 | 10,7 | 91,4 | 87,8 | 95,0 | 1,3 | 0,0 | 2,6 | 349 |
| 70–74 ans | 10,8 | 5,7 | 15,8 | 88,5 | 83,3 | 93,6 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 300 |
| 75–79 ans | 7,4 | 2,0 | 12,7 | 92,6 | 87,2 | 97,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 209 |
| 80+ ans | 6,9 | 2,8 | 11,0 | 92,2 | 87,9 | 96,5 | 0,9 | 0,0 | 2,4 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 5,5 | 2,0 | 8,9 | 93,8 | 90,1 | 97,5 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 216 |
| Secondaire II | 9,3 | 6,2 | 12,5 | 89,9 | 86,7 | 93,1 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 628 |
| Tertiaire | 6,0 | 2,9 | 9,2 | 93,0 | 89,6 | 96,4 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 3,8 | 0,8 | 6,8 | 96,0 | 93,0 | 99,1 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 9,0 | 2,1 | 15,9 | 91,0 | 84,1 | 97,9 | . | . | . | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 9,2 | 6,4 | 12,0 | 89,6 | 86,7 | 92,5 | 1,1 | 0,2 | 2,1 | 645 |
| Né en Suisse | 7,0 | 5,0 | 9,1 | 92,3 | 90,2 | 94,4 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 863 |
| Né à l'étranger | 12,8 | 4,9 | 20,6 | 85,7 | 77,8 | 93,7 | 1,5 | 0,0 | 3,4 | 220 |
| Ville | 9,7 | 4,8 | 14,6 | 88,9 | 83,7 | 94,0 | 1,4 | 0,0 | 3,2 | 293 |
| Agglomération | 7,1 | 4,3 | 9,9 | 92,4 | 89,6 | 95,2 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 540 |
| Zone rurale | 8,1 | 3,4 | 12,8 | 91,1 | 86,3 | 95,9 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 251 |
| Medical Home | 11,3 | 7,0 | 15,5 | 88,6 | 84,4 | 92,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 392 |
| Sans Medical Home | 9,5 | 3,2 | 15,8 | 90,3 | 83,9 | 96,6 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 180 |
| Malade | 14,0 | 8,5 | 19,4 | 85,4 | 79,8 | 90,9 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 305 |
| Non-malade | 5,9 | 3,7 | 8,1 | 93,3 | 90,9 | 95,6 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 18,3 | 9,1 | 27,6 | 81,4 | 72,2 | 90,7 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 13,8 | 3,0 | 24,7 | 85,2 | 74,1 | 96,2 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 52 |
| Suisse alémanique | 8,5 | 5,6 | 11,5 | 90,6 | 87,5 | 93,6 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 551 |
| Suisse romande | 6,4 | 3,7 | 9,1 | 93,1 | 90,3 | 95,9 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 355 |
| Suisse italienne | 9,1 | 4,8 | 13,4 | 90,0 | 85,5 | 94,5 | 0,9 | 0,0 | 2,2 | 178 |
| VD | 7,8 | 3,3 | 12,2 | 91,8 | 87,2 | 96,3 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 178 |
| CH sans VD | 8,1 | 5,7 | 10,5 | 91,1 | 88,6 | 93,5 | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1015 : Au moins un problème de coordination :

Au cours des deux dernières années, en recevant des soins pour un problème de santé, vous est-il déjà arrivé ... ?

- Que des résultats d'un test ou votre dossier médical ne soient pas disponibles au moment du rendez-vous pour les soins. (A1)
OU
- De recevoir des informations contradictoires de différents médecins ou professionnels de la santé. (A2) **OU**
- Que des médecins prescrivent un test médical que vous jugiez inutile parce que le test avait déjà été effectué. (A3)

Au moins un problème de coordination concernant un test médical :

Au cours des deux dernières années, en recevant des soins pour un problème de santé, vous est-il déjà arrivé ... ?

- Que des résultats d'un test ou votre dossier médical ne soient pas disponibles au moment du rendez-vous pour les soins. (A1)
OU
- Que des médecins prescrivent un test médical que vous jugiez inutile parce que le test avait déjà été effectué. (A3)

Base : Tous les répondants, non concernés exclus.

Tableau 6.75 Au moins un problème de coordination, comparaison internationale (2017, en %)

| Au moins un problème de coordination | | | | Au moins un problème de coordination concernant un test médical | | | | Échantillon |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| DE | 31,1 | 27,4 | 34,8 | US | 22,8 | 19,9 | 25,8 | 1392 |
| US | 29,2 | 26 | 32,4 | DE | 22,2 | 18,8 | 25,5 | 751 |
| UK | 24,4 | 21 | 27,8 | CH | 17,8 | 15,9 | 19,7 | 3238 |
| CH | 23,6 | 21,5 | 25,7 | AU | 17,4 | 14,6 | 20,1 | 2500 |
| CA | 23,1 | 21,4 | 24,9 | UK | 16,7 | 13,7 | 19,6 | 753 |
| AU | 22,6 | 19,5 | 25,6 | CA | 16,2 | 14,6 | 17,9 | 4549 |
| NZ | 18,6 | 14,4 | 22,7 | NZ | 12,3 | 8,9 | 15,8 | 500 |
| SE | 17,6 | 16,5 | 18,7 | NO | 11,3 | 8,6 | 14,1 | 750 |
| NO | 16,8 | 13,6 | 20 | SE | 9,1 | 8,3 | 10,0 | 7000 |
| NL | 13 | 10,5 | 15,6 | NL | 8,4 | 6,3 | 10,5 | 750 |
| FR | 7,2 | 5,3 | 9,1 | FR | 5,5 | 3,8 | 7,2 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.76 Au moins un problème de coordination, comparaison internationale (2014, en %)

| Au moins un problème de coordination | | | | Au moins un problème de coordination concernant un test médical | | | | Échantillon |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 30,2 | 26,7 | 33,7 | US | 22,3 | 19,1 | 25,5 | 1116 |
| DE | 23,2 | 18,7 | 27,6 | CH | 16,2 | 13,4 | 19,0 | 1084 |
| CA | 22,2 | 20,3 | 24,1 | CA | 14,9 | 13,3 | 16,5 | 3147 |
| CH | 20,7 | 17,6 | 23,7 | DE | 14,4 | 10,7 | 18,1 | 547 |
| SE | 17,8 | 16,3 | 19,2 | AU | 12,7 | 9,0 | 16,3 | 1670 |
| AU | 17,7 | 13,8 | 21,7 | UK | 11,6 | 8,4 | 14,8 | 581 |
| NO | 17,6 | 13,9 | 21,2 | SE | 9,6 | 8,5 | 10,7 | 5000 |
| UK | 17,1 | 13,2 | 20,9 | NO | 8,8 | 6,2 | 11,4 | 651 |
| NZ | 15,5 | 10,2 | 20,8 | NZ | 8,7 | 4,8 | 12,6 | 379 |
| NL | 11,5 | 8,3 | 14,7 | NL | 7,7 | 5,0 | 10,5 | 582 |
| FR | 4,8 | 3,1 | 6,5 | FR | 3,7 | 2,2 | 5,2 | 860 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.77 Au moins un problème de coordination, Suisse (2017, en %)

| | Au moins un problème de coordination | | | Au moins un problème de coordination concernant un test médical | | | Échantillon n |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 23,6 | 21,5 | 25,7 | 17,8 | 15,9 | 19,7 | 3238 |
| Homme | 25,6 | 22,4 | 28,8 | 19,5 | 16,6 | 22,4 | 1526 |
| Femme | 22,0 | 19,2 | 24,8 | 16,5 | 14,0 | 19,0 | 1712 |
| 65–69 ans | 27,1 | 22,8 | 31,4 | 19,2 | 15,5 | 23,0 | 828 |
| 70–74 ans | 22,9 | 19,0 | 26,9 | 17,9 | 14,4 | 21,5 | 954 |
| 75–79 ans | 25,3 | 20,6 | 29,9 | 19,2 | 14,9 | 23,4 | 697 |
| 80+ ans | 18,8 | 14,9 | 22,6 | 15,0 | 11,5 | 18,5 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 20,1 | 16,0 | 24,3 | 14,4 | 10,8 | 18,0 | 706 |
| Secondaire II | 24,3 | 21,5 | 27,1 | 18,9 | 16,4 | 21,4 | 1765 |
| Tertiaire | 26,9 | 22,0 | 31,8 | 19,1 | 14,9 | 23,3 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 24,1 | 21,6 | 26,5 | 18,0 | 15,8 | 20,2 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 22,2 | 18,2 | 26,2 | 17,3 | 13,6 | 21,0 | 807 |
| Né en Suisse | 22,9 | 20,5 | 25,3 | 17,1 | 15,0 | 19,2 | 2217 |
| Né à l'étranger | 26,1 | 21,7 | 30,5 | 20,5 | 16,4 | 24,6 | 1015 |
| Medical Home | 27,5 | 23,9 | 31,1 | 20,4 | 17,1 | 23,6 | 1249 |
| Sans Medical Home | 34,2 | 28,9 | 39,5 | 26,0 | 21,1 | 30,9 | 726 |
| Malade | 30,1 | 25,8 | 34,3 | 21,6 | 17,8 | 25,5 | 948 |
| Non-malade | 20,0 | 17,6 | 22,4 | 15,6 | 13,5 | 17,8 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 30,8 | 24,7 | 37,0 | 21,0 | 15,6 | 26,4 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 45,8 | 34,9 | 56,6 | 32,5 | 22,1 | 42,9 | 210 |
| Ville | 23,0 | 19,3 | 26,7 | 17,5 | 14,1 | 20,8 | 1026 |
| Agglomération | 25,0 | 21,8 | 28,1 | 19,2 | 16,3 | 22,0 | 1643 |
| Zone rurale | 22,7 | 17,9 | 27,5 | 16,3 | 12,1 | 20,5 | 454 |
| Suisse alémanique | 23,9 | 21,1 | 26,7 | 18,3 | 15,8 | 20,8 | 1040 |
| Suisse romande | 23,3 | 20,5 | 26,1 | 17,3 | 14,8 | 19,8 | 1869 |
| Suisse italienne | 20,6 | 16,0 | 25,1 | 14,5 | 10,6 | 18,4 | 329 |
| ZH | 24,0 | 19,2 | 28,8 | 18,9 | 14,5 | 23,2 | 332 |
| CH sans ZH | 23,5 | 21,2 | 25,8 | 17,6 | 15,5 | 19,7 | 2906 |
| VD | 22,8 | 18,0 | 27,6 | 17,2 | 12,9 | 21,5 | 324 |
| CH sans VD | 23,7 | 21,4 | 25,9 | 17,9 | 15,9 | 19,9 | 2914 |
| VS | 20,9 | 15,9 | 25,8 | 15,2 | 10,7 | 19,6 | 321 |
| CH sans VS | 23,7 | 21,5 | 25,9 | 18,0 | 16,0 | 19,9 | 2917 |
| GE | 26,0 | 23,2 | 28,7 | 19,9 | 17,5 | 22,4 | 1160 |
| CH sans GE | 23,4 | 21,2 | 25,7 | 17,7 | 15,7 | 19,7 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.78 Au moins un problème de coordination, Suisse (2014, en %)

| | Au moins un problème de coordination | | | Au moins un problème de coordination concernant un test médical | | | Échantillon n |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 20,7 | 17,6 | 23,7 | 16,2 | 13,4 | 19,0 | 1084 |
| Homme | 20,3 | 15,9 | 24,6 | 15,9 | 12,1 | 19,7 | 493 |
| Femme | 21,0 | 16,8 | 25,2 | 16,4 | 12,4 | 20,4 | 591 |
| 65–69 ans | 20,0 | 14,9 | 25,2 | 15,0 | 10,4 | 19,6 | 349 |
| 70–74 ans | 21,5 | 15,6 | 27,5 | 15,5 | 10,3 | 20,7 | 300 |
| 75–79 ans | 24,3 | 16,8 | 31,7 | 19,9 | 12,9 | 27,0 | 209 |
| 80+ ans | 17,4 | 11,4 | 23,4 | 14,9 | 9,2 | 20,6 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 14,6 | 8,9 | 20,2 | 11,9 | 6,5 | 17,3 | 216 |
| Secondaire II | 22,9 | 18,8 | 27,0 | 17,8 | 14,0 | 21,5 | 628 |
| Tertiaire | 21,7 | 15,3 | 28,1 | 16,4 | 10,7 | 22,2 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 14,6 | 8,7 | 20,5 | 12,0 | 6,5 | 17,5 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 23,2 | 14,8 | 31,6 | 18,3 | 10,1 | 26,4 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 22,3 | 18,4 | 26,2 | 17,3 | 13,8 | 20,8 | 645 |
| Né en Suisse | 20,0 | 16,8 | 23,3 | 15,9 | 12,9 | 18,9 | 863 |
| Né à l'étranger | 23,8 | 15,4 | 32,1 | 17,6 | 10,0 | 25,2 | 220 |
| Ville | 18,1 | 12,1 | 24,1 | 14,5 | 8,9 | 20,2 | 293 |
| Agglomération | 22,3 | 18,0 | 26,7 | 17,6 | 13,6 | 21,6 | 540 |
| Zone rurale | 20,2 | 14,1 | 26,4 | 15,2 | 9,6 | 20,8 | 251 |
| Medical Home | 24,4 | 18,8 | 29,9 | 18,5 | 13,5 | 23,4 | 392 |
| Sans Medical Home | 27,6 | 19,1 | 36,2 | 20,5 | 12,5 | 28,4 | 180 |
| Malade | 25,2 | 18,7 | 31,6 | 18,8 | 13,0 | 24,6 | 305 |
| Non-malade | 19,1 | 15,7 | 22,6 | 15,3 | 12,1 | 18,5 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 32,2 | 21,9 | 42,6 | 19,9 | 11,4 | 28,4 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 19,6 | 7,2 | 31,9 | 17,0 | 5,0 | 28,9 | 52 |
| Suisse alémanique | 21,8 | 17,8 | 25,8 | 17,2 | 13,6 | 20,9 | 551 |
| Suisse romande | 18,5 | 14,0 | 23,1 | 14,3 | 10,2 | 18,4 | 355 |
| Suisse italienne | 14,7 | 9,5 | 19,9 | 10,3 | 5,8 | 14,9 | 178 |
| VD | 15,2 | 9,5 | 20,8 | 11,4 | 6,3 | 16,5 | 178 |
| CH sans VD | 21,2 | 17,9 | 24,5 | 16,6 | 13,6 | 19,7 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1020 : Avez-vous consulté ou eu besoin de consulter un spécialiste au cours des deux dernières années ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.79 Consultation d'un spécialiste au cours des deux dernières années, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| DE | 70,2 | 66,6 | 73,9 | 29,4 | 25,8 | 33,1 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 751 |
| US | 66,8 | 63,5 | 70,0 | 32,7 | 29,5 | 36,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1392 |
| NL | 65,6 | 61,9 | 69,3 | 33,7 | 30,0 | 37,4 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 750 |
| CH | 65,4 | 63,0 | 67,7 | 34,4 | 32,1 | 36,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| AU | 65,1 | 61,4 | 68,7 | 34,1 | 30,5 | 37,8 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 2500 |
| CA | 61,3 | 59,4 | 63,2 | 38,4 | 36,5 | 40,2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 4549 |
| SE | 56,9 | 55,5 | 58,4 | 42,4 | 40,9 | 43,8 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 7000 |
| NZ | 56,7 | 51,6 | 61,7 | 42,8 | 37,8 | 47,8 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 500 |
| UK | 56,3 | 52,3 | 60,3 | 42,7 | 38,8 | 46,7 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 753 |
| FR | 52,6 | 48,8 | 56,5 | 47,4 | 43,5 | 51,2 | . | . | . | 750 |
| NO | 52,5 | 48,2 | 56,8 | 46,5 | 42,2 | 50,8 | 1,0 | 0,0 | 1,9 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.80 Consultation d'un spécialiste au cours des deux dernières années, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| DE | 85,0 | 81,3 | 88,8 | 14,5 | 10,7 | 18,2 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 547 |
| NL | 70,4 | 65,8 | 75,0 | 29,3 | 24,8 | 33,9 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 582 |
| US | 68,5 | 64,9 | 72,0 | 31,2 | 27,7 | 34,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1116 |
| AU | 66,0 | 60,8 | 71,2 | 33,7 | 28,5 | 39,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1670 |
| CH | 65,8 | 62,3 | 69,3 | 34,1 | 30,6 | 37,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1084 |
| FR | 60,5 | 56,5 | 64,4 | 39,5 | 35,6 | 43,5 | . | . | . | 860 |
| NO | 59,5 | 54,8 | 64,2 | 39,9 | 35,2 | 44,5 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 651 |
| CA | 57,7 | 55,3 | 60,1 | 42,1 | 39,7 | 44,5 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 3147 |
| SE | 51,7 | 49,8 | 53,7 | 47,4 | 45,5 | 49,3 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 5000 |
| NZ | 48,9 | 42,0 | 55,9 | 50,5 | 43,6 | 57,5 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 379 |
| UK | 46,2 | 41,4 | 51,1 | 53,8 | 48,9 | 58,6 | . | . | . | 581 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.81 Consultation d'un spécialiste au cours des deux dernières années, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | Non | | | NSP/NR | | Échantillon | | |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 65,4 | 63,0 | 67,7 | 34,4 | 32,1 | 36,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| Homme | 68,5 | 65,0 | 71,9 | 31,4 | 28,0 | 34,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1526 |
| Femme | 62,9 | 59,7 | 66,2 | 36,9 | 33,7 | 40,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1712 |
| 65–69 ans | 67,3 | 62,8 | 71,8 | 32,5 | 28,0 | 37,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 828 |
| 70–74 ans | 67,9 | 63,5 | 72,2 | 31,9 | 27,5 | 36,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 954 |
| 75–79 ans | 67,4 | 62,4 | 72,4 | 32,5 | 27,5 | 37,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 697 |
| 80+ ans | 58,9 | 53,9 | 64,0 | 40,9 | 35,9 | 46,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 59,0 | 53,9 | 64,0 | 40,8 | 35,8 | 45,9 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 706 |
| Secondaire II | 66,0 | 62,9 | 69,0 | 34,0 | 30,9 | 37,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1765 |
| Tertiaire | 76,0 | 71,4 | 80,6 | 23,6 | 19,0 | 28,2 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 66,9 | 64,2 | 69,6 | 32,9 | 30,2 | 35,6 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 60,9 | 56,2 | 65,7 | 38,9 | 34,1 | 43,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 807 |
| Né en Suisse | 65,0 | 62,3 | 67,7 | 34,9 | 32,2 | 37,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2217 |
| Né à l'étranger | 67,2 | 62,6 | 71,9 | 32,4 | 27,8 | 37,1 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1015 |
| Medical Home | 84,7 | 81,7 | 87,6 | 15,3 | 12,3 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1249 |
| Sans Medical Home | 64,1 | 58,7 | 69,5 | 35,8 | 30,4 | 41,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 726 |
| Malade | 80,5 | 76,8 | 84,2 | 19,3 | 15,6 | 23,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 948 |
| Non-malade | 58,9 | 56,0 | 61,9 | 40,9 | 38,0 | 43,9 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 89,2 | 84,7 | 93,7 | 10,7 | 6,2 | 15,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 77,7 | 68,7 | 86,7 | 22,0 | 13,0 | 30,9 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 210 |
| Ville | 64,5 | 60,2 | 68,9 | 35,3 | 30,9 | 39,7 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1026 |
| Agglomération | 67,4 | 64,0 | 70,8 | 32,5 | 29,1 | 35,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1643 |
| Zone rurale | 63,1 | 57,6 | 68,6 | 36,9 | 31,3 | 42,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 65,1 | 61,9 | 68,2 | 34,9 | 31,7 | 38,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1040 |
| Suisse romande | 66,4 | 63,2 | 69,5 | 33,4 | 30,2 | 36,5 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1869 |
| Suisse italienne | 65,0 | 59,7 | 70,4 | 33,9 | 28,6 | 39,1 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 329 |
| ZH | 70,5 | 65,4 | 75,6 | 29,5 | 24,4 | 34,6 | . | . | . | 332 |
| CH sans ZH | 64,3 | 61,7 | 67,0 | 35,5 | 32,8 | 38,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2906 |
| VD | 65,0 | 59,6 | 70,4 | 34,8 | 29,4 | 40,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 65,4 | 62,9 | 67,9 | 34,4 | 31,9 | 37,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2914 |
| VS | 61,3 | 55,6 | 67,0 | 37,7 | 32,0 | 43,4 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 321 |
| CH sans VS | 65,6 | 63,1 | 68,0 | 34,3 | 31,8 | 36,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2917 |
| GE | 70,0 | 67,1 | 72,8 | 29,9 | 27,1 | 32,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1160 |
| CH sans GE | 65,1 | 62,6 | 67,6 | 34,7 | 32,2 | 37,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.82 Consultation d'un spécialiste au cours des deux dernières années, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | Non | | | NSP/NR | | Échantillon | | |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 65,8 | 62,3 | 69,3 | 34,1 | 30,6 | 37,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1084 |
| Homme | 68,8 | 63,6 | 74,0 | 31,2 | 26,0 | 36,4 | . | . | . | 493 |
| Femme | 63,5 | 58,8 | 68,2 | 36,3 | 31,6 | 41,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 591 |
| 65–69 ans | 68,8 | 63,0 | 74,7 | 30,9 | 25,1 | 36,8 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 349 |
| 70–74 ans | 70,5 | 64,0 | 77,1 | 29,5 | 22,9 | 36,0 | . | . | . | 300 |
| 75–79 ans | 69,5 | 62,3 | 76,8 | 30,2 | 23,0 | 37,4 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 209 |
| 80+ ans | 53,9 | 45,9 | 62,0 | 46,1 | 38,0 | 54,1 | . | . | . | 226 |
| Scolarité obligatoire | 52,9 | 44,4 | 61,4 | 46,8 | 38,3 | 55,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 216 |
| Secondaire II | 68,5 | 64,2 | 72,7 | 31,4 | 27,2 | 35,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 628 |
| Tertiaire | 77,4 | 71,2 | 83,6 | 22,6 | 16,4 | 28,8 | . | . | . | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 74,5 | 67,0 | 82,1 | 25,5 | 17,9 | 33,0 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 64,9 | 56,9 | 72,9 | 35,1 | 27,1 | 43,1 | . | . | . | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 65,5 | 60,9 | 70,0 | 34,4 | 29,9 | 39,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 645 |
| Né en Suisse | 66,7 | 62,8 | 70,5 | 33,3 | 29,5 | 37,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 863 |
| Né à l'étranger | 61,5 | 52,8 | 70,2 | 38,2 | 29,5 | 46,8 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 220 |
| Ville | 65,3 | 58,2 | 72,4 | 34,5 | 27,4 | 41,6 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 293 |
| Agglomération | 66,4 | 61,5 | 71,3 | 33,5 | 28,6 | 38,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 540 |
| Zone rurale | 65,1 | 58,1 | 72,1 | 34,9 | 27,9 | 41,9 | . | . | . | 251 |
| Medical Home | 91,0 | 88,0 | 94,1 | 9,0 | 5,9 | 12,0 | . | . | . | 392 |
| Sans Medical Home | 69,2 | 60,5 | 77,8 | 30,8 | 22,2 | 39,5 | . | . | . | 180 |
| Malade | 73,2 | 66,8 | 79,7 | 26,8 | 20,3 | 33,2 | . | . | . | 305 |
| Non-malade | 63,2 | 59,1 | 67,3 | 36,6 | 32,5 | 40,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 92,9 | 88,2 | 97,5 | 7,1 | 2,5 | 11,8 | . | . | . | 146 |
| Malade sans Medical Home | 81,8 | 69,6 | 93,9 | 18,2 | 6,1 | 30,4 | . | . | . | 52 |
| Suisse alémanique | 68,3 | 63,9 | 72,7 | 31,6 | 27,2 | 36,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 551 |
| Suisse romande | 59,5 | 53,6 | 65,5 | 40,2 | 34,3 | 46,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 355 |
| Suisse italienne | 59,4 | 51,2 | 67,6 | 40,6 | 32,4 | 48,8 | . | . | . | 178 |
| VD | 63,4 | 55,3 | 71,5 | 35,9 | 27,8 | 44,0 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 178 |
| CH sans VD | 66,0 | 62,3 | 69,7 | 33,9 | 30,2 | 37,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1030 : Après que l'on vous ait recommandé ou que vous ayez décidé de consulter un spécialiste, combien de temps avez-vous dû attendre pour avoir un rendez-vous ?

Base : Répondants ayant consulté un spécialiste au cours des deux dernières années.

Tableau 6.83 Délai d'attente pour un rendez-vous chez un spécialiste, comparaison internationale (2017, en %)

| | Moins de quatre semaines | | | De un mois à moins de deux mois | | | Deux mois et plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| CH | 77,8 | 75,3 | 80,3 | 17,0 | 14,7 | 19,2 | 4,7 | 3,5 | 5,9 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2169 |
| US | 77,4 | 73,9 | 80,8 | 15,0 | 12,1 | 18,0 | 5,7 | 3,6 | 7,7 | 1,9 | 0,9 | 2,9 | 946 |
| NL | 75,1 | 70,9 | 79,2 | 18,8 | 15,1 | 22,6 | 5,1 | 2,9 | 7,2 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 481 |
| DE | 62,0 | 57,3 | 66,6 | 24,5 | 20,3 | 28,7 | 12,6 | 9,6 | 15,6 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 526 |
| FR | 57,6 | 52,2 | 63,0 | 27,6 | 22,7 | 32,6 | 13,5 | 9,6 | 17,3 | 1,3 | 0,1 | 2,4 | 382 |
| NZ | 53,1 | 46,2 | 60,0 | 30,1 | 23,7 | 36,5 | 13,9 | 9,3 | 18,6 | 2,8 | 0,4 | 5,3 | 265 |
| SE | 52,7 | 50,7 | 54,6 | 24,0 | 22,3 | 25,7 | 19,6 | 18,0 | 21,1 | 3,8 | 3,0 | 4,6 | 3973 |
| UK | 47,8 | 42,5 | 53,1 | 32,4 | 27,4 | 37,5 | 17,8 | 13,8 | 21,8 | 1,9 | 0,6 | 3,3 | 421 |
| NO | 45,0 | 39,2 | 50,9 | 31,5 | 26,1 | 36,9 | 21,6 | 16,9 | 26,2 | 1,9 | 0,1 | 3,7 | 417 |
| AU | 44,4 | 39,7 | 49,1 | 37,2 | 32,5 | 41,9 | 17,0 | 13,1 | 20,9 | 1,5 | 0,8 | 2,1 | 1526 |
| CA | 40,4 | 37,9 | 42,9 | 29,7 | 27,3 | 32,0 | 28,2 | 25,7 | 30,7 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | 2747 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.84 Délai d'attente pour un rendez-vous chez un spécialiste, comparaison internationale (2014, en %)

| | Moins de quatre semaines | | | De un mois à moins de deux mois | | | Deux mois et plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 83,7 | 80,4 | 86,9 | 12,1 | 9,1 | 15,1 | 1,9 | 0,8 | 3,0 | 2,3 | 1,3 | 3,4 | 775 |
| CH | 81,2 | 77,7 | 84,8 | 15,6 | 12,2 | 18,9 | 2,3 | 1,1 | 3,6 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 712 |
| NL | 68,6 | 62,8 | 74,4 | 19,7 | 14,9 | 24,5 | 8,8 | 5,1 | 12,5 | 2,9 | 0,7 | 5,1 | 397 |
| AU | 63,0 | 56,3 | 69,7 | 19,6 | 14,6 | 24,7 | 15,8 | 10,5 | 21,2 | 1,6 | 0,3 | 2,9 | 1105 |
| NZ | 60,6 | 51,5 | 69,7 | 18,8 | 11,5 | 26,2 | 18,1 | 10,9 | 25,3 | 2,5 | 0,3 | 4,8 | 193 |
| FR | 60,3 | 55,2 | 65,4 | 26,4 | 21,8 | 30,9 | 13,0 | 9,6 | 16,4 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 525 |
| DE | 60,1 | 54,4 | 65,7 | 21,0 | 16,4 | 25,6 | 17,2 | 12,6 | 21,9 | 1,7 | 0,3 | 3,0 | 463 |
| UK | 57,4 | 50,3 | 64,4 | 23,6 | 17,5 | 29,7 | 15,2 | 10,2 | 20,2 | 3,8 | 0,7 | 7,0 | 267 |
| SE | 48,4 | 45,7 | 51,1 | 29,4 | 26,9 | 31,9 | 18,4 | 16,4 | 20,5 | 3,7 | 2,7 | 4,7 | 2608 |
| NO | 43,9 | 38,0 | 49,9 | 31,2 | 25,4 | 37,1 | 20,8 | 15,9 | 25,6 | 4,1 | 1,8 | 6,3 | 400 |
| CA | 42,2 | 39,2 | 45,3 | 25,2 | 22,5 | 27,8 | 23,5 | 20,9 | 26,0 | 9,1 | 7,1 | 11,1 | 1802 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.85 Délai d'attente pour un rendez-vous chez un spécialiste, Suisse (2017, en %)

| | Moins de quatre semaines | | | De un mois à moins de deux mois | | | Deux mois et plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 77,8 | 75,3 | 80,3 | 17,0 | 14,7 | 19,2 | 4,7 | 3,5 | 5,9 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2169 |
| Homme | 78,4 | 74,8 | 81,9 | 17,4 | 14,1 | 20,6 | 3,3 | 1,8 | 4,7 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1097 |
| Femme | 77,3 | 73,9 | 80,8 | 16,6 | 13,5 | 19,7 | 5,9 | 4,0 | 7,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1072 |
| 65–69 ans | 73,6 | 68,4 | 78,7 | 18,6 | 14,1 | 23,1 | 7,3 | 4,3 | 10,3 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 554 |
| 70–74 ans | 81,1 | 76,9 | 85,2 | 15,8 | 11,9 | 19,7 | 3,1 | 1,4 | 4,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 658 |
| 75–79 ans | 79,3 | 74,0 | 84,6 | 18,0 | 12,9 | 23,1 | 2,1 | 0,7 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 477 |
| 80+ ans | 78,2 | 73,0 | 83,4 | 15,2 | 10,8 | 19,6 | 5,7 | 2,7 | 8,6 | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 480 |
| Scolarité obligatoire | 79,5 | 74,5 | 84,6 | 17,1 | 12,4 | 21,8 | 3,3 | 1,2 | 5,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 415 |
| Secondaire II | 76,5 | 73,2 | 79,8 | 17,7 | 14,7 | 20,7 | 5,1 | 3,4 | 6,7 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 1175 |
| Tertiaire | 80,9 | 76,0 | 85,7 | 13,9 | 9,5 | 18,2 | 5,2 | 2,7 | 7,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 565 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 78,8 | 76,0 | 81,6 | 16,1 | 13,6 | 18,6 | 4,8 | 3,4 | 6,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1672 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 74,7 | 69,4 | 80,0 | 19,8 | 14,9 | 24,7 | 4,2 | 2,1 | 6,4 | 1,2 | 0,0 | 2,9 | 497 |
| Né en Suisse | 77,6 | 74,7 | 80,5 | 16,8 | 14,2 | 19,4 | 4,9 | 3,5 | 6,4 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 1478 |
| Né à l'étranger | 78,4 | 73,7 | 83,2 | 17,7 | 13,3 | 22,2 | 3,8 | 1,8 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 689 |
| Medical Home | 80,5 | 77,3 | 83,8 | 15,8 | 12,8 | 18,8 | 3,4 | 1,9 | 5,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1061 |
| Sans Medical Home | 66,2 | 59,6 | 72,8 | 23,5 | 17,6 | 29,5 | 9,3 | 5,3 | 13,3 | 1,0 | 0,0 | 2,7 | 489 |
| Malade | 76,7 | 72,5 | 80,9 | 17,4 | 13,7 | 21,2 | 5,0 | 2,9 | 7,1 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 771 |
| Non-malade | 78,6 | 75,5 | 81,8 | 16,7 | 13,8 | 19,5 | 4,4 | 2,9 | 6,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1330 |
| Malade avec Medical Home | 76,4 | 70,6 | 82,1 | 20,0 | 14,5 | 25,4 | 3,0 | 0,9 | 5,1 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 423 |
| Malade sans Medical Home | 61,2 | 49,1 | 73,3 | 24,1 | 13,9 | 34,2 | 11,7 | 3,3 | 20,2 | 3,0 | 0,0 | 8,8 | 173 |
| Ville | 80,0 | 75,7 | 84,4 | 14,9 | 11,0 | 18,9 | 5,0 | 2,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 681 |
| Agglomération | 78,1 | 74,5 | 81,6 | 17,3 | 14,1 | 20,5 | 4,1 | 2,4 | 5,9 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 1142 |
| Zone rurale | 75,8 | 69,8 | 81,9 | 18,5 | 13,1 | 24,0 | 5,0 | 2,0 | 8,1 | 0,6 | 0,0 | 1,8 | 283 |
| Suisse alémanique | 81,2 | 77,9 | 84,4 | 14,6 | 11,7 | 17,6 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 677 |
| Suisse romande | 69,2 | 65,3 | 73,0 | 22,5 | 19,1 | 25,9 | 8,2 | 5,5 | 10,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1278 |
| Suisse italienne | 73,6 | 67,5 | 79,8 | 22,1 | 16,3 | 27,9 | 4,3 | 1,5 | 7,1 | . | . | . | 214 |
| ZH | 86,7 | 82,1 | 91,3 | 9,0 | 5,1 | 12,9 | 4,1 | 1,4 | 6,8 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 227 |
| CH sans ZH | 75,9 | 73,0 | 78,7 | 18,7 | 16,1 | 21,3 | 4,8 | 3,5 | 6,2 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 1942 |
| VD | 72,1 | 65,7 | 78,5 | 23,3 | 17,3 | 29,4 | 4,6 | 1,6 | 7,5 | . | . | . | 209 |
| CH sans VD | 78,4 | 75,7 | 81,0 | 16,4 | 14,0 | 18,7 | 4,7 | 3,4 | 6,0 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 1960 |
| VS | 63,7 | 56,2 | 71,2 | 24,7 | 17,8 | 31,5 | 11,6 | 6,6 | 16,6 | . | . | . | 197 |
| CH sans VS | 78,4 | 75,9 | 81,0 | 16,6 | 14,3 | 19,0 | 4,4 | 3,1 | 5,7 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 1972 |
| GE | 75,9 | 72,8 | 79,1 | 19,5 | 16,6 | 22,4 | 3,8 | 2,5 | 5,2 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 823 |
| CH sans GE | 77,9 | 75,3 | 80,6 | 16,8 | 14,4 | 19,2 | 4,7 | 3,4 | 6,0 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 1346 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.86 Délai d'attente pour un rendez-vous chez un spécialiste, Suisse (2014, en %)

| | Moins de quatre semaines | | | De un mois à moins de deux mois | | | Deux mois et plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 81,2 | 77,7 | 84,8 | 15,6 | 12,2 | 18,9 | 2,3 | 1,1 | 3,6 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 712 |
| Homme | 82,6 | 77,4 | 87,7 | 15,1 | 10,1 | 20,2 | 1,5 | 0,4 | 2,5 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 333 |
| Femme | 80,2 | 75,3 | 85,0 | 15,9 | 11,4 | 20,5 | 3,0 | 0,9 | 5,1 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 379 |
| 65–69 ans | 79,3 | 72,8 | 85,9 | 15,8 | 9,7 | 22,0 | 3,6 | 1,1 | 6,0 | 1,3 | 0,1 | 2,4 | 238 |
| 70–74 ans | 82,9 | 77,3 | 88,6 | 14,2 | 8,8 | 19,6 | 1,5 | 0,1 | 3,0 | 1,4 | 0,0 | 2,7 | 216 |
| 75–79 ans | 82,5 | 74,8 | 90,1 | 17,0 | 9,3 | 24,6 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | . | . | . | 137 |
| 80+ ans | 80,5 | 71,6 | 89,4 | 15,4 | 7,4 | 23,4 | 3,6 | 0,0 | 8,2 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 121 |
| Scolarité obligatoire | 85,5 | 77,7 | 93,3 | 9,7 | 3,5 | 15,9 | 3,0 | 0,0 | 7,9 | 1,8 | 0,0 | 3,7 | 113 |
| Secondaire II | 80,9 | 76,6 | 85,3 | 16,4 | 12,2 | 20,6 | 1,9 | 0,8 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 425 |
| Tertiaire | 75,9 | 66,1 | 85,8 | 20,2 | 10,4 | 29,9 | 3,5 | 0,3 | 6,6 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 166 |
| Revenu sup. à la moyenne | 87,7 | 82,1 | 93,4 | 9,0 | 4,1 | 13,9 | 2,9 | 0,1 | 5,7 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 134 |
| Revenu dans la moyenne | 74,6 | 65,6 | 83,5 | 21,8 | 13,1 | 30,5 | 2,1 | 0,3 | 4,0 | 1,5 | 0,0 | 3,3 | 131 |
| Revenu inf. à la moyenne | 81,3 | 76,7 | 85,9 | 15,5 | 11,2 | 19,9 | 2,4 | 0,6 | 4,2 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 421 |
| Né en Suisse | 80,4 | 76,4 | 84,4 | 16,0 | 12,2 | 19,8 | 2,7 | 1,2 | 4,2 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 573 |
| Né à l'étranger | 84,9 | 77,6 | 92,2 | 13,7 | 6,5 | 20,9 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 138 |
| Ville | 82,8 | 76,2 | 89,5 | 13,8 | 7,5 | 20,2 | 2,1 | 0,2 | 3,9 | 1,3 | 0,0 | 2,6 | 193 |
| Agglomération | 83,3 | 78,4 | 88,2 | 13,6 | 9,1 | 18,2 | 2,6 | 0,6 | 4,7 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 360 |
| Zone rurale | 75,5 | 67,7 | 83,3 | 21,3 | 13,8 | 28,9 | 2,0 | 0,0 | 4,2 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 159 |
| Medical Home | 79,9 | 74,8 | 85,0 | 17,4 | 12,5 | 22,4 | 2,1 | 0,8 | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 347 |
| Sans Medical Home | 76,4 | 67,5 | 85,2 | 19,2 | 10,8 | 27,6 | 3,1 | 0,3 | 5,9 | 1,3 | 0,0 | 2,9 | 123 |
| Malade | 80,0 | 73,8 | 86,1 | 16,6 | 10,7 | 22,4 | 2,2 | 0,5 | 4,0 | 1,2 | 0,0 | 2,5 | 234 |
| Non-malade | 81,8 | 77,4 | 86,1 | 15,2 | 11,1 | 19,3 | 2,4 | 0,7 | 4,0 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 477 |
| Malade avec Medical Home | 80,4 | 71,9 | 88,8 | 17,6 | 9,3 | 25,9 | 1,4 | 0,0 | 2,9 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | 134 |
| Malade sans Medical Home | 69,5 | 52,7 | 86,3 | 19,0 | 5,0 | 32,9 | 8,1 | 0,0 | 17,2 | 3,5 | 0,0 | 8,6 | 42 |
| Suisse alémanique | 83,3 | 79,1 | 87,6 | 14,9 | 10,7 | 19,0 | 1,4 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 379 |
| Suisse romande | 72,8 | 65,5 | 80,1 | 19,2 | 13,0 | 25,4 | 5,4 | 0,8 | 10,0 | 2,6 | 0,6 | 4,6 | 221 |
| Suisse italienne | 86,3 | 77,9 | 94,6 | 10,3 | 2,4 | 18,2 | 3,5 | 0,1 | 6,9 | . | . | . | 112 |
| VD | 77,8 | 70,0 | 85,6 | 14,2 | 7,8 | 20,6 | 4,4 | 0,7 | 8,1 | 3,6 | 0,0 | 7,3 | 118 |
| CH sans VD | 81,5 | 77,8 | 85,3 | 15,7 | 12,1 | 19,3 | 2,1 | 0,8 | 3,5 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 594 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1050 : Au cours des deux dernières années, vous est-il arrivé ... ?

- Qu'un spécialiste n'ait pas de renseignements médicaux basiques ou les résultats des tests de votre médecin habituel ou de l'endroit habituel où vous allez pour les soins concernant la raison de votre visite. (A1)
- Qu'après avoir vu le spécialiste, votre médecin habituel ou le personnel médical de l'endroit habituel où vous allez pour les soins ne semblait pas informé et à jour concernant les soins que vous aviez reçus d'un spécialiste. (A2)

Base : Répondants ayant un médecin ou un lieu de traitement habituel et ayant consulté un spécialiste au cours des deux dernières années, non concernés exclus.

Tableau 6.87 Problèmes de coordination entre le médecin habituel et le spécialiste, comparaison internationale (2017, en %)

| Le spécialiste n'a pas de renseignements médicaux ou les résultats des tests du médecin habituel | | | | Le médecin habituel ne semblait pas informé concernant les soins reçus d'un spécialiste | | | | Au moins un problème de coordination entre le spécialiste et le médecin habituel (A1 ou A2) | | | | Échantillon |
|--|------------------|----------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 10,1 | 7,4 | 12,7 | DE | 20,7 | 16,9 | 24,6 | DE | 23,4 | 19,5 | 27,4 | 523 |
| CH | 9,2 | 7,3 | 11,0 | US | 18,0 | 14,8 | 21,3 | US | 22,1 | 18,5 | 25,6 | 944 |
| DE | 7,4 | 4,9 | 9,8 | NO | 16,6 | 12,2 | 21,0 | NO | 19,1 | 14,4 | 23,7 | 418 |
| SE | 7,4 | 6,3 | 8,4 | NL | 12,7 | 9,7 | 15,7 | CH | 17,2 | 14,8 | 19,5 | 2151 |
| CA | 5,0 | 4,0 | 6,1 | SE | 12,2 | 10,8 | 13,5 | SE | 16,2 | 14,7 | 17,6 | 3951 |
| NO | 4,7 | 2,1 | 7,2 | CH | 12,0 | 10,0 | 14,1 | NL | 15,4 | 12,1 | 18,7 | 487 |
| UK | 4,6 | 2,5 | 6,7 | UK | 12,0 | 8,5 | 15,5 | UK | 15,1 | 11,3 | 18,9 | 419 |
| NL | 3,7 | 2,0 | 5,3 | CA | 11,9 | 10,3 | 13,6 | CA | 14,4 | 12,6 | 16,1 | 2739 |
| AU | 2,9 | 1,6 | 4,3 | NZ | 8,3 | 4,4 | 12,2 | NZ | 10,7 | 6,3 | 15,2 | 264 |
| NZ | 2,8 | 0,4 | 5,3 | AU | 7,1 | 5,0 | 9,2 | AU | 8,6 | 6,4 | 10,8 | 1533 |
| FR | 2,1 | 0,6 | 3,7 | FR | 4,9 | 2,5 | 7,3 | FR | 6,7 | 3,9 | 9,4 | 382 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.88 Problèmes de coordination entre le médecin habituel et le spécialiste, comparaison internationale (2014, en %)

| Le spécialiste n'a pas de renseignements médicaux ou les résultats des tests du médecin habituel | | | | Le médecin habituel ne semblait pas informé concernant les soins reçus d'un spécialiste | | | | Au moins un problème de coordination entre le spécialiste et le médecin habituel (A1 ou A2) | | | | Échantillon |
|--|------------------|----------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| CA | 13,8 | 11,6 | 16,0 | NO | 41,7 | 35,5 | 47,9 | NO | 45,1 | 38,8 | 51,3 | 370 |
| DE | 11,4 | 7,7 | 15,1 | DE | 28,1 | 22,9 | 33,2 | DE | 31,1 | 25,9 | 36,4 | 460 |
| CH | 10,3 | 7,4 | 13,2 | CA | 24,7 | 21,9 | 27,4 | CA | 29,7 | 26,8 | 32,6 | 1752 |
| UK | 10,3 | 5,8 | 14,8 | SE | 19,4 | 17,1 | 21,6 | SE | 24,0 | 21,6 | 26,5 | 2305 |
| US | 9,2 | 6,6 | 11,8 | UK | 15,6 | 10,4 | 20,8 | CH | 19,9 | 16,1 | 23,6 | 687 |
| SE | 8,4 | 7,0 | 9,9 | US | 15,3 | 11,8 | 18,8 | UK | 19,1 | 13,4 | 24,9 | 261 |
| AU | 7,7 | 3,7 | 11,7 | CH | 15,0 | 11,7 | 18,2 | US | 18,7 | 14,9 | 22,4 | 745 |
| NZ | 6,2 | 2,6 | 9,8 | NL | 14,3 | 9,6 | 19,1 | NL | 18,3 | 13,1 | 23,4 | 379 |
| NL | 6,0 | 2,8 | 9,1 | NZ | 10,0 | 5,1 | 15,0 | AU | 14,3 | 9,7 | 18,9 | 1101 |
| NO | 5,3 | 2,6 | 8,0 | AU | 8,9 | 6,0 | 11,8 | NZ | 13,8 | 8,0 | 19,5 | 190 |
| FR | 2,8 | 1,0 | 4,6 | FR | 4,6 | 2,4 | 6,7 | FR | 5,8 | 3,4 | 8,2 | 517 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.89 Problèmes de coordination entre le médecin habituel et le spécialiste, Suisse (2017, en %)

| | Le spécialiste n'a pas de renseignements médicaux ou les résultats des tests du médecin habituel | | | Le médecin habituel ne semblait pas informé concernant les soins reçus d'un spécialiste | | | Au moins un problème de coordination entre le spécialiste et le médecin habituel (A1 ou A2) | | | Échantillon n |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 9,2 | 7,3 | 11,0 | 12,0 | 10,0 | 14,1 | 17,2 | 14,8 | 19,5 | 2151 |
| Homme | 9,5 | 6,9 | 12,2 | 11,2 | 8,3 | 14,0 | 17,3 | 13,9 | 20,7 | 1092 |
| Femme | 8,9 | 6,3 | 11,4 | 12,8 | 9,9 | 15,7 | 17,0 | 13,8 | 20,3 | 1059 |
| 65–69 ans | 9,9 | 6,2 | 13,6 | 11,3 | 7,5 | 15,1 | 17,0 | 12,5 | 21,6 | 546 |
| 70–74 ans | 8,9 | 5,7 | 12,0 | 10,9 | 7,6 | 14,3 | 16,0 | 11,9 | 20,0 | 653 |
| 75–79 ans | 9,6 | 5,4 | 13,7 | 12,1 | 7,6 | 16,5 | 17,3 | 12,1 | 22,5 | 475 |
| 80+ ans | 8,2 | 4,6 | 11,9 | 14,3 | 9,5 | 19,1 | 18,6 | 13,4 | 23,8 | 477 |
| Scolarité obligatoire | 13,0 | 8,2 | 17,8 | 15,2 | 10,1 | 20,3 | 24,4 | 18,5 | 30,4 | 413 |
| Secondaire II | 7,7 | 5,6 | 9,9 | 11,0 | 8,5 | 13,6 | 14,8 | 11,9 | 17,6 | 1171 |
| Tertiaire | 10,2 | 5,8 | 14,7 | 12,1 | 7,8 | 16,4 | 17,6 | 12,5 | 22,7 | 553 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 8,6 | 6,5 | 10,6 | 11,3 | 9,0 | 13,6 | 15,7 | 13,1 | 18,3 | 1659 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 11,2 | 7,1 | 15,2 | 14,4 | 9,8 | 18,9 | 21,8 | 16,5 | 27,1 | 492 |
| Né en Suisse | 8,7 | 6,7 | 10,8 | 11,2 | 8,9 | 13,5 | 16,1 | 13,4 | 18,8 | 1470 |
| Né à l'étranger | 10,7 | 6,8 | 14,7 | 15,1 | 10,6 | 19,7 | 21,0 | 16,0 | 26,0 | 679 |
| Medical Home | 9,0 | 6,3 | 11,6 | 10,7 | 8,0 | 13,5 | 15,6 | 12,4 | 18,9 | 1068 |
| Sans Medical Home | 9,0 | 5,2 | 12,8 | 14,9 | 9,5 | 20,3 | 20 | 14,2 | 25,7 | 455 |
| Malade | 6,9 | 4,2 | 9,5 | 11,7 | 8,3 | 15,0 | 15,4 | 11,7 | 19,1 | 771 |
| Non-malade | 10,7 | 8,1 | 13,2 | 12,1 | 9,5 | 14,8 | 18,1 | 15 | 21,2 | 1312 |
| Malade avec Medical Home | 6,5 | 2,9 | 10,0 | 11,1 | 6,7 | 15,4 | 14,7 | 9,8 | 19,6 | 426 |
| Malade sans Medical Home | 11,6 | 3,4 | 19,8 | 16,1 | 6,4 | 25,7 | 21,7 | 11,4 | 32 | 166 |
| Ville | 8,1 | 4,8 | 11,4 | 11,8 | 7,9 | 15,6 | 16,0 | 11,7 | 20,3 | 681 |
| Agglomération | 10,5 | 7,7 | 13,3 | 12,5 | 9,6 | 15,5 | 18,5 | 15,0 | 21,9 | 1130 |
| Zone rurale | 9,6 | 5,2 | 14,0 | 10,2 | 5,8 | 14,6 | 15,6 | 10,3 | 21,0 | 276 |
| Suisse alémanique | 10,0 | 7,5 | 12,5 | 13,3 | 10,5 | 16,1 | 18,3 | 15,1 | 21,5 | 680 |
| Suisse romande | 7,7 | 5,4 | 10,0 | 10,0 | 7,8 | 12,2 | 15,5 | 12,6 | 18,4 | 1260 |
| Suisse italienne | 5,0 | 2,1 | 8,0 | 5,3 | 2,5 | 8,2 | 9,9 | 6,0 | 13,9 | 211 |
| ZH | 7,9 | 4,2 | 11,5 | 12,9 | 8,4 | 17,4 | 16,0 | 11,1 | 21,0 | 234 |
| CH sans ZH | 9,5 | 7,4 | 11,6 | 11,8 | 9,6 | 14,1 | 17,4 | 14,8 | 20,1 | 1917 |
| VD | 7,8 | 3,9 | 11,8 | 10,7 | 6,1 | 15,2 | 17,4 | 11,8 | 22,9 | 202 |
| CH sans VD | 9,3 | 7,3 | 11,3 | 12,2 | 10,0 | 14,4 | 17,1 | 14,6 | 19,7 | 1949 |
| VS | 8,1 | 3,9 | 12,3 | 8,7 | 4,9 | 12,5 | 15,4 | 10,1 | 20,6 | 193 |
| CH sans VS | 9,2 | 7,3 | 11,1 | 12,2 | 10,1 | 14,3 | 17,2 | 14,8 | 19,7 | 1958 |
| GE | 7,9 | 5,9 | 10,0 | 13,4 | 10,8 | 16,0 | 16,8 | 14,0 | 19,6 | 815 |
| CH sans GE | 9,3 | 7,3 | 11,2 | 12,0 | 9,8 | 14,1 | 17,2 | 14,7 | 19,7 | 1336 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.90 Problèmes de coordination entre le médecin habituel et le spécialiste, Suisse (2014, en %)

| | Le spécialiste n'a pas de renseignements médicaux ou les résultats des tests du médecin habituel | | | Le médecin habituel ne semblait pas informé concernant les soins reçus d'un spécialiste | | | Au moins un problème de coordination entre le spécialiste et le médecin habituel (A1 ou A2) | | | Échantillon n |
|--------------------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 10,3 | 7,4 | 13,2 | 15,0 | 11,7 | 18,2 | 19,9 | 16,1 | 23,6 | 687 |
| Homme | 11,1 | 6,9 | 15,2 | 14,1 | 9,4 | 18,8 | 19,7 | 14,4 | 25,1 | 320 |
| Femme | 9,6 | 5,7 | 13,6 | 15,6 | 11,2 | 20,1 | 20,0 | 14,8 | 25,1 | 367 |
| 65–69 ans | 9,5 | 4,9 | 14,1 | 13,8 | 8,4 | 19,2 | 18,0 | 12,0 | 24,0 | 228 |
| 70–74 ans | 6,5 | 2,8 | 10,2 | 14,0 | 8,6 | 19,4 | 17,5 | 11,5 | 23,5 | 211 |
| 75–79 ans | 14,3 | 6,3 | 22,3 | 14,1 | 7,1 | 21,0 | 22,0 | 13,0 | 31,0 | 132 |
| 80+ ans | 11,7 | 5,2 | 18,1 | 19,0 | 10,2 | 27,8 | 23,3 | 14,0 | 32,6 | 116 |
| Scolarité obligatoire | 12,6 | 5,5 | 19,7 | 14,9 | 7,0 | 22,9 | 19,2 | 10,4 | 28,0 | 106 |
| Secondaire II | 10,3 | 6,6 | 14,0 | 15,3 | 11,2 | 19,4 | 20,4 | 15,7 | 25,2 | 416 |
| Tertiaire | 7,5 | 3,1 | 11,8 | 12,5 | 6,2 | 18,7 | 17,6 | 10,5 | 24,7 | 157 |
| Revenu sup. à la moyenne | 9,0 | 2,5 | 15,5 | 14,8 | 7,0 | 22,6 | 18,5 | 10,2 | 26,8 | 130 |
| Revenu dans la moyenne | 11,6 | 2,9 | 20,2 | 9,3 | 3,8 | 14,8 | 18,0 | 8,6 | 27,4 | 127 |
| Revenu inf. à la moyenne | 10,2 | 6,8 | 13,6 | 17,1 | 12,6 | 21,5 | 21,1 | 16,3 | 25,9 | 406 |
| Né en Suisse | 9,5 | 6,6 | 12,4 | 15,0 | 11,4 | 18,6 | 19,2 | 15,3 | 23,1 | 557 |
| Né à l'étranger | 14,4 | 4,8 | 24,1 | 15,0 | 7,3 | 22,6 | 23,6 | 12,8 | 34,3 | 129 |
| Ville | 12,1 | 5,2 | 19,0 | 11,1 | 5,9 | 16,4 | 18,0 | 10,5 | 25,5 | 182 |
| Agglomération | 9,5 | 5,9 | 13,2 | 15,3 | 10,7 | 19,9 | 19,8 | 14,7 | 24,8 | 349 |
| Zone rurale | 9,9 | 4,4 | 15,4 | 18,2 | 10,8 | 25,6 | 21,9 | 14,0 | 29,8 | 156 |
| Medical Home | 10,8 | 6,7 | 14,9 | 15,7 | 10,8 | 20,6 | 20,4 | 15,1 | 25,8 | 343 |
| Sans Medical Home | 18,5 | 8,0 | 29,0 | 26,1 | 15,8 | 36,5 | 33,4 | 21,6 | 45,2 | 112 |
| Malade | 10,6 | 6,0 | 15,2 | 16,4 | 10,2 | 22,5 | 22,7 | 15,9 | 29,5 | 228 |
| Non-malade | 10,2 | 6,6 | 13,8 | 14,4 | 10,5 | 18,2 | 18,6 | 14,2 | 23,1 | 458 |
| Malade avec Medical Home | 12,0 | 5,5 | 18,6 | 20,7 | 11,8 | 29,7 | 27,1 | 17,4 | 36,8 | 133 |
| Malade sans Medical Home | 10,5 | 0,0 | 23,1 | 20,3 | 3,0 | 37,6 | 23,2 | 5,4 | 41,0 | 39 |
| Suisse alémanique | 10,5 | 6,8 | 14,2 | 15,8 | 11,6 | 19,9 | 20,5 | 15,8 | 25,2 | 363 |
| Suisse romande | 8,2 | 4,2 | 12,1 | 11,8 | 7,2 | 16,4 | 16,1 | 10,8 | 21,4 | 215 |
| Suisse italienne | 16,0 | 7,6 | 24,5 | 16,3 | 9,3 | 23,2 | 26,6 | 17,1 | 36,1 | 109 |
| VD | 8,6 | 3,6 | 13,6 | 10,6 | 5,1 | 16,1 | 15,7 | 9,1 | 22,4 | 115 |
| CH sans VD | 10,4 | 7,3 | 13,5 | 15,3 | 11,8 | 18,8 | 20,2 | 16,2 | 24,2 | 572 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1105 : Combien de différents médicaments sur ordonnance prenez-vous régulièrement et de façon continue ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.91 Consommation régulière de médicaments sur ordonnance, comparaison internationale (2017, en %)

| | Aucun médicament | | | 1 médicament | | | 2 ou 3 médicaments | | | 4 médicaments ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 11,4 | 9,2 | 13,6 | 9,1 | 7,2 | 11,0 | 22,8 | 20,0 | 25,6 | 55,1 | 51,7 | 58,5 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 1392 |
| UK | 13,8 | 10,9 | 16,7 | 11,6 | 9,1 | 14,0 | 27,1 | 23,6 | 30,6 | 46,7 | 42,7 | 50,7 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 753 |
| CA | 13,0 | 11,6 | 14,4 | 13,2 | 11,9 | 14,5 | 29,0 | 27,2 | 30,9 | 43,7 | 41,8 | 45,7 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 4549 |
| SE | 16,8 | 15,7 | 17,9 | 13,3 | 12,3 | 14,3 | 27,8 | 26,5 | 29,1 | 41,9 | 40,4 | 43,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 7000 |
| NL | 18,4 | 15,4 | 21,4 | 13,9 | 11,2 | 16,7 | 27,8 | 24,3 | 31,2 | 39,5 | 35,8 | 43,3 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 750 |
| DE | 16,5 | 13,5 | 19,4 | 14,2 | 11,4 | 17,0 | 29,1 | 25,5 | 32,6 | 39,1 | 35,2 | 43,0 | 1,2 | 0,4 | 1,9 | 751 |
| AU | 15,0 | 12,5 | 17,5 | 13,8 | 11,2 | 16,3 | 36,2 | 32,5 | 40,0 | 33,8 | 30,1 | 37,4 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 2500 |
| CH | 17,0 | 15,2 | 18,9 | 16,7 | 14,9 | 18,6 | 33,1 | 30,8 | 35,5 | 32,6 | 30,3 | 34,9 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 3238 |
| NO | 17,4 | 14,1 | 20,6 | 17,1 | 13,9 | 20,3 | 32,1 | 28,2 | 36,1 | 32,5 | 28,5 | 36,6 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 750 |
| NZ | 22,0 | 18,0 | 26,1 | 15,9 | 12,3 | 19,5 | 31,9 | 27,0 | 36,7 | 30,0 | 25,3 | 34,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 500 |
| FR | 15,8 | 13,2 | 18,5 | 21,4 | 18,3 | 24,5 | 38,3 | 34,5 | 42,1 | 22,3 | 19,0 | 25,6 | 2,1 | 1,0 | 3,3 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.92 Consommation régulière de médicaments sur ordonnance, comparaison internationale (2014, en %)

| | Aucun médicament | | | 1 médicament | | | 2 ou 3 médicaments | | | 4 médicaments ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 12,4 | 9,8 | 15,0 | 9,1 | 7,0 | 11,3 | 25,0 | 21,9 | 28,2 | 52,7 | 49,0 | 56,4 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 1116 |
| NL | 18,4 | 14,5 | 22,3 | 14,8 | 11,2 | 18,4 | 22,4 | 18,1 | 26,7 | 43,3 | 38,2 | 48,4 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 582 |
| NZ | 19,1 | 13,7 | 24,4 | 13,9 | 8,6 | 19,1 | 23,3 | 17,3 | 29,2 | 41,8 | 34,9 | 48,6 | 2,1 | 0,8 | 3,4 | 379 |
| CA | 13,9 | 12,3 | 15,6 | 14,2 | 12,5 | 15,9 | 29,7 | 27,5 | 31,9 | 41,4 | 39,0 | 43,7 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 3147 |
| NO | 16,3 | 13,0 | 19,6 | 14,6 | 11,4 | 17,8 | 27,7 | 23,6 | 31,8 | 40,3 | 35,6 | 45,1 | 1,1 | 0,1 | 2,2 | 651 |
| UK | 17,9 | 14,2 | 21,6 | 14,7 | 11,4 | 18,1 | 24,6 | 20,5 | 28,7 | 40,0 | 35,3 | 44,8 | 2,7 | 1,3 | 4,2 | 581 |
| SE | 17,8 | 16,4 | 19,2 | 13,1 | 11,9 | 14,4 | 28,8 | 27,1 | 30,6 | 39,9 | 38,0 | 41,9 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 5000 |
| AU | 13,4 | 10,0 | 16,7 | 17,1 | 12,6 | 21,6 | 29,9 | 24,6 | 35,2 | 37,9 | 32,4 | 43,4 | 1,7 | 0,7 | 2,8 | 1670 |
| DE | 13,4 | 9,6 | 17,1 | 13,8 | 10,2 | 17,3 | 33,3 | 28,3 | 38,2 | 37,8 | 32,7 | 42,9 | 1,8 | 0,4 | 3,2 | 547 |
| FR | 17,0 | 14,0 | 19,9 | 16,5 | 13,5 | 19,5 | 36,5 | 32,6 | 40,5 | 28,9 | 25,2 | 32,6 | 1,1 | 0,4 | 1,9 | 860 |
| CH | 19,5 | 16,6 | 22,4 | 19,1 | 16,3 | 21,9 | 32,6 | 29,0 | 36,2 | 28,4 | 25,1 | 31,8 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1084 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.93 Consommation régulière de médicaments sur ordonnance, Suisse (2017, en %)

| | Aucun médicament | | | 1 médicament | | | 2 ou 3 médicaments | | | 4 médicaments ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| | % | inf. | sup. | % | inf. | sup. | % | inf. | sup. | % | inf. | sup. | % | inf. | sup. | |
| Total | 17,0 | 15,2 | 18,9 | 16,7 | 14,9 | 18,6 | 33,1 | 30,8 | 35,5 | 32,6 | 30,3 | 34,9 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 3238 |
| Homme | 16,7 | 14,1 | 19,4 | 16,7 | 14,0 | 19,4 | 32,2 | 28,8 | 35,6 | 34,2 | 30,8 | 37,6 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 1526 |
| Femme | 17,3 | 14,7 | 19,8 | 16,8 | 14,2 | 19,3 | 33,9 | 30,7 | 37,1 | 31,3 | 28,2 | 34,5 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 1712 |
| 65-69 ans | 23,0 | 19,1 | 27,0 | 18,8 | 15,1 | 22,6 | 31,0 | 26,5 | 35,4 | 26,8 | 22,6 | 30,9 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 828 |
| 70-74 ans | 19,6 | 15,9 | 23,3 | 21,0 | 17,2 | 24,9 | 30,6 | 26,5 | 34,8 | 27,9 | 23,8 | 32,1 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 954 |
| 75-79 ans | 15,3 | 11,5 | 19,1 | 14,6 | 10,9 | 18,3 | 34,9 | 29,7 | 40,0 | 34,9 | 29,9 | 40,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 697 |
| 80+ ans | 9,0 | 6,1 | 12,0 | 11,7 | 8,4 | 15,1 | 36,7 | 31,8 | 41,6 | 42,1 | 37,1 | 47,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 13,6 | 10,1 | 17,1 | 12,8 | 9,3 | 16,3 | 32,6 | 27,8 | 37,5 | 40,7 | 35,7 | 45,7 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 706 |
| Secondaire II | 17,5 | 15,1 | 20,0 | 17,6 | 15,2 | 20,0 | 33,9 | 30,9 | 36,9 | 30,4 | 27,5 | 33,3 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 1765 |
| Tertiaire | 21,6 | 17,0 | 26,2 | 20,6 | 15,9 | 25,3 | 29,8 | 24,8 | 34,8 | 28,0 | 23,2 | 32,8 | . | . | . | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 17,0 | 14,9 | 19,2 | 17,5 | 15,4 | 19,7 | 34,4 | 31,7 | 37,2 | 30,4 | 27,8 | 33,0 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 17,0 | 13,3 | 20,6 | 14,4 | 10,9 | 17,9 | 29,4 | 25,0 | 33,8 | 38,9 | 34,2 | 43,6 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 807 |
| Né en Suisse | 17,3 | 15,1 | 19,4 | 17,2 | 15,1 | 19,4 | 34,1 | 31,4 | 36,8 | 30,8 | 28,2 | 33,4 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 2217 |
| Né à l'étranger | 15,9 | 12,5 | 19,4 | 15,0 | 11,5 | 18,6 | 29,8 | 25,4 | 34,3 | 39,2 | 34,3 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1015 |
| Medical Home | 8,5 | 6,3 | 10,7 | 15,3 | 12,4 | 18,2 | 34,2 | 30,4 | 38,0 | 41,7 | 37,8 | 45,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1249 |
| Sans Medical Home | 23,8 | 19,0 | 28,6 | 13,3 | 9,6 | 17,0 | 32,1 | 26,8 | 37,4 | 30,8 | 25,8 | 35,8 | . | . | . | 726 |
| Ville | 16,8 | 13,3 | 20,2 | 16,6 | 13,2 | 19,9 | 30,3 | 26,1 | 34,5 | 35,7 | 31,4 | 40,1 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 1026 |
| Agglomération | 17,0 | 14,3 | 19,6 | 17,5 | 14,8 | 20,3 | 32,1 | 28,8 | 35,5 | 32,7 | 29,4 | 36,0 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 1643 |
| Zone rurale | 17,5 | 13,2 | 21,9 | 15,1 | 11,0 | 19,2 | 38,7 | 33,1 | 44,3 | 28,6 | 23,5 | 33,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 454 |
| Suisse alémanique | 17,7 | 15,3 | 20,2 | 17,5 | 15,0 | 20,0 | 33,1 | 29,9 | 36,2 | 31,1 | 28,0 | 34,1 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 1040 |
| Suisse romande | 14,9 | 12,5 | 17,2 | 14,7 | 12,3 | 17,2 | 33,0 | 29,8 | 36,1 | 37,2 | 34,0 | 40,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1869 |
| Suisse italienne | 17,4 | 13,1 | 21,7 | 15,5 | 11,5 | 19,4 | 34,8 | 29,4 | 40,1 | 32,4 | 27,2 | 37,6 | . | . | . | 329 |
| ZH | 19,1 | 14,7 | 23,4 | 18,4 | 14,1 | 22,7 | 30,8 | 25,7 | 36,0 | 30,9 | 25,7 | 36,1 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 332 |
| CH sans ZH | 16,6 | 14,6 | 18,6 | 16,4 | 14,3 | 18,4 | 33,6 | 31,0 | 36,2 | 33,0 | 30,4 | 35,5 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 2906 |
| VD | 15,8 | 11,8 | 19,8 | 10,3 | 6,8 | 13,7 | 35,2 | 29,7 | 40,6 | 38,6 | 33,0 | 44,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 17,1 | 15,2 | 19,1 | 17,3 | 15,3 | 19,3 | 32,9 | 30,4 | 35,4 | 32,1 | 29,6 | 34,5 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 2914 |
| VS | 17,2 | 12,6 | 21,7 | 16,9 | 12,5 | 21,4 | 33,4 | 27,9 | 38,9 | 31,6 | 26,2 | 37,1 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 321 |
| CH sans VS | 17,0 | 15,1 | 18,9 | 16,7 | 14,8 | 18,6 | 33,1 | 30,7 | 35,5 | 32,7 | 30,3 | 35,0 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 2917 |
| GE | 15,5 | 13,2 | 17,7 | 15,7 | 13,4 | 18,0 | 32,2 | 29,3 | 35,1 | 36,4 | 33,4 | 39,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1160 |
| CH sans GE | 17,1 | 15,2 | 19,1 | 16,8 | 14,8 | 18,7 | 33,2 | 30,7 | 35,7 | 32,4 | 30,0 | 34,8 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.94 Consommation régulière de médicaments sur ordonnance, Suisse (2014, en %)

| | Aucun médicament | | | 1 médicament | | | 2 ou 3 médicaments | | | 4 médicaments ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| | % | inf. | sup. | % | inf. | sup. | % | inf. | sup. | % | inf. | sup. | % | inf. | sup. | |
| Total | 19,5 | 16,6 | 22,4 | 19,1 | 16,3 | 21,9 | 32,6 | 29,0 | 36,2 | 28,4 | 25,1 | 31,8 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1084 |
| Homme | 19,4 | 14,8 | 24,0 | 17,6 | 13,4 | 21,7 | 31,7 | 26,4 | 37,1 | 31,3 | 26,0 | 36,6 | . | . | . | 493 |
| Femme | 19,6 | 15,9 | 23,4 | 20,2 | 16,4 | 24,0 | 33,3 | 28,5 | 38,0 | 26,3 | 21,9 | 30,6 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 591 |
| 65-69 ans | 30,1 | 24,0 | 36,2 | 19,6 | 14,6 | 24,7 | 31,1 | 24,6 | 37,6 | 19,2 | 14,1 | 24,3 | . | . | . | 349 |
| 70-74 ans | 19,6 | 13,7 | 25,4 | 21,3 | 15,7 | 26,9 | 33,1 | 26,7 | 39,6 | 26,0 | 19,7 | 32,3 | . | . | . | 300 |
| 75-79 ans | 17,5 | 11,2 | 23,7 | 18,7 | 12,6 | 24,9 | 31,8 | 24,1 | 39,4 | 32,0 | 24,4 | 39,6 | . | . | . | 209 |
| 80+ ans | 8,8 | 4,8 | 12,9 | 16,5 | 10,7 | 22,2 | 34,6 | 26,7 | 42,5 | 38,6 | 30,8 | 46,4 | 1,5 | 0,0 | 3,4 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 15,6 | 9,4 | 21,7 | 15,2 | 9,8 | 20,7 | 34,1 | 25,8 | 42,3 | 34,7 | 26,5 | 42,9 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 216 |
| Secondaire II | 19,7 | 16,1 | 23,3 | 20,1 | 16,4 | 23,8 | 33,0 | 28,6 | 37,5 | 26,8 | 22,7 | 31,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 628 |
| Tertiaire | 26,1 | 17,9 | 34,2 | 20,0 | 13,9 | 26,1 | 27,5 | 20,2 | 34,8 | 26,4 | 19,4 | 33,4 | . | . | . | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 28,1 | 20,0 | 36,3 | 22,9 | 15,5 | 30,3 | 25,8 | 17,7 | 33,9 | 23,1 | 16,2 | 30,1 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 22,0 | 15,5 | 28,5 | 20,3 | 13,6 | 27,0 | 29,0 | 21,0 | 37,1 | 27,5 | 19,5 | 35,5 | 1,2 | 0,0 | 3,5 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 16,6 | 12,9 | 20,2 | 18,0 | 14,5 | 21,5 | 35,5 | 30,9 | 40,2 | 29,8 | 25,4 | 34,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 645 |
| Né en Suisse | 20,5 | 17,2 | 23,8 | 18,9 | 15,8 | 22,0 | 32,6 | 28,7 | 36,5 | 27,6 | 23,9 | 31,2 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 863 |
| Né à l'étranger | 15,4 | 9,7 | 21,0 | 19,9 | 13,1 | 26,7 | 32,1 | 23,3 | 41,0 | 32,6 | 24,0 | 41,2 | . | . | . | 220 |
| Ville | 18,1 | 12,4 | 23,9 | 18,4 | 12,9 | 24,0 | 34,9 | 27,7 | 42,0 | 28,0 | 21,4 | 34,6 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 293 |
| Agglomération | 19,9 | 15,7 | 24,1 | 20,8 | 16,6 | 24,9 | 31,1 | 26,1 | 36,0 | 27,8 | 23,2 | 32,5 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 540 |
| Zone rurale | 20,3 | 14,8 | 25,8 | 16,4 | 11,3 | 21,6 | 33,2 | 25,8 | 40,5 | 30,1 | 23,0 | 37,2 | . | . | . | 251 |
| Medical Home | 12,8 | 8,7 | 16,8 | 18,4 | 13,7 | 23,1 | 33,5 | 27,5 | 39,5 | 35,3 | 29,4 | 41,2 | . | . | . | 392 |
| Sans Medical Home | 23,8 | 16,2 | 31,4 | 16,3 | 9,8 | 22,7 | 34,3 | 24,5 | 44,0 | 25,7 | 18,0 | 33,4 | . | . | . | 180 |
| Suisse alémanique | 19,8 | 16,1 | 23,6 | 19,4 | 15,9 | 23,0 | 34,0 | 29,4 | 38,6 | 26,4 | 22,2 | 30,7 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 551 |
| Suisse romande | 18,9 | 14,2 | 23,6 | 19,0 | 14,0 | 23,9 | 30,2 | 24,7 | 35,6 | 31,3 | 25,5 | 37,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 355 |
| Suisse italienne | 18,8 | 12,3 | 25,3 | 14,4 | 8,4 | 20,5 | 24,0 | 17,4 | 30,5 | 42,8 | 34,5 | 51,1 | . | . | . | 178 |
| VD | 20,8 | 13,7 | 28,0 | 13,8 | 7,9 | 19,6 | 34,9 | 27,1 | 42,7 | 29,8 | 22,5 | 37,1 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 178 |
| CH sans VD | 19,4 | 16,3 | 22,5 | 19,6 | 16,5 | 22,6 | 32,4 | 28,6 | 36,2 | 28,3 | 24,7 | 31,9 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1110 : Au cours des douze derniers mois, est-ce qu'un professionnel de la santé ... ?

- A revu avec vous tous les médicaments que vous prenez. (A1)
- A expliqué les effets secondaires potentiels d'un médicament prescrit. (A2)
- Vous a donné une liste écrite de tous vos médicaments prescrits. (A3)

Base : Répondants prenant au moins deux médicaments sur ordonnance.

Tableau 6.95 Analyse personnalisée de la consommation de médicaments, comparaison internationale (2017, en %)

| A revu avec vous tous les médicaments que vous prenez | | | A expliqué les effets secondaires potentiels d'un médicament prescrit | | | Vous a donné une liste écrite de tous vos médicaments prescrits | | | Échantillon | | | |
|---|------------------|----------------|---|------|------------------|---|----------------|------|------------------|----------------|----------------|------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| NZ | 88,9 | 84,7 | 93,0 | CH | 48,3 | 45,3 | 51,3 | CH | 44,6 | 41,6 | 47,6 | 2181 |
| US | 87,9 | 85,2 | 90,5 | | | | | | | | | |
| AU | 85,9 | 83,0 | 88,9 | | | | | | | | | |
| CA | 80,9 | 78,9 | 82,9 | | | | | | | | | |
| UK | 72,7 | 68,5 | 76,9 | | | | | | | | | |
| CH | 72,4 | 69,7 | 75,0 | | | | | | | | | |
| NL | 65,4 | 60,9 | 69,9 | | | | | | | | | |
| NO | 61,8 | 56,6 | 67,0 | | | | | | | | | |
| DE | 57,5 | 52,7 | 62,2 | | | | | | | | | |
| FR | 56,1 | 51,0 | 61,2 | | | | | | | | | |
| SE | 53,3 | 51,5 | 55,0 | | | | | | | | | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.96 Analyse personnalisée de la consommation de médicaments, comparaison internationale (2014, en %)

| A revu avec vous tous les médicaments que vous prenez | | | A expliqué les effets secondaires potentiels d'un médicament prescrit | | | Vous a donné une liste écrite de tous vos médicaments prescrits | | | Échantillon | | | |
|---|------------------|----------------|---|-----------|------------------|---|----------------|-----------|------------------|----------------|----------------|------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 86,7 | 83,6 | 89,7 | CA | 72,9 | 70,4 | 75,3 | SE | 75,8 | 73,7 | 77,9 | 362 |
| NZ | 79,3 | 72,7 | 85,9 | UK | 71,9 | 66,4 | 77,4 | UK | 73,4 | 67,9 | 79,0 | 2244 |
| CA | 79,0 | 76,6 | 81,3 | US | 70,2 | 66,3 | 74,1 | NL | 71,1 | 65,3 | 77,0 | 881 |
| DE | 78,0 | 72,8 | 83,2 | NZ | 67,6 | 59,5 | 75,7 | CA | 68,1 | 65,5 | 70,8 | 1130 |
| AU | 76,9 | 71,3 | 82,5 | AU | 65,7 | 59,4 | 72,0 | US | 67,5 | 63,6 | 71,3 | 245 |
| UK | 76,4 | 71,2 | 81,5 | DE | 64,9 | 58,9 | 70,8 | NZ | 65,8 | 57,8 | 73,8 | 386 |
| CH | 70,3 | 66,1 | 74,6 | NL | 54,3 | 47,9 | 60,7 | AU | 61,2 | 54,5 | 67,9 | 390 |
| NL | 62,5 | 56,3 | 68,8 | FR | 52,2 | 47,1 | 57,3 | NO | 51,6 | 45,8 | 57,5 | 3253 |
| NO | 60,2 | 54,5 | 65,9 | CH | 43,7 | 38,9 | 48,6 | DE | 47,6 | 41,4 | 53,9 | 662 |
| FR | 48,6 | 43,5 | 53,6 | NO | 35,2 | 29,6 | 40,8 | CH | 40,6 | 35,8 | 45,4 | 549 |
| SE | 47,8 | 45,4 | 50,1 | SE | 32,2 | 30,0 | 34,4 | FR | 28,0 | 23,4 | 32,6 | 416 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.97 Analyse personnalisée de la consommation de médicaments, Suisse (2017, en %)

| | A revu avec vous tous les médicaments que vous prenez | | | A expliqué les effets secondaires potentiels d'un médicament prescrit | | | Vous a donné une liste écrite de tous vos médicaments prescrits | | | Échantillon n |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 72,4 | 69,7 | 75,0 | 48,3 | 45,3 | 51,3 | 44,6 | 41,6 | 47,6 | 21 81 |
| Homme | 73,4 | 69,5 | 77,3 | 48,7 | 44,3 | 53,1 | 49,6 | 45,1 | 54,0 | 1034 |
| Femme | 71,5 | 67,9 | 75,2 | 48,0 | 43,8 | 52,1 | 40,6 | 36,5 | 44,7 | 1147 |
| 65–69 ans | 76,6 | 71,4 | 81,8 | 49,7 | 43,4 | 56,0 | 42,6 | 36,4 | 48,8 | 469 |
| 70–74 ans | 71,0 | 65,7 | 76,3 | 46,8 | 40,9 | 52,6 | 39,4 | 33,6 | 45,2 | 603 |
| 75–79 ans | 67,3 | 61,2 | 73,3 | 52,5 | 46,1 | 58,9 | 43,0 | 36,7 | 49,3 | 496 |
| 80+ ans | 73,8 | 69 | 78,6 | 45,1 | 39,5 | 50,7 | 51,5 | 45,8 | 57,1 | 613 |
| Scolarité obligatoire | 67,4 | 61,9 | 72,9 | 48,4 | 42,4 | 54,4 | 49,0 | 43,0 | 55,0 | 539 |
| Secondaire II | 73,9 | 70,5 | 77,4 | 48,9 | 44,9 | 52,8 | 43,1 | 39,2 | 47,0 | 1150 |
| Tertiaire | 75,7 | 69,9 | 81,6 | 46,5 | 39,6 | 53,5 | 42,2 | 35,4 | 49,1 | 478 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 73,1 | 69,9 | 76,2 | 48,8 | 45,2 | 52,3 | 43,5 | 39,9 | 47,0 | 1600 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 70,5 | 65,4 | 75,6 | 47,0 | 41,2 | 52,8 | 47,8 | 42,0 | 53,6 | 581 |
| Né en Suisse | 75,3 | 72,3 | 78,3 | 47,5 | 44,0 | 51,0 | 44,4 | 40,9 | 47,9 | 1473 |
| Né à l'étranger | 62,6 | 56,8 | 68,3 | 51,5 | 45,5 | 57,5 | 45,4 | 39,5 | 51,3 | 706 |
| Medical Home | 79,2 | 75,6 | 82,9 | 54,1 | 49,6 | 58,7 | 49,7 | 45,1 | 54,2 | 970 |
| Sans Medical Home | 61,5 | 54,6 | 68,4 | 41,6 | 34,7 | 48,5 | 37,6 | 30,9 | 44,4 | 479 |
| Malade | 80,9 | 77,3 | 84,4 | 54,0 | 49,5 | 58,6 | 59,9 | 55,4 | 64,4 | 948 |
| Non-malade | 66,2 | 62,3 | 70,1 | 44,2 | 40,0 | 48,4 | 32,9 | 29,0 | 36,9 | 1140 |
| Malade avec Medical Home | 85,7 | 81,4 | 90,1 | 59,4 | 53,0 | 65,8 | 64,3 | 58,1 | 70,6 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 83,7 | 76,5 | 90,9 | 43,2 | 32,5 | 53,9 | 50,3 | 39,5 | 61,1 | 210 |
| Ville | 70,0 | 65,0 | 75,0 | 49,8 | 44,2 | 55,4 | 44,1 | 38,6 | 49,7 | 703 |
| Agglomération | 73,1 | 69,2 | 77,0 | 48,0 | 43,5 | 52,4 | 43,3 | 38,9 | 47,7 | 1101 |
| Zone rurale | 75,4 | 69,6 | 81,2 | 47,5 | 40,6 | 54,5 | 46,6 | 39,7 | 53,6 | 301 |
| Suisse alémanique | 74,9 | 71,3 | 78,6 | 46,4 | 42,3 | 50,5 | 44,1 | 40,0 | 48,2 | 655 |
| Suisse romande | 71,5 | 68,0 | 75,1 | 53,4 | 49,4 | 57,4 | 47,2 | 43,2 | 51,2 | 1305 |
| Suisse italienne | 45,5 | 38,7 | 52,3 | 48,1 | 41,3 | 54,9 | 39,5 | 32,9 | 46,2 | 221 |
| ZH | 76,2 | 70,1 | 82,3 | 40,0 | 33,0 | 47,0 | 36,1 | 29,3 | 42,9 | 204 |
| CH sans ZH | 71,6 | 68,7 | 74,6 | 49,9 | 46,5 | 53,2 | 46,2 | 42,9 | 49,6 | 1977 |
| VD | 73,9 | 68,1 | 79,6 | 55,0 | 48,4 | 61,6 | 45,2 | 38,5 | 51,8 | 234 |
| CH sans VD | 72,2 | 69,3 | 75,1 | 47,6 | 44,3 | 50,9 | 44,6 | 41,3 | 47,8 | 1947 |
| VS | 70,3 | 63,6 | 76,9 | 51,2 | 44,0 | 58,4 | 46,2 | 39,0 | 53,4 | 214 |
| CH sans VS | 72,5 | 69,7 | 75,2 | 48,2 | 45,0 | 51,3 | 44,5 | 41,4 | 47,7 | 1967 |
| GE | 69,8 | 66,5 | 73,2 | 50,7 | 47,0 | 54,4 | 45,2 | 41,6 | 48,9 | 806 |
| CH sans GE | 72,5 | 69,7 | 75,4 | 48,1 | 44,9 | 51,4 | 44,6 | 41,4 | 47,8 | 1375 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.98 Analyse personnalisée de la consommation de médicaments, Suisse (2014, en %)

| | A revu avec vous tous les médicaments que vous prenez | | | A expliqué les effets secondaires potentiels d'un médicament prescrit | | | Vous a donné une liste écrite de tous vos médicaments prescrits | | | Échantillon n |
|--------------------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 70,3 | 66,1 | 74,6 | 43,7 | 38,9 | 48,6 | 40,6 | 35,8 | 45,4 | 662 |
| Homme | 72,7 | 66,9 | 78,5 | 47,2 | 40,0 | 54,5 | 46,8 | 39,6 | 54,0 | 309 |
| Femme | 68,4 | 62,3 | 74,5 | 40,9 | 34,5 | 47,4 | 35,7 | 29,3 | 42,0 | 353 |
| 65–69 ans | 73,1 | 65,5 | 80,8 | 48,8 | 38,9 | 58,6 | 32,1 | 23,1 | 41,1 | 180 |
| 70–74 ans | 69,7 | 62,1 | 77,3 | 51,0 | 42,0 | 60,1 | 37,4 | 28,5 | 46,3 | 184 |
| 75–79 ans | 70,0 | 60,2 | 79,8 | 38,0 | 28,3 | 47,7 | 42,0 | 32,1 | 51,9 | 137 |
| 80+ ans | 68,7 | 60,0 | 77,5 | 38,2 | 28,7 | 47,8 | 48,9 | 39,2 | 58,6 | 161 |
| Scolarité obligatoire | 68,2 | 58,5 | 77,9 | 41,8 | 31,2 | 52,4 | 37,9 | 27,6 | 48,2 | 145 |
| Secondaire II | 72,9 | 67,7 | 78,1 | 42,3 | 36,3 | 48,4 | 41,4 | 35,3 | 47,5 | 386 |
| Tertiaire | 62,9 | 52,7 | 73,2 | 59,1 | 48,6 | 69,5 | 43,8 | 32,9 | 54,6 | 122 |
| Revenu sup. à la moyenne | 70,1 | 59,3 | 80,9 | 56,2 | 43,6 | 68,7 | 48,0 | 35,5 | 60,6 | 94 |
| Revenu dans la moyenne | 62,7 | 50,6 | 74,8 | 42,9 | 31,0 | 54,8 | 29,7 | 18,7 | 40,6 | 114 |
| Revenu inf. à la moyenne | 73,3 | 68,4 | 78,3 | 42,9 | 36,9 | 48,9 | 42,0 | 36,0 | 48,0 | 423 |
| Né en Suisse | 71,4 | 66,8 | 76,0 | 41,4 | 36,2 | 46,6 | 40,2 | 34,9 | 45,4 | 521 |
| Né à l'étranger | 65,3 | 54,3 | 76,2 | 54,1 | 42,5 | 65,7 | 42,9 | 31,0 | 54,8 | 140 |
| Ville | 65,5 | 56,4 | 74,5 | 45,7 | 36,3 | 55,2 | 38,2 | 29,0 | 47,3 | 183 |
| Agglomération | 72,1 | 66,5 | 77,7 | 41,8 | 35,1 | 48,6 | 39,6 | 32,9 | 46,3 | 328 |
| Zone rurale | 72,2 | 63,4 | 81,0 | 45,0 | 35,0 | 55,1 | 45,0 | 34,9 | 55,1 | 151 |
| Medical Home | 75,0 | 68,4 | 81,5 | 49,3 | 41,7 | 56,9 | 40,7 | 33,4 | 47,9 | 277 |
| Sans Medical Home | 62,6 | 50,3 | 74,9 | 33,0 | 21,0 | 45,0 | 23,9 | 13,3 | 34,6 | 106 |
| Malade | 72,0 | 65,4 | 78,5 | 47,8 | 40,6 | 55,1 | 55,9 | 48,7 | 63,1 | 305 |
| Non-malade | 69,2 | 63,6 | 74,8 | 40,5 | 34,1 | 46,9 | 27,9 | 21,9 | 34,0 | 356 |
| Malade avec Medical Home | 76,2 | 66,5 | 85,9 | 51,9 | 41,5 | 62,4 | 57,1 | 46,4 | 67,7 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 67,0 | 49,1 | 84,8 | 27,3 | 13,5 | 41,0 | 24,3 | 12,1 | 36,5 | 52 |
| Suisse alémanique | 78,0 | 72,7 | 83,3 | 43,0 | 36,7 | 49,3 | 39,7 | 33,5 | 45,9 | 319 |
| Suisse romande | 54,5 | 46,8 | 62,3 | 46,2 | 38,5 | 53,9 | 40,8 | 33,1 | 48,5 | 222 |
| Suisse italienne | 40,9 | 30,8 | 51,1 | 42,2 | 32,2 | 52,2 | 50,6 | 40,6 | 60,6 | 121 |
| VD | 56,4 | 46,6 | 66,2 | 47,6 | 37,8 | 57,5 | 43,1 | 33,2 | 52,9 | 116 |
| CH sans VD | 71,7 | 67,1 | 76,2 | 43,3 | 38,1 | 48,6 | 40,3 | 35,2 | 45,5 | 546 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1300 : Au cours des deux dernières années, avez-vous été admis/e dans un hôpital pour au moins une nuitée ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.99 Hospitalisation au cours des deux dernières années, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| DE | 39,3 | 35,5 | 43,2 | 59,9 | 56,0 | 63,8 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 751 |
| NO | 32,6 | 28,5 | 36,6 | 66,9 | 62,8 | 71,0 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 750 |
| CH | 31,9 | 29,6 | 34,2 | 68,0 | 65,7 | 70,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 3238 |
| AU | 29,4 | 26,0 | 32,8 | 70,3 | 66,9 | 73,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 2500 |
| SE | 28,1 | 26,8 | 29,4 | 71,4 | 70,1 | 72,8 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 7000 |
| US | 28,0 | 24,9 | 31,1 | 71,7 | 68,6 | 74,8 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1392 |
| NL | 26,8 | 23,4 | 30,3 | 73,1 | 69,6 | 76,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 750 |
| NZ | 25,6 | 21,1 | 30,2 | 74,4 | 69,8 | 78,9 | . | . | . | 500 |
| UK | 22,5 | 19,2 | 25,8 | 77,2 | 73,9 | 80,5 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 753 |
| CA | 22,1 | 20,5 | 23,7 | 77,6 | 75,9 | 79,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 4549 |
| FR | 15,8 | 13,0 | 18,7 | 84,0 | 81,1 | 86,9 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.100 Hospitalisation au cours des deux dernières années, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| DE | 35,5 | 30,5 | 40,5 | 63,8 | 58,7 | 68,8 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 547 |
| NO | 35,1 | 30,5 | 39,8 | 64,6 | 60,0 | 69,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 651 |
| CH | 31,8 | 28,4 | 35,3 | 67,5 | 64,0 | 71,0 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 1084 |
| AU | 30,5 | 25,0 | 36,0 | 69,5 | 64,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1670 |
| US | 29,1 | 25,7 | 32,5 | 70,6 | 67,2 | 74,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1116 |
| SE | 28,6 | 26,8 | 30,3 | 71,1 | 69,3 | 72,9 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 5000 |
| NL | 26,3 | 21,7 | 30,9 | 72,8 | 68,1 | 77,5 | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 582 |
| NZ | 25,8 | 19,8 | 31,9 | 73,7 | 67,7 | 79,7 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 379 |
| CA | 23,0 | 21,0 | 25,0 | 76,7 | 74,6 | 78,7 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 3147 |
| UK | 18,4 | 14,7 | 22,1 | 81,6 | 77,9 | 85,3 | . | . | . | 581 |
| FR | 17,2 | 14,3 | 20,0 | 82,8 | 79,9 | 85,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 860 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.101 Hospitalisation au cours des deux dernières années, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 31,9 | 29,6 | 34,2 | 68,0 | 65,7 | 70,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 3238 |
| Homme | 37,6 | 34,1 | 41,1 | 62,4 | 58,9 | 65,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1526 |
| Femme | 27,4 | 24,3 | 30,4 | 72,5 | 69,5 | 75,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1712 |
| 65–69 ans | 30,5 | 26,1 | 34,9 | 69,4 | 65,0 | 73,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 828 |
| 70–74 ans | 29,3 | 25,1 | 33,6 | 70,6 | 66,3 | 74,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 954 |
| 75–79 ans | 35,8 | 30,7 | 41,0 | 64 | 58,9 | 69,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 697 |
| 80+ ans | 32,7 | 27,9 | 37,4 | 67,3 | 62,5 | 72,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 29,9 | 25,2 | 34,6 | 70,1 | 65,4 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 706 |
| Secondaire II | 33,3 | 30,3 | 36,3 | 66,7 | 63,6 | 69,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1765 |
| Tertiaire | 27,8 | 23,1 | 32,5 | 72,2 | 67,5 | 76,9 | . | . | . | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 31,6 | 29,0 | 34,3 | 68,3 | 65,7 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 32,6 | 28,1 | 37,2 | 67,1 | 62,6 | 71,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 807 |
| Né en Suisse | 31,4 | 28,7 | 34,0 | 68,6 | 65,9 | 71,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2217 |
| Né à l'étranger | 33,4 | 28,7 | 38,1 | 66,4 | 61,7 | 71,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 1015 |
| Medical Home | 40,4 | 36,5 | 44,3 | 59,6 | 55,7 | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1249 |
| Sans Medical Home | 30,1 | 24,9 | 35,2 | 69,8 | 64,7 | 74,9 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 726 |
| Malade | 47,4 | 42,8 | 52,0 | 52,6 | 48,0 | 57,2 | . | . | . | 948 |
| Non-malade | 24,9 | 22,3 | 27,5 | 75,0 | 72,4 | 77,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 47,0 | 40,5 | 53,6 | 53,0 | 46,4 | 59,5 | . | . | . | 463 |
| Malade sans Medical Home | 47,2 | 36,4 | 58,0 | 52,8 | 42,0 | 63,6 | . | . | . | 210 |
| Ville | 30,5 | 26,3 | 34,7 | 69,5 | 65,2 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1026 |
| Agglomération | 32,4 | 29,0 | 35,7 | 67,5 | 64,2 | 70,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1643 |
| Zone rurale | 32,5 | 27,2 | 37,8 | 67,3 | 62,0 | 72,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 454 |
| Suisse alémanique | 31,9 | 28,9 | 35,0 | 68,1 | 65,0 | 71,1 | . | . | . | 1040 |
| Suisse romande | 31,9 | 28,8 | 35,1 | 67,8 | 64,6 | 70,9 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1869 |
| Suisse italienne | 31,2 | 26,0 | 36,4 | 68,5 | 63,2 | 73,7 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 329 |
| ZH | 31,3 | 26,2 | 36,5 | 68,7 | 63,5 | 73,8 | . | . | . | 332 |
| CH sans ZH | 32,0 | 29,4 | 34,6 | 67,9 | 65,3 | 70,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2906 |
| VD | 30,9 | 25,6 | 36,1 | 68,4 | 63,1 | 73,6 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 324 |
| CH sans VD | 32,0 | 29,5 | 34,5 | 68,0 | 65,5 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2914 |
| VS | 32,9 | 27,3 | 38,5 | 67,1 | 61,5 | 72,7 | . | . | . | 321 |
| CH sans VS | 31,8 | 29,4 | 34,2 | 68,1 | 65,7 | 70,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2917 |
| GE | 28,8 | 26,0 | 31,6 | 71,1 | 68,3 | 73,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1160 |
| CH sans GE | 32,1 | 29,6 | 34,5 | 67,8 | 65,4 | 70,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.102 Hospitalisation au cours des deux dernières années, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 31,8 | 28,4 | 35,3 | 67,5 | 64 | 71 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 1084 |
| Homme | 37,6 | 32,1 | 43,1 | 61,3 | 55,7 | 67,0 | 1,1 | 0,0 | 3,2 | 493 |
| Femme | 27,5 | 23,1 | 31,9 | 72,0 | 67,6 | 76,4 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 591 |
| 65–69 ans | 30,1 | 23,9 | 36,4 | 68,0 | 61,5 | 74,6 | 1,8 | 0,0 | 5,0 | 349 |
| 70–74 ans | 30,7 | 24,1 | 37,3 | 68,9 | 62,3 | 75,5 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 300 |
| 75–79 ans | 33,4 | 25,7 | 41,1 | 66,6 | 58,9 | 74,3 | . | . | . | 209 |
| 80+ ans | 33,5 | 26,2 | 40,8 | 66,1 | 58,8 | 73,4 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 25,2 | 18,4 | 32,1 | 72,7 | 65,3 | 80,1 | 2,1 | 0,0 | 6,1 | 216 |
| Secondaire II | 33,0 | 28,6 | 37,5 | 66,7 | 62,3 | 71,1 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 628 |
| Tertiaire | 37,5 | 28,9 | 46,1 | 61,8 | 53,2 | 70,3 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 33,4 | 25,1 | 41,7 | 66,6 | 58,3 | 74,9 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 38,3 | 29,7 | 46,9 | 61,7 | 53,1 | 70,3 | . | . | . | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 30,0 | 25,7 | 34,4 | 68,8 | 64,4 | 73,3 | 1,1 | 0,0 | 2,6 | 645 |
| Né en Suisse | 32,0 | 28,3 | 35,8 | 67,8 | 64,0 | 71,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 863 |
| Né à l'étranger | 31,1 | 22,4 | 39,9 | 65,8 | 56,6 | 75,0 | 3,0 | 0,0 | 8,1 | 220 |
| Ville | 28,9 | 22,2 | 35,5 | 68,7 | 61,7 | 75,7 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 293 |
| Agglomération | 31,5 | 26,6 | 36,5 | 68,3 | 63,4 | 73,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 540 |
| Zone rurale | 35,6 | 28,5 | 42,6 | 64,4 | 57,4 | 71,5 | . | . | . | 251 |
| Medical Home | 47,0 | 40,7 | 53,2 | 52,8 | 46,5 | 59,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 392 |
| Sans Medical Home | 25,5 | 17,5 | 33,5 | 71,1 | 62,2 | 79,9 | 3,4 | 0,0 | 9,0 | 180 |
| Malade | 41,8 | 34,8 | 48,8 | 57,5 | 50,5 | 64,5 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 305 |
| Non-malade | 28,1 | 24,1 | 32,0 | 71,2 | 67,1 | 75,2 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 52,0 | 41,5 | 62,5 | 47,3 | 36,8 | 57,8 | 0,7 | 0,0 | 2,2 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 35,5 | 20,1 | 50,9 | 61,9 | 46,0 | 77,8 | 2,6 | 0,0 | 7,7 | 52 |
| Suisse alémanique | 32,9 | 28,4 | 37,4 | 66,2 | 61,7 | 70,8 | 0,9 | 0,0 | 2,2 | 551 |
| Suisse romande | 27,2 | 22,0 | 32,4 | 72,4 | 67,2 | 77,6 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 355 |
| Suisse italienne | 37,7 | 29,6 | 45,8 | 62,3 | 54,2 | 70,4 | . | . | . | 178 |
| VD | 32,9 | 25,2 | 40,6 | 67,1 | 59,4 | 74,8 | . | . | . | 178 |
| CH sans VD | 31,7 | 28,0 | 35,4 | 67,5 | 63,7 | 71,2 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1310 : Lors de votre sortie d'hôpital, ... ?

- Avez-vous reçu des informations écrites sur quoi faire dès votre retour au domicile et sur les symptômes que vous devez surveiller. (A1)
- Est-ce que l'hôpital a pris des arrangements ou s'est assuré que vous aviez des soins de suivi avec un médecin ou un autre professionnel de santé. (A2)
- Est-ce que quelqu'un vous a expliqué les raisons de prendre chacun de vos médicaments. (A3)
- Saviez-vous qui contacter en cas de questions sur votre état de santé ou votre traitement. (A4)

Base : Répondants admis à l'hôpital au cours des deux dernières années, non concernés exclus (A2 et A3).

Tableau 6.103 Suivi des soins à la sortie de l'hôpital, comparaison internationale (2017, en %)

| Pays | A reçu des informations écrites sur quoi faire dès le retour au domicile et sur les symptômes à surveiller | | | L'hôpital s'est assuré du suivi des soins | | | Les raisons de prendre chacun des médicaments ont été expliquées | | | Dispose d'une personne de contact en cas de questions sur l'état de santé ou le traitement | | | Au moins une lacune dans les dispositions prises à la sortie de l'hôpital (A1 ou A2 ou A3 ou A4) | | | Échantillon n | | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------------------|----------------|--|------|------------------|--|----------------|------|--|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | | | | |
| US | 91,3 | 87,7 | 95,0 | NZ | 91,8 | 86,5 | 97,2 | NZ | 83,9 | 75,7 | 92,0 | CH | 94,1 | 92,1 | 96,1 | NL | 70,7 | 63,9 | 77,5 | 193 |
| NZ | 90,6 | 85,0 | 96,2 | AU | 90,9 | 86,9 | 94,8 | US | 78,4 | 73,0 | 83,8 | US | 92,5 | 88,7 | 96,3 | NO | 70,3 | 63,5 | 77,2 | 234 |
| FR | 83,9 | 77,4 | 90,5 | US | 85,5 | 80,8 | 90,1 | AU | 71,9 | 65,9 | 78,0 | DE | 92,2 | 89,1 | 95,3 | SE | 59,1 | 56,4 | 61,8 | 1956 |
| AU | 79,4 | 73,9 | 84,8 | CH | 84,1 | 80,9 | 87,3 | CH | 71,4 | 67,4 | 75,4 | CA | 89,6 | 87,4 | 91,8 | UK | 50,7 | 42,4 | 59,1 | 170 |
| CA | 77,6 | 74,3 | 81,0 | CA | 77,1 | 73,5 | 80,6 | CA | 67,3 | 63,6 | 71,0 | NZ | 89,4 | 82,9 | 96,0 | FR | 50,5 | 40,6 | 60,4 | 115 |
| DE | 76,2 | 71,0 | 81,3 | DE | 74,1 | 68,8 | 79,4 | UK | 64,2 | 56,4 | 72,1 | NL | 87,6 | 82,7 | 92,5 | DE | 49,2 | 42,9 | 55,5 | 299 |
| UK | 72,4 | 65,1 | 79,7 | UK | 72,9 | 65,6 | 80,3 | DE | 63,2 | 57,1 | 69,2 | UK | 87,6 | 82,7 | 92,6 | CH | 46,5 | 42,1 | 50,9 | 995 |
| NO | 66,3 | 59,2 | 73,5 | FR | 72,6 | 64 | 81,2 | SE | 60,3 | 57,6 | 63,0 | AU | 86,0 | 81,4 | 90,6 | CA | 44,3 | 40,2 | 48,5 | 989 |
| CH | 65,6 | 61,4 | 69,8 | NO | 71,9 | 65,1 | 78,8 | NL | 59,0 | 51,5 | 66,5 | FR | 83,4 | 76,4 | 90,5 | AU | 29,9 | 23,7 | 36,1 | 678 |
| NL | 61,7 | 54,3 | 69,0 | SE | 62,2 | 59,4 | 64,9 | FR | 58,3 | 48,6 | 67,9 | SE | 80,5 | 78,3 | 82,7 | US | 28,9 | 22,9 | 34,9 | 380 |
| SE | 55,1 | 52,4 | 57,9 | NL | 45,3 | 37,7 | 52,8 | NO | 51,9 | 44,3 | 59,5 | NO | 71,4 | 64,7 | 78,2 | NZ | 25,4 | 16,2 | 34,7 | 119 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.104 Suivi des soins à la sortie de l'hôpital, comparaison internationale (2014, en %)

| Pays | A reçu des informations écrites sur quoi faire dès le retour au domicile et sur les symptômes à surveiller | | | L'hôpital s'est assuré du suivi des soins | | | Les raisons de prendre chacun des médicaments ont été expliquées | | | Dispose d'une personne de contact en cas de questions sur l'état de santé ou le traitement | | | Au moins une lacune dans les dispositions prises à la sortie de l'hôpital (A1 ou A2 ou A3 ou A4) | | | Échantillon n | | | | |
|------|--|----------------|----------------|---|------------------|----------------|--|------|------------------|--|----------------|------|--|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | | | | |
| US | 89,3 | 84,7 | 94,0 | NZ | 94,6 | 90,2 | 99,0 | US | 78,1 | 72,0 | 84,3 | US | 94,4 | 91,5 | 97,3 | NO | 70,0 | 62,4 | 77,6 | 201 |
| NZ | 88,9 | 82,3 | 95,4 | US | 87,5 | 83,6 | 91,5 | AU | 73,6 | 63,9 | 83,3 | NZ | 92,5 | 87,4 | 97,5 | SE | 66,5 | 63,1 | 70,0 | 1388 |
| AU | 76,1 | 67,4 | 84,8 | UK | 85,5 | 77,7 | 93,3 | UK | 73,4 | 63,3 | 83,4 | CH | 90,3 | 86,2 | 94,5 | NL | 58,7 | 48,6 | 68,9 | 153 |
| UK | 73,0 | 62,5 | 83,5 | AU | 84,1 | 77,1 | 91,2 | CH | 73,0 | 66,9 | 79,1 | CA | 88,3 | 85,5 | 91,1 | DE | 56,1 | 47,5 | 64,6 | 204 |
| FR | 72,0 | 63,9 | 80,2 | CH | 81,6 | 75,7 | 87,4 | CA | 72,0 | 67,6 | 76,3 | NL | 84,5 | 77,9 | 91,1 | CH | 55,5 | 49,1 | 62,0 | 358 |
| CA | 71,5 | 66,9 | 76,1 | CA | 78,1 | 73,8 | 82,3 | NL | 71,3 | 61,3 | 81,3 | AU | 84,1 | 76,0 | 92,2 | FR | 54,5 | 45,4 | 63,6 | 171 |
| DE | 68,9 | 60,8 | 76,9 | FR | 75,4 | 67,9 | 83,0 | NZ | 69,7 | 58,1 | 81,3 | FR | 82,9 | 76,0 | 89,7 | CA | 43,6 | 38,7 | 48,5 | 695 |
| NL | 66,7 | 57,3 | 76,0 | NO | 72,4 | 64,8 | 80,0 | DE | 66,0 | 57,3 | 74,6 | DE | 82,6 | 75,8 | 89,3 | AU | 40,9 | 30,0 | 51,7 | 442 |
| CH | 55,6 | 49,0 | 62,2 | DE | 69,4 | 61,2 | 77,7 | FR | 63,5 | 54,8 | 72,2 | SE | 82,5 | 79,7 | 85,4 | UK | 37,8 | 27,1 | 48,6 | 105 |
| SE | 54,3 | 50,7 | 58,0 | NL | 68,4 | 58,7 | 78,1 | SE | 55,4 | 51,7 | 59,0 | UK | 81,2 | 73,1 | 89,4 | NZ | 31,7 | 20,4 | 42,9 | 94 |
| NO | 49,8 | 41,3 | 58,2 | SE | 67,9 | 64,4 | 71,3 | NO | 52,5 | 43,9 | 61,1 | NO | 69,5 | 61,6 | 77,3 | US | 27,7 | 21,3 | 34,0 | 325 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.105 Suivi des soins à la sortie de l'hôpital, Suisse (2017, en %)

| | A reçu des informations écrites sur quoi faire dès le retour au domicile et sur les symptômes à surveiller | | | L'hôpital s'est assuré du suivi des soins | | | Les raisons de prendre chacun des médicaments ont été expliquées | | | Dispose d'une personne de contact en cas de questions sur l'état de santé ou le traitement | | | Au moins une lacune dans les dispositions prises à la sortie de l'hôpital (A1 ou A2 ou A3 ou A4) | | | Échantillon n |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 65,6 | 61,4 | 69,8 | 84,1 | 80,9 | 87,3 | 71,4 | 67,4 | 75,4 | 94,1 | 92,1 | 96,1 | 46,5 | 42,1 | 50,9 | 995 |
| Homme | 64,1 | 58,3 | 69,8 | 86,2 | 82,3 | 90,1 | 73,7 | 68,5 | 78,8 | 96,1 | 94,3 | 98,0 | 45,4 | 39,4 | 51,3 | 547 |
| Femme | 67,2 | 61,1 | 73,4 | 81,8 | 76,7 | 86,8 | 68,9 | 62,8 | 75,0 | 91,9 | 88,3 | 95,5 | 47,7 | 41,2 | 54,2 | 448 |
| 65-69 ans | 71,1 | 63,3 | 78,9 | 91,6 | 87,2 | 95,9 | 75,6 | 68,1 | 83,2 | 95,8 | 92,7 | 99,0 | 38,9 | 30,4 | 47,4 | 234 |
| 70-74 ans | 67,1 | 58,7 | 75,4 | 84,8 | 78,9 | 90,7 | 74,8 | 67,2 | 82,4 | 96,7 | 94,0 | 99,3 | 44,1 | 35,4 | 52,7 | 260 |
| 75-79 ans | 64,2 | 55,5 | 72,9 | 78,4 | 70,7 | 86 | 71,5 | 63,3 | 79,7 | 91,7 | 86,5 | 96,9 | 48,3 | 39,2 | 57,3 | 240 |
| 80+ ans | 59,6 | 50,9 | 68,3 | 80,8 | 74 | 87,7 | 63,7 | 55,3 | 72,1 | 92,1 | 87,8 | 96,5 | 55,1 | 46,3 | 63,8 | 261 |
| Scolarité obligatoire | 63,5 | 54,4 | 72,6 | 81,4 | 74,1 | 88,6 | 71,0 | 62,5 | 79,5 | 94,5 | 90,7 | 98,3 | 50,1 | 40,8 | 59,4 | 216 |
| Secondaire II | 66,8 | 61,5 | 72,1 | 85,7 | 81,9 | 89,6 | 72,6 | 67,6 | 77,6 | 94,1 | 91,6 | 96,6 | 45,2 | 39,6 | 50,8 | 556 |
| Tertiaire | 63,4 | 53,9 | 72,8 | 82,7 | 75,7 | 89,7 | 66,4 | 57,2 | 75,6 | 95,4 | 92,0 | 98,7 | 44,6 | 35,0 | 54,1 | 217 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 64,9 | 60,0 | 69,9 | 85,6 | 82,1 | 89,2 | 73,7 | 69,1 | 78,2 | 95,2 | 93,0 | 97,3 | 45,6 | 40,5 | 50,7 | 728 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 67,4 | 59,4 | 75,4 | 79,8 | 73,0 | 86,6 | 65,1 | 57,0 | 73,2 | 91,1 | 86,5 | 95,6 | 49,0 | 40,5 | 57,5 | 267 |
| Né en Suisse | 64,4 | 59,5 | 69,3 | 85,1 | 81,5 | 88,7 | 70,8 | 66,1 | 75,4 | 94,3 | 91,9 | 96,6 | 47,5 | 42,4 | 52,6 | 686 |
| Né à l'étranger | 69,0 | 61,0 | 77,0 | 80,3 | 73,6 | 87,0 | 73,7 | 66,2 | 81,3 | 93,5 | 89,7 | 97,2 | 42,9 | 34,3 | 51,5 | 306 |
| Medical Home | 66,3 | 60,3 | 72,4 | 87,5 | 83,4 | 91,5 | 73,8 | 68,2 | 79,5 | 94,8 | 92,0 | 97,6 | 55,1 | 48,8 | 61,3 | 491 |
| Sans Medical Home | 65,9 | 56,3 | 75,6 | 85,1 | 78,7 | 91,5 | 70,4 | 61,4 | 79,3 | 89,1 | 82,9 | 95,3 | 49,5 | 39,3 | 59,7 | 218 |
| Malade | 63,4 | 56,6 | 70,1 | 84,8 | 79,8 | 89,7 | 67,4 | 60,9 | 74,0 | 94,0 | 91,0 | 96,9 | 48,3 | 41,5 | 55,2 | 422 |
| Non-malade | 66,1 | 60,4 | 71,7 | 83,8 | 79,5 | 88,1 | 74,1 | 68,9 | 79,3 | 94,0 | 91,1 | 96,9 | 56,4 | 50,5 | 62,3 | 528 |
| Malade avec Medical Home | 64,7 | 55,4 | 74,0 | 85,6 | 79,0 | 92,1 | 69,0 | 60,1 | 77,9 | 93,3 | 88,7 | 97,8 | 47,9 | 38,4 | 57,4 | 221 |
| Malade sans Medical Home | 52,8 | 0,2 | 100,0 | 89,3 | 80,8 | 97,9 | 68,5 | 53,9 | 83,1 | 93,9 | 88,2 | 99,7 | 50,8 | 34,7 | 67,0 | 97 |
| Ville | 63,0 | 54,9 | 71,1 | 79,8 | 72,8 | 86,7 | 70,2 | 62,5 | 77,9 | 93,0 | 88,6 | 97,4 | 54,2 | 46,1 | 62,3 | 307 |
| Agglomération | 66,6 | 60,5 | 72,6 | 86,2 | 82,3 | 90,1 | 75,1 | 69,8 | 80,4 | 95,5 | 93,1 | 97,9 | 42,6 | 36,3 | 48,9 | 513 |
| Zone rurale | 68,1 | 59,0 | 77,3 | 82,6 | 74,9 | 90,3 | 66,3 | 57,0 | 75,7 | 92,5 | 87,5 | 97,4 | 43,6 | 33,9 | 53,3 | 148 |
| Suisse alémanique | 64,8 | 59,3 | 70,4 | 84,6 | 80,3 | 88,8 | 71,4 | 66,1 | 76,7 | 95,0 | 92,5 | 97,6 | 47,5 | 41,6 | 53,3 | 331 |
| Suisse romande | 65,8 | 59,9 | 71,7 | 81,5 | 77,2 | 85,8 | 71,4 | 65,9 | 77,0 | 91,2 | 87,6 | 94,8 | 45,9 | 39,8 | 51,9 | 560 |
| Suisse italienne | 74,0 | 65,4 | 82,7 | 89,1 | 82,7 | 95,5 | 71,5 | 62,5 | 80,5 | 94,8 | 90,5 | 99,0 | 36,8 | 27,2 | 46,4 | 104 |
| ZH | 69,4 | 60,2 | 78,6 | 80,5 | 72,6 | 88,4 | 76,4 | 68,0 | 84,8 | 93,3 | 87,8 | 98,7 | 42,2 | 32,3 | 52,0 | 106 |
| CH sans ZH | 64,8 | 60,1 | 69,5 | 84,8 | 81,4 | 88,3 | 70,4 | 65,9 | 74,9 | 94,3 | 92,1 | 96,4 | 47,4 | 42,5 | 52,2 | 889 |
| VD | 62,8 | 52,9 | 72,8 | 79,0 | 70,5 | 87,4 | 70,1 | 60,7 | 79,6 | 91,3 | 85,5 | 97,1 | 54,4 | 44,1 | 64,6 | 100 |
| CH sans VD | 65,8 | 61,3 | 70,3 | 84,6 | 81,2 | 87,9 | 71,5 | 67,3 | 75,8 | 94,4 | 92,3 | 96,5 | 45,8 | 41,1 | 50,5 | 895 |
| VS | 69,3 | 59,4 | 79,1 | 86,0 | 78,6 | 93,3 | 68,0 | 58,2 | 77,8 | 93,1 | 88,4 | 97,9 | 41,0 | 30,5 | 51,5 | 103 |
| CH sans VS | 65,4 | 61,0 | 69,8 | 84,0 | 80,7 | 87,3 | 71,6 | 67,4 | 75,7 | 94,1 | 92,1 | 96,2 | 46,7 | 42,2 | 51,3 | 892 |
| GE | 63,5 | 58,0 | 68,9 | 74,1 | 69,2 | 79,0 | 66,7 | 61,5 | 72,0 | 89,0 | 85,5 | 92,4 | 48,3 | 42,5 | 54,0 | 334 |
| CH sans GE | 65,7 | 61,3 | 70,1 | 84,6 | 81,3 | 87,9 | 71,7 | 67,5 | 75,8 | 94,4 | 92,3 | 96,5 | 46,4 | 41,8 | 51,0 | 661 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.106 Suivi des soins à la sortie de l'hôpital, Suisse (2014, en %)

| | A reçu des informations écrites sur quoi faire dès le retour au domicile et sur les symptômes à surveiller | | | L'hôpital s'est assuré du suivi des soins | | | Les raisons de prendre chacun des médicaments ont été expliquées | | | Dispose d'une personne de contact en cas de questions sur l'état de santé ou le traitement | | | Au moins une lacune dans les dispositions prises à la sortie de l'hôpital (A1 ou A2 ou A3 ou A4) | | | Échantillon n |
|--------------------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | |
| Total | 55,6 | 49,0 | 62,2 | 81,6 | 75,7 | 87,4 | 73,0 | 66,9 | 79,1 | 90,3 | 86,2 | 94,5 | 55,5 | 49,0 | 62,0 | 358 |
| Homme | 61,5 | 52,2 | 70,8 | 85,8 | 78,5 | 93,0 | 73,2 | 65,0 | 81,4 | 92,0 | 87,3 | 96,6 | 48,1 | 38,9 | 57,3 | 184 |
| Femme | 49,6 | 40,2 | 58,9 | 77,4 | 68,3 | 86,4 | 72,7 | 63,7 | 81,8 | 88,7 | 81,9 | 95,5 | 63,1 | 54,3 | 71,9 | 174 |
| 65-69 ans | 53,2 | 40,5 | 65,9 | 86,0 | 75,0 | 97,1 | 82,2 | 73,3 | 91,1 | 92,6 | 86,6 | 98,5 | 50,5 | 38,0 | 63,0 | 111 |
| 70-74 ans | 59,9 | 46,4 | 73,4 | 81,8 | 69,8 | 93,7 | 79,0 | 69,1 | 88,9 | 88,7 | 81,5 | 96,0 | 53,5 | 40,5 | 66,5 | 92 |
| 75-79 ans | 51,2 | 37,0 | 65,5 | 78,1 | 64,5 | 91,7 | 68,1 | 52,9 | 83,3 | 86,9 | 74,4 | 99,4 | 57,2 | 43,2 | 71,2 | 73 |
| 80+ ans | 58,2 | 45,7 | 70,8 | 79,6 | 69,0 | 90,2 | 62,1 | 49,2 | 75,1 | 92,6 | 86,6 | 98,6 | 61,2 | 48,9 | 73,5 | 82 |
| Scolarité obligatoire | 55,1 | 40,1 | 70,1 | 85,6 | 75,4 | 95,7 | 69,1 | 55,0 | 83,2 | 90,5 | 83,6 | 97,4 | 63,3 | 48,8 | 77,7 | 61 |
| Secondaire II | 54,2 | 45,9 | 62,6 | 80,0 | 72,1 | 87,8 | 72,8 | 65,0 | 80,7 | 88,9 | 83,2 | 94,6 | 57,6 | 49,5 | 65,7 | 214 |
| Tertiaire | 64,2 | 47,7 | 80,8 | 84,7 | 74,6 | 94,8 | 80,3 | 69,0 | 91,6 | 96,3 | 91,3 | 100,0 | 36,5 | 22,8 | 50,3 | 79 |
| Revenu sup. à la moyenne | 72,1 | 59,5 | 84,7 | 84,3 | 74,8 | 93,9 | 71,3 | 57,5 | 85,2 | 87,4 | 78,8 | 96,0 | 42,3 | 27,9 | 56,6 | 63 |
| Revenu dans la moyenne | 54,5 | 39,3 | 69,6 | 69,5 | 52,6 | 86,5 | 69,9 | 55,2 | 84,6 | 89,2 | 76,4 | 100,0 | 62,1 | 48,6 | 75,5 | 78 |
| Revenu inf. à la moyenne | 52,4 | 43,7 | 61,0 | 85,4 | 79,0 | 91,8 | 75,3 | 67,9 | 82,7 | 91,0 | 86,5 | 95,6 | 56,7 | 48,1 | 65,3 | 202 |
| Né en Suisse | 57,7 | 50,8 | 64,7 | 82,7 | 77,1 | 88,4 | 74,6 | 68,4 | 80,8 | 91,4 | 87,9 | 94,9 | 53,3 | 46,3 | 60,3 | 296 |
| Né à l'étranger | 45,7 | 28,4 | 63,0 | 76,0 | 56,3 | 95,6 | 65,4 | 46,9 | 83,8 | 85,5 | 69,5 | 100,0 | 65,8 | 49,9 | 81,7 | 62 |
| Ville | 58,7 | 45,1 | 72,4 | 82,4 | 70,1 | 94,7 | 68,7 | 54,5 | 82,9 | 86,8 | 75,0 | 98,6 | 53,7 | 40,3 | 67,1 | 90 |
| Agglomération | 57,4 | 47,6 | 67,1 | 81,4 | 73,0 | 89,8 | 76,2 | 68,0 | 84,5 | 93,7 | 89,5 | 98,0 | 53,8 | 44,3 | 63,4 | 173 |
| Zone rurale | 49,9 | 37,8 | 62,0 | 81,2 | 70,2 | 92,2 | 71,1 | 60,0 | 82,2 | 87,6 | 80,2 | 95,0 | 60,0 | 48,2 | 71,8 | 95 |
| Medical Home | 59,7 | 50,2 | 69,2 | 87,7 | 80,6 | 94,8 | 85,4 | 79,3 | 91,5 | 96,8 | 94,3 | 99,3 | 50,6 | 41,2 | 60,0 | 181 |
| Sans Medical Home | 34,6 | 18,6 | 50,5 | 69,8 | 49,9 | 89,8 | 33,3 | 18,2 | 48,4 | 66,6 | 47,4 | 85,9 | 83,0 | 72,3 | 93,6 | 52 |
| Malade | 53,4 | 42,7 | 64,1 | 84,1 | 75,1 | 93,0 | 72,0 | 62,6 | 81,4 | 95,3 | 91,9 | 98,8 | 55,9 | 45,4 | 66,4 | 136 |
| Non-malade | 56,6 | 48,2 | 65,1 | 80,0 | 72,4 | 87,7 | 73,4 | 65,3 | 81,5 | 87,5 | 81,4 | 93,5 | 55,6 | 47,3 | 63,9 | 221 |
| Malade avec Medical Home | 59,5 | 44,8 | 74,2 | 93,9 | 88,9 | 99,0 | 77,5 | 66,2 | 88,9 | 96,7 | 93,0 | 100,0 | 52,5 | 38,0 | 67,0 | 75 |
| Malade sans Medical Home | 30,4 | 10,7 | 50,1 | 81,8 | 60,6 | 100,0 | 59,3 | 34,9 | 83,8 | 96,3 | 91,2 | 100,0 | 75,5 | 56,6 | 94,4 | 24 |
| Suisse alémanique | 56,7 | 48,3 | 65,1 | 81,3 | 73,8 | 88,9 | 75,0 | 67,3 | 82,7 | 90,0 | 84,6 | 95,3 | 52,3 | 44,0 | 60,6 | 185 |
| Suisse romande | 46,0 | 35,1 | 56,9 | 83,1 | 74,5 | 91,7 | 65,1 | 54,4 | 75,8 | 90,3 | 84,5 | 96,2 | 67,6 | 57,4 | 77,8 | 106 |
| Suisse italienne | 73,4 | 61,2 | 85,6 | 79,0 | 68,7 | 89,3 | 74,6 | 60,7 | 88,5 | 94,9 | 89,8 | 100,0 | 54,6 | 40,9 | 68,4 | 67 |
| VD | 37,6 | 24,2 | 51,1 | 78,1 | 64,0 | 92,2 | 61,0 | 46,5 | 75,5 | 86,9 | 77,5 | 96,2 | 72,3 | 60,2 | 84,5 | 58 |
| CH sans VD | 57,3 | 50,2 | 64,4 | 81,9 | 75,6 | 88,2 | 74,1 | 67,6 | 80,6 | 90,7 | 86,3 | 95,1 | 53,9 | 46,9 | 61,0 | 300 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1325 : Lors de votre sortie d'hôpital, les médecins ou le personnel de l'endroit où vous recevez généralement les soins médicaux ont-ils semblé informés et au courant des dernières informations concernant les soins que vous aviez reçu à l'hôpital ?

Base : Répondants admis à l'hôpital au cours des deux dernières années et ayant un médecin ou un lieu de traitement habituel.

Tableau 6.107 Médecin habituel informé des soins reçus à l'hôpital, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | Pas concerné | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| NZ | 89,0 | 81,5 | 96,6 | 3,0 | 0,0 | 6,7 | 3,8 | 0,0 | 9,1 | 4,1 | 0,0 | 8,8 | 118 |
| CH | 88,0 | 85,2 | 90,9 | 5,4 | 3,4 | 7,3 | 4,7 | 2,9 | 6,5 | 1,9 | 0,6 | 3,2 | 975 |
| NO | 86,3 | 81,3 | 91,3 | 5,8 | 2,6 | 9,0 | 2,8 | 0,3 | 5,3 | 5,1 | 1,8 | 8,5 | 233 |
| AU | 85,2 | 81,1 | 89,4 | 5,3 | 3,4 | 7,1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 9,1 | 5,4 | 12,9 | 676 |
| US | 83,9 | 78,8 | 89,0 | 14,0 | 9,0 | 19,0 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | 0,4 | 3,0 | 376 |
| CA | 82,6 | 79,8 | 85,5 | 10,3 | 8,0 | 12,5 | 1,7 | 0,8 | 2,7 | 5,3 | 3,8 | 6,9 | 965 |
| DE | 82,6 | 77,9 | 87,2 | 13,2 | 9,0 | 17,4 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 3,3 | 1,4 | 5,2 | 299 |
| FR | 80,7 | 73,0 | 88,4 | 15,7 | 8,6 | 22,8 | 2,3 | 0,0 | 5,4 | 1,2 | 0,0 | 3,0 | 114 |
| UK | 76,5 | 69,5 | 83,5 | 10,8 | 5,9 | 15,7 | 2,8 | 0,5 | 5,2 | 9,8 | 4,6 | 15,1 | 168 |
| NL | 67,3 | 60,1 | 74,6 | 10,1 | 5,8 | 14,5 | 4,9 | 1,3 | 8,4 | 17,7 | 11,6 | 23,7 | 191 |
| SE | 48,7 | 46,0 | 51,5 | 18,8 | 16,6 | 21,0 | 20,4 | 18,1 | 22,7 | 12,0 | 10,2 | 13,8 | 1925 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.108 Médecin habituel informé des soins reçus à l'hôpital, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | IC limite sup. | n |
| NZ | 91,0 | 85,1 | 96,8 | 8,3 | 2,6 | 14,1 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 92 |
| DE | 89,0 | 83,8 | 94,1 | 9,0 | 4,1 | 14,0 | 2,0 | 0,4 | 3,5 | 3,5 | 203 |
| NL | 87,6 | 80,7 | 94,5 | 3,6 | 0,1 | 7,0 | 8,8 | 2,6 | 15,0 | 15,0 | 145 |
| CH | 87,5 | 82,6 | 92,5 | 9,4 | 4,7 | 14,1 | 3,0 | 1,1 | 5,0 | 5,0 | 348 |
| NO | 86,7 | 80,7 | 92,7 | 7,3 | 3,3 | 11,4 | 6,0 | 1,2 | 10,8 | 10,8 | 188 |
| US | 86,3 | 81,6 | 90,9 | 11,1 | 6,8 | 15,4 | 2,6 | 0,8 | 4,5 | 4,5 | 313 |
| FR | 85,3 | 78,9 | 91,7 | 14,7 | 8,3 | 21,1 | . | . | . | . | 170 |
| AU | 82,6 | 74,8 | 90,5 | 8,8 | 3,9 | 13,7 | 8,6 | 2,1 | 15,1 | 15,1 | 437 |
| CA | 82,0 | 78,5 | 85,5 | 13,6 | 10,4 | 16,7 | 4,4 | 2,6 | 6,2 | 6,2 | 677 |
| UK | 72,9 | 62,0 | 83,8 | 10,8 | 4,0 | 17,5 | 16,3 | 6,3 | 26,3 | 26,3 | 103 |
| SE | 61,2 | 57,3 | 65,0 | 27,0 | 23,5 | 30,6 | 11,8 | 9,3 | 14,3 | 14,3 | 1213 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.109 Médecin habituel informé des soins reçus à l'hôpital, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | Pas concerné | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 88,0 | 85,2 | 90,9 | 5,4 | 3,4 | 7,3 | 4,7 | 2,9 | 6,5 | 1,9 | 0,6 | 3,2 | 975 |
| Homme | 88,5 | 84,7 | 92,3 | 5,1 | 2,5 | 7,8 | 5,1 | 2,5 | 7,6 | 1,3 | 0,0 | 2,7 | 534 |
| Femme | 87,5 | 83,2 | 91,8 | 5,6 | 2,7 | 8,6 | 4,3 | 1,8 | 6,8 | 2,6 | 0,3 | 4,8 | 441 |
| 65-69 ans | 88,6 | 83,0 | 94,2 | 4,7 | 0,9 | 8,5 | 6,3 | 2,0 | 10,7 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 227 |
| 70-74 ans | 88,8 | 83,5 | 94,1 | 4,4 | 1,0 | 7,8 | 4,4 | 1,5 | 7,3 | 2,4 | 0,0 | 5,5 | 255 |
| 75-79 ans | 89,7 | 84,2 | 95,2 | 5,7 | 1,5 | 9,9 | 3,1 | 0,3 | 5,9 | 1,4 | 0,0 | 4,0 | 236 |
| 80+ ans | 85,0 | 78,8 | 91,2 | 6,5 | 2,3 | 10,8 | 4,8 | 1,1 | 8,5 | 3,7 | 0,4 | 7,0 | 257 |
| Scolarité obligatoire | 86,5 | 79,9 | 93,1 | 3,8 | 0,4 | 7,3 | 5,6 | 1,1 | 10,1 | 4,1 | 0,1 | 8,0 | 210 |
| Secondaire II | 89,0 | 85,6 | 92,5 | 5,1 | 2,7 | 7,6 | 4,4 | 2,3 | 6,5 | 1,5 | 0,0 | 2,9 | 547 |
| Tertiaire | 87,8 | 81,5 | 94,1 | 7,8 | 2,2 | 13,4 | 3,9 | 0,8 | 7,0 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 212 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 87,8 | 84,4 | 91,2 | 5,4 | 3,1 | 7,7 | 5,0 | 2,9 | 7,1 | 1,8 | 0,2 | 3,3 | 713 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 88,5 | 83,3 | 93,8 | 5,2 | 1,5 | 9,0 | 3,9 | 0,7 | 7,1 | 2,3 | 0,0 | 4,8 | 262 |
| Né en Suisse | 87,0 | 83,5 | 90,4 | 5,7 | 3,3 | 8,1 | 5,2 | 3,0 | 7,3 | 2,2 | 0,6 | 3,8 | 678 |
| Né à l'étranger | 91,5 | 86,8 | 96,2 | 4,2 | 0,9 | 7,5 | 3,2 | 0,2 | 6,2 | 1,1 | 0,0 | 2,9 | 294 |
| Medical Home | 92,2 | 88,9 | 95,6 | 3,7 | 1,3 | 6,2 | 3,4 | 1,2 | 5,5 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 491 |
| Sans Medical Home | 79,0 | 70,3 | 87,6 | 14,0 | 6,4 | 21,6 | 6,4 | 1,6 | 11,3 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 198 |
| Malade | 89,8 | 85,7 | 93,9 | 4,7 | 2,1 | 7,4 | 3,7 | 1,1 | 6,3 | 1,8 | 0,0 | 3,7 | 416 |
| Non-malade | 86,7 | 82,7 | 90,8 | 5,7 | 2,9 | 8,5 | 5,7 | 3,1 | 8,3 | 1,9 | 0,1 | 3,6 | 515 |
| Malade avec Medical Home | 95,8 | 92,8 | 98,8 | 2,9 | 0,3 | 5,5 | 1,2 | 0,0 | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 221 |
| Malade sans Medical Home | 84,0 | 73,3 | 94,7 | 12,9 | 2,6 | 23,3 | 2,1 | 0,0 | 4,3 | 0,9 | 0,0 | 2,4 | 91 |
| Ville | 89,6 | 84,2 | 95,0 | 3,7 | 0,5 | 7,0 | 4,0 | 0,9 | 7,1 | 2,6 | 0,0 | 6,0 | 302 |
| Agglomération | 88,8 | 85,0 | 92,7 | 6,3 | 3,3 | 9,4 | 4,1 | 1,7 | 6,4 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 502 |
| Zone rurale | 85,2 | 78,2 | 92,1 | 5,4 | 0,9 | 9,9 | 6,7 | 1,8 | 11,6 | 2,8 | 0,0 | 5,8 | 145 |
| Suisse alémanique | 88,4 | 84,7 | 92,2 | 5,2 | 2,5 | 7,9 | 4,2 | 2,0 | 6,4 | 2,2 | 0,4 | 4,0 | 328 |
| Suisse romande | 86,6 | 82,6 | 90,6 | 5,7 | 3,4 | 8,0 | 6,1 | 3,0 | 9,3 | 1,6 | 0,3 | 2,8 | 547 |
| Suisse italienne | 88,9 | 82,2 | 95,6 | 5,8 | 1,3 | 10,3 | 5,3 | 0,0 | 10,5 | . | . | . | 100 |
| ZH | 87,4 | 80,6 | 94,3 | 1,4 | 0,0 | 4,0 | 9,0 | 3,1 | 14,9 | 2,2 | 0,0 | 5,2 | 105 |
| CH sans ZH | 88,1 | 85,0 | 91,3 | 6,2 | 3,9 | 8,5 | 3,8 | 2,1 | 5,6 | 1,9 | 0,4 | 3,3 | 870 |
| VD | 87,8 | 81,5 | 94,2 | 6,3 | 1,6 | 11,0 | 3,1 | 0,0 | 6,3 | 2,8 | 0,0 | 6,0 | 97 |
| CH sans VD | 88,0 | 85,0 | 91,1 | 5,3 | 3,2 | 7,4 | 4,9 | 2,9 | 6,8 | 1,8 | 0,5 | 3,2 | 878 |
| VS | 86,1 | 78,3 | 94,0 | 7,7 | 1,3 | 14,2 | 4,1 | 0,0 | 8,3 | 2,1 | 0,0 | 4,9 | 100 |
| CH sans VS | 88,1 | 85,1 | 91,1 | 5,3 | 3,2 | 7,3 | 4,7 | 2,9 | 6,6 | 1,9 | 0,6 | 3,3 | 875 |
| GE | 83,0 | 78,6 | 87,3 | 9,7 | 6,3 | 13,1 | 6,3 | 3,4 | 9,2 | 1,1 | 0,0 | 2,1 | 327 |
| CH sans GE | 88,3 | 85,3 | 91,3 | 5,1 | 3,1 | 7,2 | 4,6 | 2,8 | 6,5 | 2,0 | 0,6 | 3,3 | 648 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.110 Médecin habituel informé des soins reçus à l'hôpital, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 87,5 | 82,6 | 92,5 | 9,4 | 4,7 | 14,1 | 3,0 | 1,1 | 5,0 | 348 |
| Homme | 93,6 | 89,5 | 97,7 | 5,7 | 1,7 | 9,7 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 179 |
| Femme | 81,2 | 72,4 | 90,0 | 13,3 | 4,9 | 21,7 | 5,5 | 1,6 | 9,3 | 169 |
| 65–69 ans | 90,6 | 84,5 | 96,8 | 7,4 | 1,7 | 13 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 108 |
| 70–74 ans | 86,3 | 74,8 | 97,8 | 12,1 | 0,7 | 23,6 | 1,6 | 0,0 | 3,8 | 89 |
| 75–79 ans | 81,0 | 67,6 | 94,5 | 15,5 | 2,5 | 28,5 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 73 |
| 80+ ans | 91,5 | 84,6 | 98,4 | 3,4 | 0,0 | 8,2 | 5,1 | 0,0 | 10,3 | 78 |
| Scolarité obligatoire | 92,7 | 86,3 | 99,2 | 2,7 | 0,0 | 6,6 | 4,6 | 0,0 | 9,8 | 60 |
| Secondaire II | 85,6 | 78,7 | 92,5 | 12,4 | 5,7 | 19,2 | 1,9 | 0,1 | 3,8 | 207 |
| Tertiaire | 93,1 | 87,6 | 98,5 | 4,5 | 0,7 | 8,4 | 2,4 | 0,0 | 6,2 | 77 |
| Revenu sup. à la moyenne | 90,0 | 82,7 | 97,4 | 4,6 | 0,2 | 9,1 | 5,3 | 0,0 | 11,3 | 61 |
| Revenu dans la moyenne | 75,4 | 58,9 | 91,8 | 21,1 | 4,7 | 37,4 | 3,6 | 0,0 | 8,8 | 75 |
| Revenu inf. à la moyenne | 90,9 | 86,3 | 95,5 | 7,0 | 2,8 | 11,1 | 2,2 | 0,0 | 4,3 | 198 |
| Né en Suisse | 89,7 | 85,6 | 93,8 | 7,4 | 3,8 | 10,9 | 2,9 | 0,7 | 5,1 | 291 |
| Né à l'étranger | 76,7 | 56,8 | 96,5 | 19,6 | 0,0 | 39,7 | 3,7 | 0,0 | 8,5 | 57 |
| Ville | 88,8 | 76,6 | 100 | 10,3 | 0,0 | 22,5 | 0,9 | 0,0 | 2,2 | 84 |
| Agglomération | 87,3 | 81,2 | 93,4 | 8,5 | 3,4 | 13,7 | 4,2 | 0,7 | 7,8 | 172 |
| Zone rurale | 87,0 | 76,8 | 97,2 | 10,3 | 0,3 | 20,3 | 2,7 | 0,0 | 5,9 | 92 |
| Medical Home | 94,3 | 90,4 | 98,2 | 5,7 | 1,8 | 9,6 | . | . | . | 176 |
| Sans Medical Home | 77,1 | 56,8 | 97,3 | 20,2 | 0,0 | 40,6 | 2,8 | 0,0 | 6,8 | 50 |
| Malade | 87,8 | 79,3 | 96,2 | 10,4 | 2,1 | 18,7 | 1,8 | 0,0 | 4,1 | 133 |
| Non-malade | 87,3 | 81,1 | 93,5 | 8,9 | 3,2 | 14,7 | 3,7 | 0,9 | 6,6 | 214 |
| Malade avec Medical Home | 92,8 | 85,4 | 100,0 | 7,2 | 0,0 | 14,6 | . | . | . | 73 |
| Malade sans Medical Home | 84,1 | 63,1 | 100,0 | 15,9 | 0,0 | 36,9 | . | . | . | 23 |
| Suisse alémanique | 86,3 | 79,9 | 92,7 | 10,2 | 4,0 | 16,3 | 3,5 | 0,9 | 6,1 | 180 |
| Suisse romande | 89,3 | 83,1 | 95,6 | 8,6 | 2,8 | 14,4 | 2,1 | 0,0 | 4,6 | 102 |
| Suisse italienne | 96,6 | 92,7 | 100 | 3,4 | 0,0 | 7,3 | . | . | . | 66 |
| VD | 86,5 | 77,2 | 95,8 | 8,6 | 1,0 | 16,2 | 4,9 | 0,0 | 10,7 | 56 |
| CH sans VD | 87,6 | 82,3 | 93,0 | 9,5 | 4,4 | 14,6 | 2,9 | 0,8 | 4,9 | 292 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1328 : Après avoir quitté l'hôpital, avez-vous eu le sentiment d'avoir eu le soutien et les services dont vous aviez besoin pour gérer votre état de santé à la maison ?

Base : Répondants admis à l'hôpital au cours des deux dernières années.

Tableau 6.111 Soutien reçu à la sortie de l'hôpital pour gérer l'état de santé à la maison, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | Pas eu besoin de soutien pour gérer l'état de santé | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 91,4 | 87,4 | 95,4 | 7,9 | 3,9 | 11,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 380 |
| NZ | 89,2 | 82,1 | 96,3 | 3,9 | 0,0 | 7,8 | 3,8 | 0,0 | 8,7 | 3,1 | 0,0 | 7,2 | 119 |
| UK | 87,5 | 81,9 | 93,0 | 9,7 | 4,8 | 14,6 | 0,8 | 0,0 | 2,4 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 170 |
| AU | 86,6 | 82,7 | 90,5 | 8,9 | 5,7 | 12,2 | 2,4 | 0,5 | 4,4 | 2,0 | 1,0 | 3,1 | 678 |
| NO | 86,2 | 80,9 | 91,4 | 9,2 | 4,8 | 13,6 | 2,0 | 0,1 | 3,9 | 2,6 | 0,0 | 5,2 | 234 |
| CA | 84,6 | 81,6 | 87,7 | 10,3 | 7,7 | 12,8 | 3,0 | 1,7 | 4,2 | 2,1 | 0,7 | 3,5 | 989 |
| DE | 82,5 | 77,6 | 87,3 | 11,3 | 7,3 | 15,3 | 2,5 | 0,3 | 4,7 | 3,7 | 1,3 | 6,2 | 299 |
| FR | 81,8 | 74,4 | 89,3 | 15,2 | 8,2 | 22,2 | 2,4 | 0,0 | 5,1 | 0,6 | 0,0 | 1,8 | 115 |
| CH | 76,0 | 72,2 | 79,7 | 10,0 | 7,4 | 12,6 | 13,8 | 10,7 | 16,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 995 |
| SE | 72,9 | 70,3 | 75,4 | 12,5 | 10,6 | 14,5 | 12,7 | 10,8 | 14,6 | 1,9 | 1,1 | 2,7 | 1956 |
| NL | 70,9 | 63,9 | 77,8 | 19,6 | 13,5 | 25,7 | 8,6 | 4,2 | 12,9 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 193 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.112 Soutien reçu à la sortie de l'hôpital pour gérer l'état de santé à la maison, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | Pas eu besoin de soutien pour gérer l'état de santé | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 76,0 | 72,2 | 79,7 | 10,0 | 7,4 | 12,6 | 13,8 | 10,7 | 16,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 995 |
| Homme | 76,9 | 72,0 | 81,9 | 9,4 | 6,0 | 12,8 | 13,4 | 9,4 | 17,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 547 |
| Femme | 74,9 | 69,3 | 80,6 | 10,7 | 6,7 | 14,7 | 14,2 | 9,6 | 18,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 448 |
| 65–69 ans | 73,0 | 65,2 | 80,7 | 11,2 | 5,7 | 16,8 | 15,7 | 9,4 | 22,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 234 |
| 70–74 ans | 76,6 | 69,5 | 83,8 | 10,4 | 5,2 | 15,6 | 12,6 | 7,0 | 18,2 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 260 |
| 75–79 ans | 76,7 | 69,2 | 84,2 | 7,9 | 3,5 | 12,4 | 15,3 | 8,8 | 21,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 240 |
| 80+ ans | 77,9 | 70,6 | 85,3 | 10,4 | 5,1 | 15,7 | 11,5 | 5,6 | 17,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 261 |
| Scolarité obligatoire | 76,7 | 69,0 | 84,3 | 12,9 | 7,2 | 18,6 | 10,2 | 4,4 | 16,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 216 |
| Secondaire II | 75,2 | 70,4 | 80,1 | 10,0 | 6,6 | 13,3 | 14,8 | 10,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 556 |
| Tertiaire | 77,5 | 69,4 | 85,6 | 4,9 | 1,0 | 8,9 | 16,5 | 9,1 | 23,8 | 1,1 | 0,0 | 2,7 | 217 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 75,3 | 70,8 | 79,7 | 7,6 | 5,0 | 10,3 | 16,9 | 12,9 | 20,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 728 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 77,9 | 71,1 | 84,8 | 16,8 | 10,4 | 23,1 | 5,3 | 2,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 267 |
| Né en Suisse | 74,5 | 70,0 | 79,0 | 9,7 | 6,7 | 12,8 | 15,6 | 11,8 | 19,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 686 |
| Né à l'étranger | 80,8 | 74,9 | 86,8 | 11,3 | 6,3 | 16,3 | 7,8 | 4,3 | 11,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 306 |
| Medical Home | 81,8 | 77,2 | 86,5 | 8,4 | 5,2 | 11,6 | 9,6 | 6,0 | 13,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 491 |
| Sans Medical Home | 68,5 | 58,9 | 78,2 | 13,6 | 6,3 | 21,0 | 17,6 | 9,8 | 25,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 218 |
| Malade | 77,6 | 71,9 | 83,3 | 10,3 | 6,3 | 14,3 | 11,8 | 7,2 | 16,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 422 |
| Non-malade | 74,6 | 69,5 | 79,8 | 9,5 | 6,0 | 13,1 | 15,7 | 11,4 | 20,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 528 |
| Malade avec Medical Home | 84,1 | 77,8 | 90,3 | 6,6 | 3,0 | 10,3 | 8,8 | 3,6 | 14,1 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 221 |
| Malade sans Medical Home | 69,5 | 54,5 | 84,5 | 20,2 | 7,2 | 33,2 | 10,3 | 0,2 | 20,4 | . | . | . | 97 |
| Ville | 76,3 | 69,2 | 83,5 | 6,8 | 2,7 | 10,9 | 16,4 | 10,1 | 22,8 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 307 |
| Agglomération | 74,3 | 68,8 | 79,8 | 10,0 | 6,3 | 13,6 | 15,6 | 10,9 | 20,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 513 |
| Zone rurale | 75,5 | 67,0 | 84,1 | 15,5 | 8,2 | 22,7 | 9,0 | 3,4 | 14,6 | . | . | . | 148 |
| Suisse alémanique | 75,8 | 70,9 | 80,8 | 9,7 | 6,2 | 13,1 | 14,4 | 10,3 | 18,5 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 331 |
| Suisse romande | 77,2 | 72,0 | 82,4 | 10,1 | 6,6 | 13,7 | 12,3 | 8,1 | 16,5 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 560 |
| Suisse italienne | 72,7 | 63,8 | 81,7 | 14,3 | 7,3 | 21,2 | 13,0 | 6,2 | 19,8 | . | . | . | 104 |
| ZH | 71,8 | 62,8 | 80,8 | 11,5 | 5,0 | 18,0 | 16,1 | 8,8 | 23,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 106 |
| CH sans ZH | 76,8 | 72,7 | 80,9 | 9,7 | 6,9 | 12,6 | 13,3 | 10,0 | 16,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 889 |
| VD | 80,1 | 72,0 | 88,3 | 11,2 | 4,7 | 17,7 | 8,7 | 3,0 | 14,3 | . | . | . | 100 |
| CH sans VD | 75,6 | 71,6 | 79,6 | 9,9 | 7,1 | 12,7 | 14,3 | 11,0 | 17,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 895 |
| VS | 80,8 | 73,2 | 88,4 | 8,1 | 2,9 | 13,3 | 10,3 | 4,5 | 16,0 | 0,8 | 0,0 | 2,4 | 103 |
| CH sans VS | 75,8 | 71,9 | 79,7 | 10,1 | 7,4 | 12,8 | 14,0 | 10,8 | 17,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 892 |
| GE | 70,0 | 64,7 | 75,2 | 12,8 | 9,0 | 16,6 | 16,0 | 12,0 | 20,1 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 334 |
| CH sans GE | 76,3 | 72,4 | 80,2 | 9,9 | 7,1 | 12,6 | 13,7 | 10,5 | 16,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 661 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1330 : Combien de fois avez-vous utilisé un service d'urgence hospitalier pour vos propres soins médicaux au cours des deux dernières années ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.113 Recours aux services d'urgence au cours des deux années précédentes, comparaison internationale (2017, en %)

| | Aucune fois | | | 1 fois | | | 2 fois ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| FR | 80,6 | 77,5 | 83,7 | 9,9 | 7,6 | 12,1 | 8,4 | 6,1 | 10,6 | 1,1 | 0,3 | 2,0 | 750 |
| NL | 77,2 | 74,0 | 80,5 | 16,4 | 13,5 | 19,3 | 6,1 | 4,3 | 7,9 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 750 |
| NO | 73,6 | 69,8 | 77,5 | 18,0 | 14,7 | 21,3 | 7,9 | 5,5 | 10,2 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 750 |
| CH | 73,2 | 71,1 | 75,4 | 17,0 | 15,1 | 18,8 | 9,2 | 7,8 | 10,6 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 3238 |
| DE | 69,9 | 66,3 | 73,6 | 19,3 | 16,2 | 22,5 | 9,3 | 7,0 | 11,6 | 1,4 | 0,5 | 2,3 | 751 |
| UK | 67,0 | 63,3 | 70,8 | 17,3 | 14,3 | 20,4 | 12,8 | 10,2 | 15,5 | 2,8 | 1,5 | 4,1 | 753 |
| NZ | 65,9 | 61,0 | 70,8 | 21,2 | 17,0 | 25,3 | 12,6 | 9,0 | 16,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 500 |
| SE | 63,4 | 62,0 | 64,8 | 21,1 | 19,9 | 22,3 | 14,9 | 13,8 | 15,9 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 7000 |
| CA | 61,2 | 59,3 | 63,1 | 19,2 | 17,7 | 20,7 | 18,9 | 17,3 | 20,4 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 4549 |
| US | 60,8 | 57,5 | 64,2 | 21,8 | 19,0 | 24,7 | 16,5 | 13,9 | 19,1 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 1392 |
| AU | 57,8 | 53,9 | 61,7 | 26,0 | 22,4 | 29,6 | 15,8 | 12,9 | 18,7 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 2500 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.114 Recours aux services d'urgence au cours des deux années précédentes, comparaison internationale (2014, en %)

| | Aucune fois | | | 1 fois | | | 2 fois ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| FR | 84,3 | 81,5 | 87,1 | 10,2 | 7,9 | 12,5 | 4,2 | 2,7 | 5,8 | 1,3 | 0,5 | 2,0 | 860 |
| DE | 75,9 | 71,5 | 80,3 | 12,4 | 9,0 | 15,8 | 8,3 | 5,4 | 11,2 | 3,4 | 1,7 | 5,2 | 547 |
| UK | 74,3 | 70,2 | 78,3 | 9,2 | 6,5 | 11,9 | 8,8 | 6,1 | 11,4 | 7,8 | 5,5 | 10,0 | 581 |
| NO | 72,7 | 68,5 | 77,0 | 15,0 | 11,5 | 18,5 | 11,9 | 8,9 | 15,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 651 |
| CH | 72,6 | 69,3 | 75,9 | 19,4 | 16,5 | 22,3 | 7,8 | 5,8 | 9,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1084 |
| AU | 68,8 | 63,4 | 74,2 | 21,0 | 15,9 | 26,2 | 8,2 | 5,5 | 10,9 | 1,9 | 0,9 | 2,9 | 1670 |
| NL | 67,9 | 63,0 | 72,9 | 17,0 | 13,2 | 20,9 | 10,9 | 7,5 | 14,4 | 4,1 | 1,6 | 6,5 | 582 |
| SE | 64,5 | 62,7 | 66,4 | 20,4 | 18,8 | 22,0 | 14,2 | 12,9 | 15,6 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 5000 |
| NZ | 63,4 | 56,7 | 70,0 | 17,3 | 11,9 | 22,7 | 13,6 | 8,7 | 18,4 | 5,8 | 3,5 | 8,1 | 379 |
| US | 60,9 | 57,2 | 64,5 | 21,1 | 18,0 | 24,1 | 17,5 | 14,5 | 20,4 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1116 |
| CA | 60,8 | 58,4 | 63,1 | 20,2 | 18,2 | 22,1 | 18 | 16,2 | 19,8 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 3147 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.115 Recours aux services d'urgence au cours des deux années précédentes, Suisse (2017, en %)

| | Aucune fois | | | 1 fois | | | 2 fois ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 73,2 | 71,1 | 75,4 | 17,0 | 15,1 | 18,8 | 9,2 | 7,8 | 10,6 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 3238 |
| Homme | 71,3 | 68,0 | 74,6 | 18,4 | 15,6 | 21,2 | 10,0 | 7,9 | 12,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 1526 |
| Femme | 74,8 | 71,9 | 77,6 | 15,8 | 13,4 | 18,2 | 8,5 | 6,7 | 10,3 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 1712 |
| 65–69 ans | 74,6 | 70,5 | 78,7 | 16,8 | 13,3 | 20,2 | 8,1 | 5,5 | 10,7 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 828 |
| 70–74 ans | 74,2 | 70,1 | 78,3 | 16,5 | 13,0 | 20,0 | 9,0 | 6,3 | 11,6 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 954 |
| 75–79 ans | 74,2 | 69,6 | 78,9 | 16,5 | 12,7 | 20,4 | 8,8 | 5,7 | 11,8 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 697 |
| 80+ ans | 69,9 | 65,3 | 74,4 | 18,1 | 14,2 | 22,0 | 10,9 | 8,0 | 13,9 | 1,1 | 0,0 | 2,1 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 74,3 | 70,0 | 78,7 | 15,2 | 11,6 | 18,7 | 9,3 | 6,5 | 12,2 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 706 |
| Secondaire II | 72,3 | 69,5 | 75,2 | 17,8 | 15,4 | 20,3 | 9,5 | 7,7 | 11,3 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1765 |
| Tertiaire | 76,8 | 72,3 | 81,2 | 16,0 | 12,1 | 19,8 | 7,2 | 4,6 | 9,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 73,4 | 70,8 | 75,9 | 17,5 | 15,3 | 19,7 | 8,5 | 6,9 | 10,0 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 72,9 | 68,6 | 77,2 | 15,5 | 12,1 | 18,9 | 11,2 | 8,2 | 14,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 807 |
| Né en Suisse | 73,2 | 70,7 | 75,7 | 17,5 | 15,3 | 19,6 | 8,6 | 7,0 | 10,2 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 2217 |
| Né à l'étranger | 73,2 | 68,9 | 77,5 | 15,3 | 11,8 | 18,7 | 11,5 | 8,4 | 14,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1015 |
| Medical Home | 68,9 | 65,2 | 72,5 | 18,3 | 15,2 | 21,3 | 12,5 | 9,9 | 15,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1249 |
| Sans Medical Home | 70,1 | 65,0 | 75,2 | 19,6 | 15,2 | 24,0 | 9,6 | 6,4 | 12,8 | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 726 |
| Malade | 65,2 | 60,8 | 69,6 | 18,2 | 14,7 | 21,8 | 16,0 | 12,5 | 19,4 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 948 |
| Non-malade | 77,2 | 74,8 | 79,7 | 16,6 | 14,4 | 18,8 | 5,7 | 4,4 | 6,9 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 67,1 | 61,0 | 73,2 | 15,2 | 10,6 | 19,8 | 17,7 | 12,8 | 22,7 | . | . | . | 463 |
| Malade sans Medical Home | 61,0 | 50,3 | 71,7 | 25,4 | 15,7 | 35,0 | 13,6 | 6,0 | 21,3 | . | . | . | 210 |
| Ville | 70,0 | 65,8 | 74,1 | 19,2 | 15,7 | 22,8 | 10,2 | 7,5 | 12,9 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 1026 |
| Agglomération | 74,7 | 71,6 | 77,7 | 15,2 | 12,6 | 17,7 | 9,4 | 7,3 | 11,4 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 1643 |
| Zone rurale | 72,7 | 67,7 | 77,8 | 19,4 | 14,9 | 24,0 | 7,4 | 4,4 | 10,3 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 454 |
| Suisse alémanique | 74,7 | 71,9 | 77,6 | 16,3 | 13,9 | 18,7 | 8,3 | 6,5 | 10,1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 1040 |
| Suisse romande | 70,0 | 67,0 | 73,1 | 18,9 | 16,3 | 21,5 | 10,6 | 8,5 | 12,6 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1869 |
| Suisse italienne | 68,1 | 62,9 | 73,4 | 17,4 | 13,2 | 21,6 | 14,3 | 10,4 | 18,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 329 |
| ZH | 76,8 | 72,1 | 81,5 | 15,3 | 11,3 | 19,3 | 7,3 | 4,4 | 10,2 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 332 |
| CH sans ZH | 72,5 | 70,1 | 74,9 | 17,3 | 15,3 | 19,4 | 9,6 | 8,0 | 11,1 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 2906 |
| VD | 70,6 | 65,4 | 75,8 | 17,6 | 13,2 | 21,9 | 11,4 | 7,8 | 14,9 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 324 |
| CH sans VD | 73,5 | 71,2 | 75,8 | 16,9 | 15,0 | 18,9 | 9,0 | 7,5 | 10,5 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 2914 |
| VS | 74,3 | 69,2 | 79,4 | 17,7 | 13,1 | 22,2 | 8,0 | 5,1 | 11,0 | . | . | . | 321 |
| CH sans VS | 73,2 | 70,9 | 75,4 | 17,0 | 15,0 | 18,9 | 9,2 | 7,8 | 10,7 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 2917 |
| GE | 66,8 | 63,8 | 69,7 | 20,2 | 17,7 | 22,7 | 12,6 | 10,5 | 14,7 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1160 |
| CH sans GE | 73,6 | 71,3 | 75,9 | 16,8 | 14,9 | 18,7 | 9,0 | 7,5 | 10,4 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.116 Recours aux services d'urgence au cours des deux années précédentes, Suisse (2014, en %)

| | Aucune fois | | | 1 fois | | | 2 fois ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 72,6 | 69,3 | 75,9 | 19,4 | 16,5 | 22,4 | 7,8 | 5,8 | 9,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1084 |
| Homme | 71,4 | 66,6 | 76,3 | 21,0 | 16,7 | 25,3 | 7,6 | 4,8 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 493 |
| Femme | 73,4 | 68,9 | 77,9 | 18,3 | 14,3 | 22,3 | 8,0 | 5,2 | 10,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 591 |
| 65–69 ans | 82,4 | 78,0 | 86,7 | 13,9 | 10,0 | 17,8 | 3,7 | 1,6 | 5,8 | . | . | . | 349 |
| 70–74 ans | 67,7 | 61,1 | 74,3 | 23,4 | 17,2 | 29,6 | 8,9 | 5,2 | 12,6 | . | . | . | 300 |
| 75–79 ans | 66,9 | 59,2 | 74,5 | 19,8 | 13,8 | 25,9 | 12,8 | 6,8 | 18,8 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 209 |
| 80+ ans | 71,0 | 63,4 | 78,5 | 21,7 | 14,6 | 28,8 | 7,0 | 3,3 | 10,7 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 72,6 | 64,9 | 80,3 | 20,6 | 13,3 | 27,8 | 6,6 | 3,0 | 10,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 216 |
| Secondaire II | 73,2 | 69,1 | 77,3 | 18,6 | 15,0 | 22,1 | 8,1 | 5,5 | 10,8 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 628 |
| Tertiaire | 67,7 | 60,1 | 75,2 | 23,9 | 16,9 | 30,9 | 8,3 | 4,2 | 12,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 64,0 | 55,5 | 72,6 | 29,7 | 21,4 | 38,0 | 6,1 | 2,4 | 9,7 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 65,8 | 57,2 | 74,4 | 22,3 | 14,8 | 29,8 | 11,4 | 5,1 | 17,7 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 75,2 | 71,2 | 79,3 | 17,1 | 13,6 | 20,6 | 7,5 | 5,2 | 9,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 645 |
| Né en Suisse | 72,6 | 69,0 | 76,2 | 20,1 | 16,9 | 23,4 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 863 |
| Né à l'étranger | 72,1 | 63,9 | 80,3 | 16,4 | 9,7 | 23,1 | 11,4 | 5,3 | 17,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 220 |
| Ville | 74,4 | 68,3 | 80,5 | 13,9 | 9,8 | 18,1 | 11,5 | 6,5 | 16,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 293 |
| Agglomération | 72,3 | 67,7 | 76,9 | 21,0 | 16,8 | 25,3 | 6,5 | 4,2 | 8,8 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 540 |
| Zone rurale | 71,1 | 63,8 | 78,3 | 22,1 | 15,3 | 29,0 | 6,4 | 2,7 | 10,1 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 251 |
| Medical Home | 65,5 | 59,6 | 71,4 | 20,9 | 15,8 | 26,0 | 13,2 | 9,1 | 17,2 | 0,4 | 0,0 | 1 | 392 |
| Sans Medical Home | 75,3 | 66,9 | 83,6 | 16,5 | 9,6 | 23,4 | 8,3 | 2,3 | 14,2 | . | . | . | 180 |
| Malade | 60,3 | 53,3 | 67,3 | 23,3 | 17,1 | 29,5 | 15,9 | 11,1 | 20,8 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 305 |
| Non-malade | 77,3 | 73,7 | 81,0 | 17,8 | 14,5 | 21,0 | 4,8 | 2,8 | 6,8 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 52,2 | 41,7 | 62,8 | 23,5 | 13,7 | 33,3 | 23,8 | 15,3 | 32,3 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 61,7 | 46,1 | 77,3 | 23,3 | 11,0 | 35,6 | 15,0 | 4,8 | 25,2 | . | . | . | 52 |
| Suisse alémanique | 73,5 | 69,2 | 77,7 | 19,9 | 16,1 | 23,8 | 6,5 | 4,0 | 8,9 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 551 |
| Suisse romande | 71,9 | 66,8 | 77,1 | 17,1 | 12,9 | 21,3 | 10,7 | 7,3 | 14,1 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 355 |
| Suisse italienne | 63,1 | 55,1 | 71,0 | 22,8 | 15,8 | 29,8 | 13,2 | 7,7 | 18,7 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 178 |
| VD | 71,3 | 64,1 | 78,4 | 18,8 | 12,7 | 24,8 | 9,3 | 4,8 | 13,7 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 178 |
| CH sans VD | 72,7 | 69,2 | 76,2 | 19,5 | 16,4 | 22,6 | 7,7 | 5,6 | 9,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1330 : Combien de fois avez-vous utilisé un service d'urgence hospitalier pour vos propres soins médicaux au cours des deux dernières années ?

Base : Tous les répondants.

Question Q1335 : La dernière fois que vous vous êtes rendu/e aux urgences d'un hôpital, était-ce pour un problème de santé dont vous pensiez qu'il aurait pu être traité par les médecins ou le personnel de l'endroit où vous recevez habituellement les soins médicaux s'ils avaient été disponibles ?

Tableau 6.117 Motif du recours aux services d'urgence, comparaison internationale (2017, en %)

| | N'est pas allé/e aux urgences | | | Est allé/e aux urgences pour des soins qui auraient pu être délivrés par le médecin habituel | | | Est allé/e aux urgences pour d'autres raisons | | | Est allé/e aux urgences mais n'a pas de médecin régulier | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 60,8 | 57,5 | 64,2 | 14,9 | 12,3 | 17,4 | 22,5 | 19,6 | 25,3 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 1392 |
| CA | 61,2 | 59,3 | 63,1 | 10,9 | 9,7 | 12,1 | 26,3 | 24,6 | 28,0 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 4549 |
| AU | 57,8 | 53,9 | 61,7 | 8,3 | 5,9 | 10,7 | 33,4 | 29,6 | 37,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 2500 |
| CH | 73,2 | 71,1 | 75,4 | 7,9 | 6,6 | 9,2 | 17,6 | 15,8 | 19,4 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 3238 |
| FR | 80,6 | 77,5 | 83,7 | 7,7 | 5,5 | 9,9 | 10,5 | 8,2 | 12,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 2,0 | 750 |
| UK | 67,0 | 63,3 | 70,8 | 7,5 | 5,4 | 9,5 | 22,1 | 18,8 | 25,4 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 2,8 | 1,5 | 4,1 | 753 |
| SE | 63,4 | 62,0 | 64,8 | 7,4 | 6,7 | 8,2 | 28,1 | 26,7 | 29,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 7000 |
| NZ | 65,9 | 61,0 | 70,8 | 7,1 | 4,6 | 9,6 | 26,7 | 22,0 | 31,3 | . | . | . | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 500 |
| DE | 69,9 | 66,3 | 73,6 | 7,0 | 4,9 | 9,1 | 21,6 | 18,4 | 24,9 | . | . | . | 1,4 | 0,5 | 2,3 | 751 |
| NO | 73,6 | 69,8 | 77,5 | 6,3 | 4,2 | 8,3 | 19,6 | 16,1 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 750 |
| NL | 77,2 | 74,0 | 80,5 | 5,1 | 3,4 | 6,8 | 17,3 | 14,4 | 20,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.118 Motif du recours aux services d'urgence, comparaison internationale (2014, en %)

| | N'est pas allé/e aux urgences | | | Est allé/e aux urgences pour des soins qui auraient pu être délivrés par le médecin habituel | | | Est allé/e aux urgences pour d'autres raisons | | | Est allé/e aux urgences mais n'a pas de médecin régulier | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| CA | 60,8 | 58,4 | 63,1 | 14,0 | 12,3 | 15,7 | 23,6 | 21,5 | 25,6 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 3147 |
| US | 60,9 | 57,2 | 64,5 | 12,5 | 9,9 | 15,0 | 25,0 | 21,7 | 28,3 | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1116 |
| NZ | 63,4 | 56,7 | 70,0 | 9,2 | 4,9 | 13,5 | 20,4 | 14,9 | 25,9 | 1,3 | 0,0 | 3,6 | 5,8 | 3,5 | 8,1 | 379 |
| SE | 64,5 | 62,7 | 66,4 | 9,1 | 8,0 | 10,2 | 24,5 | 22,8 | 26,2 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 5000 |
| CH | 72,6 | 69,3 | 75,9 | 7,3 | 5,4 | 9,1 | 19,9 | 16,9 | 22,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1084 |
| AU | 68,8 | 63,4 | 74,2 | 6,7 | 3,4 | 10,0 | 22,5 | 17,7 | 27,4 | . | . | . | 1,9 | 0,9 | 2,9 | 1670 |
| NL | 67,9 | 63,0 | 72,9 | 5,9 | 3,3 | 8,5 | 22,0 | 17,7 | 26,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 4,1 | 1,6 | 6,5 | 582 |
| NO | 72,7 | 68,5 | 77,0 | 5,4 | 3,2 | 7,5 | 21,5 | 17,6 | 25,5 | . | . | . | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 651 |
| FR | 84,3 | 81,5 | 87,1 | 4,1 | 2,6 | 5,5 | 10,4 | 8,1 | 12,7 | . | . | . | 1,3 | 0,5 | 2,0 | 860 |
| UK | 74,3 | 70,2 | 78,3 | 3,4 | 1,6 | 5,1 | 14,1 | 10,9 | 17,3 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 7,8 | 5,5 | 10,0 | 581 |
| DE | 75,9 | 71,5 | 80,3 | 3,3 | 1,7 | 4,9 | 17,4 | 13,4 | 21,3 | . | . | . | 3,4 | 1,7 | 5,2 | 547 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.119 Motif du recours aux services d'urgence, Suisse (2017, en %)

| | N'est pas allé/e aux urgences | | | Est allé/e aux urgences pour des soins qui auraient pu être délivrés par le médecin habituel | | | Est allé/e aux urgences pour d'autres raisons | | | Est allé/e aux urgences mais n'a pas de médecin régulier | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 73,2 | 71,1 | 75,4 | 7,9 | 6,6 | 9,3 | 17,6 | 15,8 | 19,4 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 3238 |
| Homme | 71,3 | 68,0 | 74,6 | 9,1 | 6,9 | 11,3 | 18,7 | 15,9 | 21,4 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 1526 |
| Femme | 74,8 | 71,9 | 77,6 | 6,9 | 5,3 | 8,6 | 16,8 | 14,3 | 19,2 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 1712 |
| 65-69 ans | 74,6 | 70,5 | 78,7 | 8,0 | 5,4 | 10,7 | 15,9 | 12,5 | 19,2 | 1,0 | 0,2 | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 828 |
| 70-74 ans | 74,2 | 70,1 | 78,3 | 9,8 | 7,0 | 12,7 | 15,3 | 11,9 | 18,6 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 954 |
| 75-79 ans | 74,2 | 69,6 | 78,9 | 6,2 | 3,7 | 8,7 | 18,7 | 14,6 | 22,8 | 0,4 | 0 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 697 |
| 80+ ans | 69,9 | 65,3 | 74,4 | 7,3 | 4,6 | 9,9 | 21 | 17 | 25 | 0,8 | 0 | 1,8 | 1,1 | 0,0 | 2,1 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 74,3 | 70,0 | 78,7 | 7,2 | 4,6 | 9,8 | 16,1 | 12,5 | 19,7 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 706 |
| Secondaire II | 72,3 | 69,5 | 75,2 | 8,3 | 6,5 | 10,1 | 18,7 | 16,2 | 21,1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1765 |
| Tertiaire | 76,8 | 72,3 | 81,2 | 7,7 | 4,8 | 10,6 | 14,4 | 10,8 | 18,0 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 73,4 | 70,8 | 75,9 | 8,2 | 6,6 | 9,8 | 17,0 | 14,9 | 19,1 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 72,9 | 68,6 | 77,2 | 7,0 | 4,5 | 9,4 | 19,3 | 15,5 | 23,1 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 807 |
| Né en Suisse | 73,2 | 70,7 | 75,7 | 8,1 | 6,5 | 9,6 | 17,4 | 15,3 | 19,5 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 2217 |
| Né à l'étranger | 73,2 | 68,9 | 77,5 | 7,4 | 5,0 | 9,8 | 18,3 | 14,6 | 22,1 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1015 |
| Medical Home | 68,9 | 65,2 | 72,5 | 9,5 | 7,1 | 11,9 | 21,3 | 18,1 | 24,4 | . | . | . | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1249 |
| Sans Medical Home | 70,1 | 65,0 | 75,2 | 8,6 | 5,4 | 11,7 | 17,0 | 12,9 | 21,1 | 3,7 | 1,6 | 5,7 | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 726 |
| Malade | 65,2 | 60,8 | 69,6 | 11,3 | 8,2 | 14,3 | 22,7 | 18,8 | 26,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 948 |
| Non-malade | 77,2 | 74,8 | 79,7 | 6,2 | 4,8 | 7,6 | 15,2 | 13,1 | 17,3 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 67,1 | 61,0 | 73,2 | 12,0 | 7,5 | 16,6 | 20,8 | 15,9 | 25,8 | . | . | . | . | . | . | 463 |
| Malade sans Medical Home | 61,0 | 50,3 | 71,7 | 13,5 | 5,6 | 21,4 | 24,1 | 14,6 | 33,6 | 1,4 | 0,0 | 3,1 | . | . | . | 210 |
| Ville | 70,0 | 65,8 | 74,1 | 9,7 | 7,0 | 12,4 | 18,4 | 14,9 | 21,9 | 1,3 | 0,2 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 1026 |
| Agglomération | 74,7 | 71,6 | 77,7 | 7,4 | 5,5 | 9,3 | 16,8 | 14,2 | 19,4 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 1643 |
| Zone rurale | 72,7 | 67,7 | 77,8 | 8,1 | 4,8 | 11,4 | 18,2 | 13,9 | 22,5 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 454 |
| Suisse alémanique | 74,7 | 71,9 | 77,6 | 7,7 | 5,9 | 9,5 | 16,3 | 13,9 | 18,7 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 1040 |
| Suisse romande | 70,0 | 67,0 | 73,1 | 8,3 | 6,4 | 10,2 | 20,4 | 17,7 | 23,1 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1869 |
| Suisse italienne | 68,1 | 62,9 | 73,4 | 9,1 | 6,0 | 12,2 | 22,0 | 17,3 | 26,7 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 329 |
| ZH | 76,8 | 72,1 | 81,5 | 5,5 | 3,0 | 8,1 | 16,0 | 12,0 | 20,1 | 1,0 | 0,0 | 2,2 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 332 |
| CH sans ZH | 72,5 | 70,1 | 74,9 | 8,4 | 6,9 | 9,9 | 17,9 | 15,9 | 20,0 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 2906 |
| VD | 70,6 | 65,4 | 75,8 | 6,3 | 3,4 | 9,1 | 21,6 | 17,0 | 26,3 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 324 |
| CH sans VD | 73,5 | 71,2 | 75,8 | 8,1 | 6,6 | 9,5 | 17,2 | 15,3 | 19,2 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 2914 |
| VS | 74,3 | 69,2 | 79,4 | 8,0 | 4,8 | 11,1 | 16,7 | 12,4 | 21,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | . | . | . | 321 |
| CH sans VS | 73,2 | 70,9 | 75,4 | 7,9 | 6,5 | 9,3 | 17,6 | 15,7 | 19,6 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 2917 |
| GE | 66,8 | 63,8 | 69,7 | 10,4 | 8,5 | 12,4 | 21,6 | 19,1 | 24,2 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1160 |
| CH sans GE | 73,6 | 71,3 | 75,9 | 7,8 | 6,3 | 9,2 | 17,4 | 15,4 | 19,3 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.120 Motif du recours aux services d'urgence, Suisse (2014, en %)

| | N'est pas allé/e aux urgences | | | Est allé/e aux urgences pour des soins qui auraient pu être délivrés par le médecin habituel | | | Est allé/e aux urgences pour d'autres raisons | | | Est allé/e aux urgences mais n'a pas de médecin régulier | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 72,6 | 69,3 | 75,9 | 7,3 | 5,4 | 9,1 | 19,9 | 16,9 | 22,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1084 |
| Homme | 71,4 | 66,6 | 76,3 | 8,2 | 5,4 | 11,0 | 20,1 | 15,8 | 24,4 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 493 |
| Femme | 73,4 | 68,9 | 77,9 | 6,6 | 4,0 | 9,1 | 19,7 | 15,6 | 23,8 | . | . | . | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 591 |
| 65-69 ans | 82,4 | 78,0 | 86,7 | 6,2 | 3,5 | 8,9 | 11,3 | 7,8 | 14,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | . | . | . | 349 |
| 70-74 ans | 67,7 | 61,1 | 74,3 | 9,3 | 5,1 | 13,4 | 22,7 | 16,8 | 28,7 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | . | . | . | 300 |
| 75-79 ans | 66,9 | 59,2 | 74,5 | 6,6 | 2,9 | 10,2 | 26,1 | 18,8 | 33,3 | . | . | . | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 209 |
| 80+ ans | 71,0 | 63,4 | 78,5 | 7,2 | 2,6 | 11,7 | 21,5 | 14,7 | 28,3 | . | . | . | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 72,6 | 64,9 | 80,3 | 9,2 | 4,1 | 14,2 | 18,0 | 11,4 | 24,6 | . | . | . | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 216 |
| Secondaire II | 73,2 | 69,1 | 77,3 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 20,7 | 16,9 | 24,5 | . | . | . | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 628 |
| Tertiaire | 67,7 | 60,1 | 75,2 | 11,4 | 5,6 | 17,2 | 19,8 | 13,9 | 25,7 | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 64,0 | 55,5 | 72,6 | 14,1 | 7,3 | 20,8 | 21,5 | 14,5 | 28,4 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 65,8 | 57,2 | 74,4 | 6,8 | 3,0 | 10,6 | 26,9 | 18,5 | 35,3 | . | . | . | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 75,2 | 71,2 | 79,3 | 6,5 | 4,2 | 8,8 | 18,0 | 14,5 | 21,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 645 |
| Né en Suisse | 72,6 | 69,0 | 76,2 | 7,6 | 5,4 | 9,8 | 19,4 | 16,2 | 22,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 863 |
| Né à l'étranger | 72,1 | 63,9 | 80,3 | 5,8 | 2,4 | 9,2 | 22,0 | 14,1 | 29,9 | . | . | . | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 220 |
| Ville | 74,4 | 68,3 | 80,5 | 5,2 | 2,9 | 7,6 | 19,8 | 14,0 | 25,5 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 293 |
| Agglomération | 72,3 | 67,7 | 76,9 | 7,8 | 5,1 | 10,4 | 19,8 | 15,7 | 23,9 | . | . | . | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 540 |
| Zone rurale | 71,1 | 63,8 | 78,3 | 8,4 | 3,7 | 13,2 | 20,1 | 13,7 | 26,5 | . | . | . | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 251 |
| Medical Home | 66,6 | 61,7 | 71,4 | 9,0 | 6,3 | 11,7 | 24,1 | 19,6 | 28,6 | . | . | . | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 575 |
| Sans Medical Home | 75,0 | 67,7 | 82,3 | 7,0 | 2,1 | 12,0 | 17,4 | 11,3 | 23,6 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | . | . | . | 222 |
| Malade | 60,3 | 53,3 | 67,3 | 8,0 | 4,6 | 11,3 | 31,3 | 24,6 | 38,0 | . | . | . | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 305 |
| Non-malade | 77,3 | 73,7 | 81,0 | 7,0 | 4,8 | 9,3 | 15,4 | 12,2 | 18,5 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 55,3 | 46,2 | 64,4 | 7,8 | 3,6 | 12,1 | 36,6 | 27,6 | 45,6 | . | . | . | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 195 |
| Malade sans Medical Home | 61,6 | 46,5 | 76,7 | 5,9 | 0,2 | 11,6 | 32,5 | 18,5 | 46,6 | . | . | . | . | . | . | 55 |
| Suisse alémanique | 73,5 | 69,2 | 77,7 | 7,9 | 5,4 | 10,4 | 18,4 | 14,5 | 22,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 551 |
| Suisse romande | 71,9 | 66,8 | 77,1 | 5,2 | 2,8 | 7,6 | 22,6 | 17,9 | 27,3 | . | . | . | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 355 |
| Suisse italienne | 63,1 | 55,1 | 71,0 | 8,2 | 3,8 | 12,7 | 27,7 | 20,3 | 35,2 | . | . | . | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 178 |
| VD | 71,3 | 64,1 | 78,4 | 4,9 | 1,8 | 8,1 | 23,1 | 16,5 | 29,7 | . | . | . | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 178 |
| CH sans VD | 72,7 | 69,2 | 76,2 | 7,5 | 5,4 | 9,5 | 19,6 | 16,4 | 22,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1401 : Comment décririez-vous votre santé en général ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.121 État de santé, comparaison internationale (2017, en %)

| | Excellent/très bon | | | Bon | | | Passable/mauvais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| NZ | 55,1 | 50,0 | 60,2 | 33,1 | 28,2 | 37,9 | 11,8 | 8,4 | 15,2 | . | . | . | 500 | |
| CA | 47,9 | 45,9 | 49,9 | 32,7 | 30,8 | 34,6 | 18,7 | 17,2 | 20,3 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 4549 | |
| US | 45,7 | 42,3 | 49,1 | 27,5 | 24,5 | 30,5 | 26,5 | 23,4 | 29,7 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1392 | |
| AU | 43,6 | 39,8 | 47,3 | 37,1 | 33,3 | 40,9 | 19,1 | 16,0 | 22,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2500 | |
| UK | 43,1 | 39,1 | 47,1 | 31,5 | 27,7 | 35,2 | 24,0 | 20,6 | 27,5 | 1,4 | 0,5 | 2,3 | 753 | |
| NO | 34,6 | 30,5 | 38,7 | 36,6 | 32,5 | 40,7 | 28,5 | 24,6 | 32,4 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 750 | |
| SE | 32,8 | 31,4 | 34,2 | 39,4 | 38,0 | 40,8 | 27,3 | 26,0 | 28,6 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 7000 | |
| CH | 31,9 | 29,6 | 34,1 | 47,3 | 44,8 | 49,7 | 20,7 | 18,7 | 22,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 3238 | |
| NL | 25,8 | 22,4 | 29,2 | 40,9 | 37,1 | 44,7 | 33,1 | 29,5 | 36,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 750 | |
| FR | 23,0 | 19,9 | 26,0 | 46,4 | 42,5 | 50,2 | 30,3 | 26,7 | 33,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 750 | |
| DE | 19,0 | 15,8 | 22,1 | 43,2 | 39,2 | 47,1 | 37,5 | 33,6 | 41,3 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 751 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.122 État de santé, comparaison internationale (2014, en %)

| | Excellent/très bon | | | Bon | | | Passable/mauvais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| NZ | 51,3 | 44,4 | 58,3 | 36,5 | 29,4 | 43,5 | 12,1 | 8,0 | 16,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 379 | |
| CA | 50,0 | 47,6 | 52,4 | 31,2 | 29,0 | 33,4 | 18,1 | 16,2 | 20,0 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 3147 | |
| AU | 48,9 | 43,2 | 54,5 | 30,3 | 25,2 | 35,3 | 20,8 | 16,2 | 25,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1670 | |
| US | 45,8 | 42,2 | 49,5 | 33,0 | 29,5 | 36,5 | 20,9 | 17,8 | 24,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1116 | |
| UK | 39,4 | 34,7 | 44,0 | 41,3 | 36,4 | 46,1 | 19,4 | 15,5 | 23,3 | . | . | . | 581 | |
| NO | 33,2 | 28,9 | 37,6 | 29,4 | 25,1 | 33,7 | 36,8 | 32,1 | 41,5 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 651 | |
| CH | 32,1 | 28,7 | 35,4 | 45,7 | 42,0 | 49,4 | 20,7 | 17,7 | 23,7 | 1,5 | 0,2 | 2,9 | 1084 | |
| SE | 31,1 | 29,3 | 32,9 | 37,2 | 35,3 | 39,1 | 31,3 | 29,4 | 33,1 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 5000 | |
| NL | 20,4 | 16,4 | 24,3 | 46,2 | 41,1 | 51,4 | 33,4 | 28,5 | 38,3 | . | . | . | 582 | |
| DE | 20,0 | 16,0 | 24,0 | 44,4 | 39,2 | 49,7 | 35,1 | 29,9 | 40,2 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 547 | |
| FR | 11,3 | 9,0 | 13,6 | 47,4 | 43,3 | 51,4 | 41,2 | 37,2 | 45,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 860 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.123 État de santé, Suisse (2017, en %)

| | Excellent/très bon | | | Bon | | | Passable/mauvais | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 31,9 | 29,6 | 34,1 | 47,3 | 44,8 | 49,7 | 20,7 | 18,7 | 22,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 3238 |
| Homme | 33,2 | 29,8 | 36,5 | 47,3 | 43,7 | 50,9 | 19,4 | 16,6 | 22,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 1526 |
| Femme | 30,8 | 27,7 | 33,9 | 47,2 | 43,9 | 50,6 | 21,7 | 18,9 | 24,4 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1712 |
| 65-69 ans | 39,9 | 35,2 | 44,5 | 41,4 | 36,7 | 46,1 | 18,8 | 15,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 828 |
| 70-74 ans | 33,9 | 29,5 | 38,3 | 51,6 | 47,0 | 56,2 | 14,3 | 11,2 | 17,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 954 |
| 75-79 ans | 27,3 | 22,7 | 31,9 | 49,1 | 43,8 | 54,4 | 23,1 | 18,5 | 27,7 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 697 |
| 80+ ans | 24,6 | 20,2 | 29,0 | 48,0 | 42,9 | 53,0 | 27,2 | 22,7 | 31,6 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 20,8 | 16,6 | 25,0 | 50,5 | 45,3 | 55,6 | 28,7 | 24,2 | 33,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 706 |
| Secondaire II | 34,2 | 31,1 | 37,2 | 46,5 | 43,3 | 49,7 | 19,1 | 16,6 | 21,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1765 |
| Tertiaire | 42,7 | 37,2 | 48,1 | 44,6 | 39,1 | 50,1 | 12,3 | 8,9 | 15,7 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 34,4 | 31,7 | 37,1 | 47,1 | 44,3 | 50,0 | 18,3 | 16,1 | 20,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 24,5 | 20,4 | 28,7 | 47,7 | 42,8 | 52,5 | 27,4 | 23,1 | 31,6 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 807 |
| Né en Suisse | 34,0 | 31,3 | 36,7 | 48,1 | 45,2 | 50,9 | 17,8 | 15,7 | 20,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2217 |
| Né à l'étranger | 23,7 | 19,6 | 27,7 | 44,3 | 39,5 | 49,2 | 31,2 | 26,6 | 35,8 | 0,8 | 0,0 | 1,9 | 1015 |
| Medical Home | 25,5 | 22,0 | 28,9 | 48,5 | 44,5 | 52,4 | 25,7 | 22,2 | 29,2 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 1249 |
| Sans Medical Home | 23,6 | 19,0 | 28,2 | 48,0 | 42,4 | 53,6 | 28,3 | 23,4 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 726 |
| Malade | 12,9 | 9,8 | 16,1 | 50,5 | 45,9 | 55,1 | 36,5 | 32,1 | 40,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 948 |
| Non-malade | 40,5 | 37,5 | 43,4 | 46,3 | 43,3 | 49,3 | 13,0 | 11,0 | 15,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 13,8 | 9,1 | 18,5 | 48,9 | 42,3 | 55,4 | 37,2 | 31,0 | 43,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 4,3 | 0,0 | 9,0 | 49,3 | 38,5 | 60,1 | 46,4 | 35,7 | 57,2 | . | . | . | 210 |
| Ville | 34,0 | 29,7 | 38,3 | 45,5 | 40,9 | 50,0 | 20,1 | 16,6 | 23,7 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 1026 |
| Agglomération | 31,8 | 28,4 | 35,1 | 46,8 | 43,3 | 50,4 | 21,3 | 18,4 | 24,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1643 |
| Zone rurale | 30,4 | 25,2 | 35,6 | 50,9 | 45,2 | 56,6 | 18,7 | 14,3 | 23,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 32,4 | 29,3 | 35,5 | 47,8 | 44,5 | 51,1 | 19,5 | 16,9 | 22,1 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1040 |
| Suisse romande | 30,6 | 27,5 | 33,6 | 46,2 | 42,9 | 49,5 | 23,0 | 20,1 | 25,9 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1869 |
| Suisse italienne | 30,6 | 25,4 | 35,8 | 44,9 | 39,4 | 50,4 | 24,5 | 19,7 | 29,3 | . | . | . | 329 |
| ZH | 33,9 | 28,7 | 39,2 | 43,4 | 37,9 | 48,9 | 22,5 | 17,7 | 27,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 332 |
| CH sans ZH | 31,4 | 28,9 | 34,0 | 48,0 | 45,3 | 50,8 | 20,3 | 18,1 | 22,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 2906 |
| VD | 31,1 | 25,9 | 36,3 | 46,9 | 41,2 | 52,5 | 21,8 | 17,1 | 26,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 31,9 | 29,5 | 34,4 | 47,3 | 44,7 | 49,9 | 20,5 | 18,4 | 22,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 2914 |
| VS | 39,0 | 33,3 | 44,7 | 38,0 | 32,3 | 43,7 | 23,0 | 17,9 | 28,0 | . | . | . | 321 |
| CH sans VS | 31,5 | 29,2 | 33,9 | 47,7 | 45,1 | 50,2 | 20,5 | 18,5 | 22,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 2917 |
| GE | 30,1 | 27,3 | 33,0 | 50,1 | 47,0 | 53,2 | 19,2 | 16,8 | 21,6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1160 |
| CH sans GE | 32,0 | 29,5 | 34,4 | 47,1 | 44,5 | 49,7 | 20,7 | 18,6 | 22,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.124 État de santé, Suisse (2014, en %)

| | Excellent/très bon | | | Bon | | | Passable/mauvais | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 32,1 | 28,7 | 35,4 | 45,7 | 42,0 | 49,4 | 20,7 | 17,7 | 23,7 | 1,5 | 0,2 | 2,9 | 1084 |
| Homme | 31,3 | 26,2 | 36,3 | 50,8 | 45,1 | 56,5 | 16,4 | 12,5 | 20,4 | 1,5 | 0,0 | 3,7 | 493 |
| Femme | 32,6 | 28,2 | 37,1 | 41,9 | 37,1 | 46,8 | 23,9 | 19,7 | 28,1 | 1,5 | 0,0 | 3,3 | 591 |
| 65-69 ans | 34,5 | 28,5 | 40,6 | 47,4 | 40,7 | 54,2 | 16,0 | 11,5 | 20,5 | 2,1 | 0,0 | 5,2 | 349 |
| 70-74 ans | 37,1 | 30,3 | 44,0 | 41,5 | 34,7 | 48,4 | 21,3 | 15,4 | 27,3 | . | . | . | 300 |
| 75-79 ans | 30,0 | 22,8 | 37,2 | 46,5 | 38,4 | 54,5 | 20,7 | 13,9 | 27,5 | 2,9 | 0,0 | 7,1 | 209 |
| 80+ ans | 25,9 | 19,2 | 32,6 | 47,2 | 39,1 | 55,3 | 25,7 | 19,0 | 32,4 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 24,1 | 16,8 | 31,4 | 51,2 | 42,7 | 59,7 | 22,7 | 16,1 | 29,2 | 2,1 | 0,0 | 6,1 | 216 |
| Secondaire II | 33,0 | 28,7 | 37,2 | 45,5 | 40,8 | 50,2 | 20,4 | 16,6 | 24,2 | 1,1 | 0,0 | 2,6 | 628 |
| Tertiaire | 42,8 | 34,8 | 50,7 | 37,1 | 28,6 | 45,6 | 19,2 | 12,7 | 25,7 | 0,9 | 0,0 | 2,8 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 52,1 | 43,3 | 60,9 | 34,6 | 26,3 | 42,8 | 13,4 | 7,7 | 19,0 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 34,1 | 26,4 | 41,8 | 39,7 | 31,3 | 48,1 | 22,3 | 14,7 | 29,9 | 3,9 | 0,0 | 9,1 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 27,0 | 22,9 | 31,1 | 49,9 | 45,0 | 54,7 | 22,0 | 18,1 | 25,8 | 1,2 | 0,0 | 2,7 | 645 |
| Né en Suisse | 32,7 | 28,9 | 36,4 | 46,8 | 42,7 | 50,9 | 19,9 | 16,7 | 23,2 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 863 |
| Né à l'étranger | 29,6 | 21,9 | 37,3 | 40,3 | 31,4 | 49,2 | 24,3 | 16,9 | 31,6 | 5,8 | 0,0 | 12,7 | 220 |
| Ville | 30,9 | 24,2 | 37,6 | 41,2 | 34,0 | 48,5 | 23,9 | 17,9 | 30,0 | 4,0 | 0,0 | 8,7 | 293 |
| Agglomération | 32,9 | 28,1 | 37,7 | 47,5 | 42,3 | 52,8 | 19,0 | 14,9 | 23,0 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 540 |
| Zone rurale | 31,7 | 25,0 | 38,3 | 47,0 | 39,4 | 54,6 | 20,6 | 14,5 | 26,8 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 251 |
| Medical Home | 26,3 | 21,1 | 31,6 | 47,0 | 40,8 | 53,3 | 26,3 | 20,8 | 31,8 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 392 |
| Sans Medical Home | 24,7 | 17,2 | 32,2 | 46,7 | 37,3 | 56,1 | 22,3 | 14,8 | 29,8 | 6,4 | 0,0 | 13,9 | 180 |
| Malade | 10,4 | 6,6 | 14,3 | 47,4 | 40,1 | 54,6 | 41,8 | 34,7 | 48,9 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 305 |
| Non-malade | 40,4 | 36,2 | 44,6 | 45,1 | 40,7 | 49,4 | 12,6 | 9,7 | 15,4 | 2,0 | 0,1 | 3,8 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 8,1 | 2,9 | 13,3 | 43,8 | 33,3 | 54,4 | 47,1 | 36,7 | 57,6 | 1,0 | 0,0 | 2,9 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 11,7 | 2,3 | 21,1 | 43,1 | 25,0 | 61,1 | 45,3 | 27,7 | 62,8 | . | . | . | 52 |
| Suisse alémanique | 32,5 | 28,2 | 36,9 | 45,0 | 40,3 | 49,8 | 20,6 | 16,8 | 24,4 | 1,8 | 0,0 | 3,7 | 551 |
| Suisse romande | 31,9 | 26,3 | 37,5 | 47,2 | 41,1 | 53,4 | 19,8 | 14,9 | 24,6 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 355 |
| Suisse italienne | 26,0 | 18,6 | 33,4 | 48,0 | 39,8 | 56,3 | 26,0 | 18,8 | 33,2 | . | . | . | 178 |
| VD | 35,6 | 27,9 | 43,2 | 49,0 | 40,8 | 57,3 | 14,7 | 9,0 | 20,3 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 178 |
| CH sans VD | 31,7 | 28,1 | 35,3 | 45,4 | 41,4 | 49,4 | 21,2 | 18,0 | 24,4 | 1,6 | 0,1 | 3,1 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1403 : À cause d'un problème de santé, avez-vous besoin de quelqu'un pour vous aider dans les tâches ménagères, à la préparation des repas, la gestion quotidienne des médicaments ou pour les courses ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.125 Besoin d'aide, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| AU | 28,7 | 25,0 | 32,3 | 71,2 | 67,6 | 74,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2500 |
| UK | 19,9 | 16,6 | 23,2 | 79,6 | 76,3 | 82,9 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 753 |
| FR | 17,7 | 14,7 | 20,8 | 82,3 | 79,2 | 85,3 | . | . | . | 750 |
| NL | 17,1 | 14,3 | 19,9 | 82,8 | 80,0 | 85,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 750 |
| US | 17,1 | 14,5 | 19,7 | 82,5 | 79,9 | 85,1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1392 |
| NZ | 14,6 | 10,8 | 18,4 | 85,1 | 81,3 | 88,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 500 |
| CA | 12,3 | 11,1 | 13,6 | 87,3 | 86,1 | 88,6 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 4549 |
| SE | 12,3 | 11,3 | 13,2 | 87,5 | 86,5 | 88,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 7000 |
| CH | 11,3 | 9,8 | 12,9 | 88,6 | 87,1 | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3238 |
| NO | 11,0 | 8,3 | 13,7 | 88,4 | 85,6 | 91,2 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 750 |
| DE | 9,8 | 7,6 | 12,0 | 90,1 | 87,9 | 92,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 751 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.126 Besoin d'aide, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 11,3 | 9,8 | 12,9 | 88,6 | 87,1 | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3238 |
| Homme | 7,0 | 5,1 | 8,9 | 93,0 | 91,1 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1526 |
| Femme | 14,8 | 12,5 | 17,1 | 85,2 | 82,8 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1712 |
| 65–69 ans | 5,9 | 3,8 | 8,0 | 94,1 | 92,0 | 96,2 | . | . | . | 828 |
| 70–74 ans | 4,7 | 2,8 | 6,5 | 95,3 | 93,4 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 954 |
| 75–79 ans | 10,2 | 6,9 | 13,5 | 89,8 | 86,5 | 93,1 | . | . | . | 697 |
| 80+ ans | 25,3 | 21 | 29,7 | 74,6 | 70,2 | 79 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 19,2 | 15,2 | 23,1 | 80,8 | 76,9 | 84,8 | . | . | . | 706 |
| Secondaire II | 9,3 | 7,4 | 11,2 | 90,7 | 88,8 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1765 |
| Tertiaire | 5,5 | 3,3 | 7,8 | 94,5 | 92,2 | 96,7 | . | . | . | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 9,4 | 7,7 | 11,1 | 90,5 | 88,8 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 16,8 | 13,3 | 20,3 | 83,2 | 79,7 | 86,7 | . | . | . | 807 |
| Né en Suisse | 10,3 | 8,6 | 12,0 | 89,7 | 88,0 | 91,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2217 |
| Né à l'étranger | 15,2 | 11,6 | 18,9 | 84,8 | 81,1 | 88,4 | . | . | . | 1015 |
| Medical Home | 13,0 | 10,3 | 15,6 | 87,0 | 84,3 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1249 |
| Sans Medical Home | 12,7 | 8,9 | 16,5 | 87,3 | 83,5 | 91,1 | . | . | . | 726 |
| Malade | 18,5 | 15,0 | 22,0 | 81,5 | 78,0 | 85,0 | . | . | . | 948 |
| Non-malade | 7,7 | 6,1 | 9,4 | 92,3 | 90,6 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 18,8 | 13,8 | 23,8 | 81,2 | 76,2 | 86,2 | . | . | . | 463 |
| Malade sans Medical Home | 20,5 | 11,9 | 29,1 | 79,5 | 70,9 | 88,1 | . | . | . | 210 |
| Ville | 12,3 | 9,3 | 15,3 | 87,7 | 84,7 | 90,7 | . | . | . | 1026 |
| Agglomération | 10,6 | 8,5 | 12,8 | 89,4 | 87,2 | 91,5 | . | . | . | 1643 |
| Zone rurale | 10,0 | 6,6 | 13,4 | 89,9 | 86,5 | 93,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 454 |
| Suisse alémanique | 10,5 | 8,4 | 12,5 | 89,5 | 87,4 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1040 |
| Suisse romande | 13,0 | 10,7 | 15,3 | 86,9 | 84,6 | 89,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1869 |
| Suisse italienne | 14,6 | 10,7 | 18,6 | 85,4 | 81,4 | 89,3 | . | . | . | 329 |
| ZH | 10,7 | 7,1 | 14,3 | 89,3 | 85,7 | 92,9 | . | . | . | 332 |
| CH sans ZH | 11,5 | 9,7 | 13,2 | 88,5 | 86,8 | 90,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2906 |
| VD | 13,0 | 9,1 | 16,9 | 86,8 | 82,9 | 90,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 11,2 | 9,5 | 12,8 | 88,8 | 87,2 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2914 |
| VS | 12,3 | 8,3 | 16,4 | 87,4 | 83,3 | 91,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 321 |
| CH sans VS | 11,3 | 9,7 | 12,9 | 88,7 | 87,1 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2917 |
| GE | 12,0 | 10,0 | 14,0 | 88,0 | 86,0 | 90,0 | . | . | . | 1160 |
| CH sans GE | 11,3 | 9,6 | 12,9 | 88,7 | 87,0 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1406 : À quelle fréquence quelqu'un vous aide-t-il pour l'une ou l'autre de ces activités ? Veuillez penser tant aux aides professionnelles que de la part de la famille ou des amis.

Base : Répondants ayant besoin d'aide.

Tableau 6.127 Fréquence de l'aide reçue, comparaison internationale (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois | | | Rarement/jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| UK | 74,0 | 66,0 | 82,1 | 14,3 | 7,8 | 20,8 | 9,8 | 4,3 | 15,4 | 1,8 | 0,0 | 3,6 | 143 | |
| CH | 72,3 | 65,6 | 79,0 | 19,3 | 13,5 | 25,2 | 7,3 | 3,2 | 11,4 | 1,1 | 0,0 | 2,9 | 366 | |
| NL | 70,6 | 62,7 | 78,4 | 15,8 | 9,5 | 22,1 | 10,9 | 5,7 | 16,1 | 2,7 | 0,0 | 5,4 | 140 | |
| FR | 70,4 | 61,8 | 78,9 | 27,1 | 18,8 | 35,3 | 1,9 | 0,0 | 4,9 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | 119 | |
| SE | 69,0 | 65,2 | 72,9 | 22,7 | 19,2 | 26,2 | 7,0 | 4,9 | 9,0 | 1,3 | 0,2 | 2,4 | 840 | |
| US | 66,9 | 59,1 | 74,8 | 17,2 | 11,2 | 23,2 | 15,6 | 9,3 | 21,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 215 | |
| DE | 66,5 | 55,7 | 77,3 | 17,2 | 8,8 | 25,6 | 12,6 | 4,5 | 20,7 | 3,7 | 0,0 | 7,5 | 90 | |
| CA | 64,6 | 59,6 | 69,6 | 23,0 | 18,5 | 27,6 | 11,1 | 8,2 | 14,0 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | 624 | |
| NZ | 53,4 | 38,9 | 67,8 | 35,4 | 21,2 | 49,6 | 7,4 | 0,0 | 14,9 | 3,8 | 0,0 | 11,1 | 60 | |
| AU | 51,2 | 43,5 | 59,0 | 30,9 | 24,2 | 37,7 | 17,2 | 9,9 | 24,5 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 542 | |
| NO | 48,3 | 35,3 | 61,3 | 37,1 | 24,4 | 49,7 | 11,2 | 3,3 | 19,0 | 3,4 | 0,0 | 7,8 | 80 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.128 Fréquence de l'aide reçue, Suisse (2017, en %)

| | Toujours/souvent | | | Parfois | | | Rarement/jamais | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| Total | 72,3 | 65,6 | 79,0 | 19,3 | 13,5 | 25,2 | 7,3 | 3,1 | 11,4 | 1,1 | 0,0 | 2,9 | 366 | |
| Homme | 71,0 | 57,6 | 84,4 | 15,9 | 5,3 | 26,5 | 9,8 | 0,8 | 18,7 | 3,3 | 0,0 | 9,7 | 95 | |
| Femme | 72,8 | 65,0 | 80,5 | 20,6 | 13,7 | 27,6 | 6,4 | 1,7 | 11,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 271 | |
| 65–69 ans | 71,3 | 53,8 | 88,8 | 19,6 | 4,3 | 34,9 | 8,4 | 0,0 | 20,0 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 51 | |
| 70–74 ans | 66,3 | 46,4 | 86,2 | 29,7 | 9,9 | 49,4 | 3,7 | 0,0 | 8,4 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 50 | |
| 75–79 ans | 84,7 | 73,5 | 96,0 | 8,3 | 0,1 | 16,5 | 7,0 | 0,0 | 15,3 | . | . | . | 70 | |
| 80+ ans | 69,3 | 59,8 | 78,9 | 21,2 | 12,8 | 29,5 | 7,8 | 1,7 | 13,9 | 1,7 | 0,0 | 4,9 | 195 | |
| Scolarité obligatoire | 75,8 | 65,5 | 86,1 | 15,2 | 6,8 | 23,7 | 8,7 | 1,3 | 16,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 151 | |
| Secondaire II | 70,1 | 60,3 | 79,8 | 21,7 | 13,1 | 30,2 | 6,5 | 1,1 | 12,0 | 1,7 | 0,0 | 5,1 | 164 | |
| Tertiaire | 75,0 | 56,8 | 93,3 | 17,1 | 0,0 | 34,7 | 6,2 | 0,0 | 12,5 | 1,7 | 0,0 | 5,2 | 48 | |
| En dessus du seuil de pauvreté | 75,7 | 67,2 | 84,1 | 14,0 | 7,3 | 20,7 | 8,7 | 2,8 | 14,7 | 1,6 | 0,0 | 4,5 | 213 | |
| En dessous du seuil de pauvreté | 66,8 | 55,9 | 77,7 | 28,0 | 17,5 | 38,5 | 4,9 | 0,0 | 9,8 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 153 | |
| Né en Suisse | 70,7 | 62,4 | 79,0 | 20,6 | 13,3 | 28,0 | 7,2 | 2,1 | 12,4 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 225 | |
| Né à l'étranger | 76,4 | 65,5 | 87,2 | 16,1 | 6,8 | 25,4 | 7,4 | 0,8 | 14,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 141 | |
| Medical Home | 74,6 | 64,6 | 84,5 | 19,8 | 10,6 | 29,0 | 5,4 | 0,0 | 10,7 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 159 | |
| Sans Medical Home | 76,0 | 61,7 | 90,3 | 17,6 | 5,1 | 30,2 | 1,8 | 0,5 | 3,1 | 4,5 | 0,0 | 13,3 | 89 | |
| Malade | 78,0 | 69,1 | 86,8 | 13,5 | 6,5 | 20,4 | 8,5 | 1,9 | 15,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 186 | |
| Non-malade | 65,1 | 54,3 | 75,9 | 25,5 | 15,7 | 35,3 | 7,2 | 1,1 | 13,3 | 2,2 | 0,0 | 6,0 | 151 | |
| Malade avec Medical Home | 79,4 | 67,4 | 91,4 | 17,7 | 6,0 | 29,4 | 2,9 | 0,0 | 6,1 | . | . | . | 90 | |
| Malade sans Medical Home | 76,6 | 57,8 | 95,4 | 19,2 | 0,7 | 37,7 | 4,2 | 0,8 | 7,7 | . | . | . | 48 | |
| Ville | 67,7 | 54,9 | 80,5 | 21,3 | 10,6 | 31,9 | 7,4 | 0,0 | 15,5 | 3,7 | 0,0 | 9,6 | 124 | |
| Agglomération | 72,9 | 63,1 | 82,8 | 18,4 | 10,0 | 26,8 | 8,7 | 1,9 | 15,5 | . | . | . | 177 | |
| Zone rurale | 77,0 | 61,5 | 92,5 | 16,6 | 2,7 | 30,6 | 6,4 | 0,0 | 14,9 | . | . | . | 48 | |
| Suisse alémanique | 68,2 | 58,4 | 78,0 | 21,8 | 13,2 | 30,4 | 8,6 | 2,4 | 14,8 | 1,4 | 0,0 | 4,1 | 100 | |
| Suisse romande | 82,8 | 76,8 | 88,8 | 11,9 | 6,4 | 17,3 | 5,0 | 2,1 | 8,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 219 | |
| Suisse italienne | 69,0 | 55,4 | 82,6 | 25,5 | 12,5 | 38,4 | 4,1 | 0,0 | 9,8 | 1,4 | 0,0 | 4,1 | 47 | |
| ZH | 74,5 | 58,7 | 90,3 | 22,8 | 7,5 | 38,0 | 2,7 | 0,0 | 8,1 | . | . | . | 32 | |
| CH sans ZH | 71,9 | 64,5 | 79,3 | 18,7 | 12,3 | 25,1 | 8,2 | 3,3 | 13,0 | 1,3 | 0,0 | 3,4 | 334 | |
| VD | 83,9 | 72,5 | 95,4 | 10,2 | 0,5 | 20,0 | 5,8 | 0,0 | 12,6 | . | . | . | 39 | |
| CH sans VD | 71,0 | 63,7 | 78,3 | 20,3 | 13,9 | 26,8 | 7,5 | 2,9 | 12,0 | 1,2 | 0,0 | 3,2 | 327 | |
| VS | 76,4 | 61,1 | 91,8 | 18,8 | 4,4 | 33,3 | 4,7 | 0,0 | 11,3 | . | . | . | 35 | |
| CH sans VS | 72,1 | 65,1 | 79,1 | 19,4 | 13,2 | 25,5 | 7,4 | 3,1 | 11,8 | 1,1 | 0,0 | 3,0 | 331 | |
| GE | 70,6 | 62,2 | 79,0 | 17,9 | 10,8 | 25,0 | 10,1 | 4,5 | 15,7 | 1,4 | 0,0 | 3,4 | 131 | |
| CH sans GE | 72,4 | 65,3 | 79,5 | 19,4 | 13,2 | 25,7 | 7,1 | 2,7 | 11,5 | 1,1 | 0,0 | 3,0 | 235 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1408 : Recevez-vous de l'aide de ... ?

- Une aide-soignante, infirmière ou autre professionnel/le de santé. (A1)
- Un membre de la famille ou ami/e suivi avec un médecin ou un autre professionnel de santé. (A2)
- Une institution religieuse ou œuvre de charité. (A3)

Base : Répondants ayant besoin d'aide.

Tableau 6.129 Type d'aide reçue, comparaison internationale (2017, en %)

| Pays | Reçoit de l'aide professionnelle | | | Pays | Reçoit de l'aide d'un membre de la famille ou d'un/e ami/e | | | Échantillon n |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------|--|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| SE | 53,1 | 48,9 | 57,4 | NO | 91,0 | 83,7 | 98,4 | 73 |
| NO | 51,0 | 37,5 | 64,5 | US | 86,1 | 80,1 | 92,1 | 196 |
| AU | 40,5 | 32,8 | 48,1 | FR | 85,4 | 78,8 | 92,0 | 116 |
| CH | 39,0 | 31,8 | 46,3 | UK | 83,7 | 76,3 | 91,1 | 131 |
| NL | 35,3 | 26,2 | 44,3 | DE | 82,2 | 72,8 | 91,6 | 79 |
| DE | 33,7 | 22,5 | 45,0 | CA | 80,9 | 76,5 | 85,3 | 578 |
| NZ | 33,3 | 20,4 | 46,2 | CH | 80,4 | 74,7 | 86,1 | 352 |
| FR | 30,1 | 21,5 | 38,7 | AU | 78,9 | 72,8 | 85,0 | 531 |
| CA | 29,5 | 24,7 | 34,4 | NZ | 73,7 | 61,6 | 85,7 | 59 |
| US | 27,8 | 20,0 | 35,6 | SE | 70,7 | 66,9 | 74,6 | 814 |
| UK | 19,5 | 12,1 | 26,9 | NL | 60,9 | 51,8 | 69,9 | 128 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.130 Type d'aide reçue, Suisse (2017, en %)

| | Reçoit de l'aide professionnelle | | | Reçoit de l'aide d'un membre de la famille ou d'un/e ami/e | | | Échantillon n |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 39,0 | 31,8 | 46,3 | 80,4 | 74,7 | 86,1 | 352 |
| Homme | 32,4 | 18,7 | 46,1 | 89,7 | 81,7 | 97,7 | 90 |
| Femme | 41,4 | 32,9 | 50,0 | 77,1 | 69,9 | 84,2 | 262 |
| 65–69 ans | 17,1 | 2,6 | 31,6 | 80,3 | 65,3 | 95,3 | 49 |
| 70–74 ans | 43,2 | 21,9 | 64,6 | 61,2 | 40,6 | 81,9 | 47 |
| 75–79 ans | 29,5 | 13,3 | 45,7 | 90,4 | 80,5 | 100 | 65 |
| 80+ ans | 47,6 | 37,6 | 57,7 | 80,5 | 72,8 | 88,2 | 191 |
| Scolarité obligatoire | 39,0 | 27,8 | 50,2 | 86,5 | 79,1 | 93,9 | 147 |
| Secondaire II | 39,3 | 28,8 | 49,8 | 76,1 | 67,3 | 85,0 | 158 |
| Tertiaire | 48,7 | 26,9 | 70,5 | 69,1 | 48,2 | 90,0 | 44 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 33,1 | 23,9 | 42,3 | 80,3 | 72,6 | 88,1 | 207 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 48,5 | 36,9 | 60,1 | 80,5 | 72,5 | 88,6 | 145 |
| Né en Suisse | 43,4 | 34,4 | 52,3 | 80,2 | 73,2 | 87,2 | 218 |
| Né à l'étranger | 28,4 | 16,7 | 40,2 | 80,9 | 71,3 | 90,4 | 134 |
| Medical Home | 41,1 | 29,9 | 52,2 | 81,6 | 73,1 | 90,2 | 157 |
| Sans Medical Home | 32,4 | 17,2 | 47,6 | 84,8 | 73,2 | 96,3 | 82 |
| Malade | 44,0 | 33,4 | 54,6 | 82,2 | 74,3 | 90,2 | 177 |
| Non-malade | 31,9 | 21,2 | 42,6 | 76,4 | 67,3 | 85,6 | 146 |
| Malade avec Medical Home | 44,7 | 30,0 | 59,3 | 83,0 | 72,2 | 93,8 | 89 |
| Malade sans Medical Home | 40,8 | 16,2 | 65,3 | 94,7 | 87,9 | 100,0 | 42 |
| Ville | 31,9 | 19,7 | 44,2 | 88,5 | 81,0 | 96,1 | 119 |
| Agglomération | 44,2 | 33,1 | 55,4 | 77,6 | 68,6 | 86,6 | 169 |
| Zone rurale | 33,1 | 16,8 | 49,3 | 74,6 | 59,2 | 89,9 | 47 |
| Suisse alémanique | 36,8 | 26,6 | 47,1 | 84,2 | 76,3 | 92,0 | 97 |
| Suisse romande | 42,6 | 32,9 | 52,4 | 73,0 | 64,4 | 81,7 | 209 |
| Suisse italienne | 45,0 | 30,2 | 59,8 | 74,9 | 61,8 | 88,1 | 46 |
| ZH | 28,4 | 11,9 | 44,9 | 82,6 | 69,0 | 96,2 | 31 |
| CH sans ZH | 41,1 | 33,0 | 49,1 | 80,0 | 73,7 | 86,2 | 321 |
| VD | 50,0 | 33,4 | 66,6 | 63,7 | 47,7 | 79,7 | 38 |
| CH sans VD | 37,8 | 30,0 | 45,7 | 82,3 | 76,2 | 88,3 | 314 |
| VS | 32,2 | 15,7 | 48,7 | 79,5 | 65,6 | 93,4 | 34 |
| CH sans VS | 39,4 | 31,8 | 47,0 | 80,4 | 74,5 | 86,4 | 318 |
| GE | 32,1 | 23,4 | 40,7 | 83,2 | 75,9 | 90,5 | 123 |
| CH sans GE | 39,5 | 31,8 | 47,2 | 80,2 | 74,2 | 86,3 | 229 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1410 : Au cours de la dernière année, est-il arrivé que vous n'ayez pas reçu l'aide dont vous aviez besoin pour des raisons de coûts ?

Base : Répondants ayant besoin d'aide.

Tableau 6.131 Absence d'aide pour des raisons de coûts, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 23,6 | 16,3 | 31,0 | 75,9 | 68,5 | 83,2 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 215 |
| AU | 21,9 | 16,1 | 27,7 | 76,6 | 70,8 | 82,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 542 |
| CA | 19,1 | 14,2 | 24,0 | 78,9 | 73,9 | 83,9 | 2,0 | 0,4 | 3,6 | 624 |
| NZ | 10,5 | 0,5 | 20,6 | 89,5 | 79,4 | 99,5 | . | . | . | 60 |
| CH | 9,9 | 5,4 | 14,4 | 90,0 | 85,5 | 94,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 366 |
| UK | 5,6 | 1,5 | 9,7 | 93,3 | 89,0 | 97,6 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 143 |
| NL | 5,5 | 1,7 | 9,3 | 93,3 | 89,2 | 97,5 | 1,2 | 0,0 | 2,9 | 140 |
| FR | 5,0 | 0,4 | 9,5 | 94,3 | 89,6 | 99,0 | 0,7 | 0,0 | 2,2 | 119 |
| NO | 4,0 | 0,0 | 8,9 | 96,0 | 91,1 | 100,0 | . | . | . | 80 |
| DE | 3,9 | 0,0 | 8,7 | 93,8 | 88,3 | 99,2 | 2,3 | 0,0 | 5,0 | 90 |
| SE | 1,5 | 0,7 | 2,4 | 96,1 | 94,4 | 97,8 | 2,4 | 0,9 | 3,9 | 840 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.132 Absence d'aide pour des raisons de coûts, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| AU | 26,7 | 7,0 | 46,4 | 73,3 | 53,6 | 93,0 | . | . | . | 104 |
| US | 18,2 | 7,4 | 29,0 | 76,5 | 63,2 | 89,7 | 5,3 | 0,0 | 15,3 | 86 |
| CA | 15,3 | 8,8 | 21,8 | 82,3 | 75,6 | 89,1 | 2,4 | 0,1 | 4,6 | 218 |
| UK | 15,3 | 3,4 | 27,2 | 84,7 | 72,8 | 96,6 | . | . | . | 49 |
| DE | 9,7 | 2,1 | 17,2 | 87,9 | 79,3 | 96,5 | 2,4 | 0,0 | 7,1 | 108 |
| NZ | 9,0 | 0,0 | 25,6 | 91,0 | 74,4 | 100,0 | . | . | . | 26 |
| CH | 4,6 | 0,2 | 9,1 | 95,4 | 90,9 | 99,8 | . | . | . | 119 |
| NO | 3,1 | 0,0 | 9,0 | 96,9 | 91,0 | 100,0 | . | . | . | 50 |
| FR | 3,0 | 0,3 | 5,8 | 97,0 | 94,2 | 99,7 | . | . | . | 139 |
| SE | 2,8 | 0,7 | 4,9 | 95,1 | 91,6 | 98,6 | 2,1 | 0,0 | 5,0 | 318 |
| NL | 2,6 | 0,0 | 7,6 | 97,4 | 92,4 | 100,0 | . | . | . | 65 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.133 Absence d'aide pour des raisons de coûts, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 9,9 | 5,3 | 14,5 | 90,0 | 85,4 | 94,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 366 |
| Homme | 11,7 | 2,0 | 21,4 | 88,3 | 78,6 | 98,0 | . | . | . | 95 |
| Femme | 9,2 | 4,2 | 14,3 | 90,6 | 85,6 | 95,7 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 271 |
| 65-69 ans | 16,9 | 2,9 | 30,9 | 82,4 | 68,4 | 96,4 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 51 |
| 70-74 ans | 17,2 | 0,3 | 34,2 | 82,8 | 65,8 | 99,7 | . | . | . | 50 |
| 75-79 ans | 9,2 | 0,0 | 19,6 | 90,8 | 80,4 | 100 | . | . | . | 70 |
| 80+ ans | 6,9 | 1,5 | 12,3 | 93,1 | 87,7 | 98,5 | . | . | . | 195 |
| Scolarité obligatoire | 8,7 | 2,3 | 15,1 | 91,3 | 84,9 | 97,7 | . | . | . | 151 |
| Secondaire II | 12,2 | 5,0 | 19,3 | 87,8 | 80,7 | 95,0 | . | . | . | 164 |
| Tertiaire | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 97,3 | 93,5 | 100,0 | 1,7 | 0,0 | 5,2 | 48 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 3,6 | 0,7 | 6,6 | 96,4 | 93,4 | 99,3 | . | . | . | 213 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 20,0 | 10,0 | 30,1 | 79,7 | 69,6 | 89,8 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 153 |
| Né en Suisse | 8,4 | 3,3 | 13,6 | 91,4 | 86,2 | 96,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 225 |
| Né à l'étranger | 13,5 | 4,2 | 22,8 | 86,5 | 77,2 | 95,8 | . | . | . | 141 |
| Medical Home | 9,4 | 2,4 | 16,4 | 90,4 | 83,4 | 97,4 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 159 |
| Sans Medical Home | 20,2 | 6,5 | 33,9 | 79,8 | 66,1 | 93,5 | . | . | . | 89 |
| Malade | 10,5 | 3,8 | 17,2 | 89,5 | 82,8 | 96,2 | . | . | . | 186 |
| Non-malade | 8,6 | 2,0 | 15,1 | 91,2 | 84,7 | 97,8 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 151 |
| Malade avec Medical Home | 6,9 | 0,0 | 14,0 | 93,1 | 86,0 | 100,0 | . | . | . | 90 |
| Malade sans Medical Home | 34,4 | 9,4 | 59,4 | 65,6 | 40,6 | 90,6 | . | . | . | 48 |
| Ville | 5,8 | 0,0 | 12,0 | 93,8 | 87,6 | 100,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 124 |
| Agglomération | 12,9 | 5,0 | 20,8 | 87,1 | 79,2 | 95,0 | . | . | . | 177 |
| Zone rurale | 13,0 | 1,0 | 25,0 | 87,0 | 75,0 | 99,0 | . | . | . | 48 |
| Suisse alémanique | 11,5 | 4,8 | 18,3 | 88,5 | 81,7 | 95,2 | . | . | . | 100 |
| Suisse romande | 5,2 | 1,6 | 8,7 | 94,8 | 91,3 | 98,4 | . | . | . | 219 |
| Suisse italienne | 13,1 | 3,1 | 23,2 | 85,5 | 75,2 | 95,8 | 1,4 | 0,0 | 4,1 | 47 |
| ZH | 5,9 | 0,0 | 14,0 | 94,1 | 86,0 | 100,0 | . | . | . | 32 |
| CH sans ZH | 10,7 | 5,5 | 15,9 | 89,2 | 84,0 | 94,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 334 |
| VD | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 95,0 | 88,0 | 100,0 | . | . | . | 39 |
| CH sans VD | 10,4 | 5,4 | 15,4 | 89,5 | 84,5 | 94,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 327 |
| VS | 5,7 | 0,0 | 16,7 | 94,3 | 83,3 | 100,0 | . | . | . | 35 |
| CH sans VS | 10,1 | 5,4 | 14,9 | 89,8 | 85,0 | 94,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 331 |
| GE | 10,4 | 4,8 | 16,1 | 89,6 | 83,9 | 95,2 | . | . | . | 131 |
| CH sans GE | 9,9 | 5,0 | 14,7 | 90,0 | 85,2 | 94,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 235 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.134 Absence d'aide pour des raisons de coûts, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | Échantillon n |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 4,6 | 0,1 | 9,1 | 95,4 | 90,9 | 99,9 | 119 |
| Homme | 3,2 | 0,0 | 8,7 | 96,8 | 91,3 | 100,0 | 48 |
| Femme | 5,5 | 0,0 | 12,0 | 94,5 | 88,0 | 100,0 | 71 |
| 65-69 ans | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 99,1 | 97,3 | 100,0 | 26 |
| 70-74 ans | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 99,1 | 97,3 | 100,0 | 25 |
| 75-79 ans | 24,5 | 1,8 | 47,3 | 75,5 | 52,7 | 98,2 | 21 |
| 80+ ans | . | . | . | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 47 |
| Scolarité obligatoire | 8,1 | 0,0 | 19,8 | 91,9 | 80,2 | 100,0 | 29 |
| Secondaire II | 3,5 | 0,0 | 7,8 | 96,5 | 92,2 | 100,0 | 71 |
| Tertiaire | . | . | . | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 16 |
| Revenu sup. à la moyenne | 14,9 | 0,0 | 41,5 | 85,1 | 58,5 | 100,0 | 13 |
| Revenu dans la moyenne | . | . | . | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 25 |
| Revenu inf. à la moyenne | 5,0 | 0,0 | 10,5 | 95,0 | 89,5 | 100,0 | 78 |
| Né en Suisse | 3,2 | 0,0 | 6,7 | 96,8 | 93,3 | 100,0 | 101 |
| Né à l'étranger | 13,4 | 0,0 | 36,0 | 86,6 | 64,0 | 100,0 | 18 |
| Ville | 3,9 | 0,0 | 10,0 | 96,1 | 90,0 | 100,0 | 34 |
| Agglomération | 4,6 | 0,0 | 12,8 | 95,4 | 87,2 | 100,0 | 52 |
| Zone rurale | 5,1 | 0,0 | 12,3 | 94,9 | 87,7 | 100,0 | 33 |
| Medical Home | 7,5 | 0,0 | 17,4 | 92,5 | 82,6 | 100,0 | 53 |
| Sans Medical Home | . | . | . | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 16 |
| Malade | 2,7 | 0,0 | 6,2 | 97,3 | 93,8 | 100,0 | 72 |
| Non-malade | 7,7 | 0,0 | 17,8 | 92,3 | 82,2 | 100,0 | 46 |
| Malade avec Medical Home | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 99,3 | 98,0 | 100,0 | 39 |
| Malade sans Medical Home | . | . | . | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 8 |
| Suisse alémanique | 3,5 | 0,0 | 8,7 | 96,5 | 91,3 | 100,0 | 63 |
| Suisse romande | 4,6 | 0,0 | 13,6 | 95,4 | 86,4 | 100,0 | 37 |
| Suisse italienne | 21,0 | 0,0 | 46,7 | 79,0 | 53,3 | 100,0 | 19 |
| VD | . | . | . | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 18 |
| CH sans VD | 5,0 | 0,1 | 9,9 | 95,0 | 90,1 | 99,9 | 101 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1411 : De manière générale, comment évaluez-vous votre probabilité de tomber ?
Base : Répondants âgés de 75 ans et plus.
Tableau 6.135 Risque auto-évalué de chute, comparaison internationale (2017, en %)

| | Elevé | | | Modéré | | | Faible | | | Aucun risque | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 13,8 | 10,3 | 17,4 | 32,6 | 28,1 | 37,0 | 45,2 | 40,4 | 50,0 | 6,0 | 3,4 | 8,5 | 2,4 | 0,7 | 4,2 | 706 |
| DE | 13,6 | 10,1 | 17,0 | 33,9 | 28,9 | 38,8 | 42,8 | 37,7 | 48,0 | 6,3 | 3,5 | 9,1 | 3,4 | 1,8 | 5,0 | 415 |
| SE | 12,4 | 11,0 | 13,9 | 38,0 | 35,9 | 40,1 | 42,1 | 40,0 | 44,2 | 4,8 | 3,9 | 5,7 | 2,7 | 2,0 | 3,3 | 3393 |
| UK | 11,1 | 7,2 | 15,0 | 35,1 | 29,5 | 40,7 | 45,1 | 39,4 | 50,8 | 5,3 | 2,8 | 7,8 | 3,3 | 1,3 | 5,3 | 351 |
| NL | 9,9 | 6,6 | 13,2 | 33,2 | 27,8 | 38,6 | 50,8 | 45,0 | 56,7 | 2,6 | 0,7 | 4,4 | 3,5 | 1,6 | 5,4 | 321 |
| NO | 8,2 | 4,4 | 12,0 | 39,2 | 32,4 | 46,0 | 48,9 | 42,0 | 55,8 | 2,6 | 0,4 | 4,8 | 1,1 | 0,0 | 2,5 | 277 |
| CA | 8,1 | 6,5 | 9,6 | 36,2 | 33,2 | 39,2 | 49,7 | 46,8 | 52,7 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,4 | 1,7 | 3,2 | 1989 |
| CH | 7,3 | 5,5 | 9,1 | 31,5 | 28,0 | 35,0 | 45,9 | 42,2 | 49,5 | 14,3 | 11,8 | 16,9 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 1456 |
| NZ | 6,5 | 2,0 | 11,1 | 22,9 | 15,7 | 30,2 | 56,0 | 47,2 | 64,8 | 14,6 | 8,4 | 20,7 | . | . | . | 152 |
| FR | 5,9 | 3,1 | 8,8 | 39,8 | 34,0 | 45,6 | 44,7 | 38,7 | 50,6 | 5,0 | 2,6 | 7,4 | 4,6 | 2,2 | 6,9 | 305 |
| AU | 4,4 | 2,8 | 6,0 | 38,9 | 32,4 | 45,3 | 49,0 | 42,5 | 55,5 | 7,1 | 4,9 | 9,4 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 812 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.136 Risque auto-évalué de chute, Suisse (2017, en %)

| | Elevé | | Modéré | | Faible | | Aucun risque | | NSP/NR | | Échantillon n | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | | IC limite inf. | IC limite sup. | | | |
| Total | 7,3 | 5,5 | 9,1 | 31,5 | 28,0 | 35,0 | 45,9 | 42,2 | 49,5 | 14,3 | 11,8 | 16,9 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 1456 |
| Homme | 3,4 | 1,6 | 5,1 | 24,6 | 19,7 | 29,5 | 51,3 | 45,8 | 56,9 | 20,1 | 15,7 | 24,6 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 660 |
| Femme | 9,9 | 7,1 | 12,7 | 36,1 | 31,4 | 40,8 | 42,2 | 37,4 | 47,1 | 10,5 | 7,5 | 13,5 | 1,3 | 0,2 | 2,3 | 796 |
| 75–79 ans | 2,5 | 1 | 4 | 28,6 | 23,6 | 33,5 | 49,1 | 43,8 | 54,4 | 19,6 | 15,4 | 23,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 697 |
| 80+ ans | 11,4 | 8,3 | 14,5 | 34 | 29,1 | 38,8 | 43,1 | 38,1 | 48,1 | 9,8 | 6,8 | 12,9 | 1,7 | 0,3 | 3 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 12,8 | 8,1 | 17,4 | 37,3 | 30,3 | 44,2 | 41,4 | 34,3 | 48,4 | 7,9 | 4,1 | 11,7 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 370 |
| Secondaire II | 5,4 | 3,4 | 7,5 | 29,8 | 25,3 | 34,2 | 48,0 | 43,3 | 52,8 | 15,7 | 12,3 | 19,1 | 1,1 | 0,1 | 2,0 | 790 |
| Tertiaire | 5,5 | 1,4 | 9,5 | 24,9 | 17,2 | 32,6 | 44,0 | 35,1 | 53,0 | 25,2 | 16,8 | 33,6 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 280 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 5,5 | 3,5 | 7,6 | 29,2 | 25,1 | 33,2 | 48,0 | 43,6 | 52,5 | 16,1 | 12,9 | 19,4 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 1013 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 11,2 | 7,5 | 14,9 | 36,8 | 30,3 | 43,2 | 41,0 | 34,6 | 47,5 | 10,3 | 6,4 | 14,1 | 0,7 | 0,0 | 1,9 | 443 |
| Né en Suisse | 6,7 | 4,6 | 8,7 | 32,2 | 28,2 | 36,2 | 47,0 | 42,8 | 51,3 | 13,1 | 10,3 | 16,0 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 983 |
| Né à l'étranger | 9,7 | 5,6 | 13,7 | 29,5 | 22,6 | 36,4 | 41,0 | 34,1 | 47,9 | 18,8 | 13,1 | 24,6 | 1,0 | 0,0 | 2,6 | 468 |
| Medical Home | 7,7 | 4,6 | 10,8 | 34,3 | 28,4 | 40,1 | 43,8 | 37,9 | 49,7 | 14,2 | 10,2 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 550 |
| Sans Medical Home | 8,7 | 4,1 | 13,3 | 36,1 | 27,4 | 44,7 | 46,2 | 37,4 | 55,1 | 8,8 | 4,3 | 13,3 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 303 |
| Malade | 11,8 | 7,9 | 15,7 | 37,2 | 31,1 | 43,3 | 38,2 | 32,1 | 44,2 | 11,2 | 7,5 | 15,0 | 1,6 | 0,0 | 3,4 | 527 |
| Non-malade | 4,7 | 2,8 | 6,6 | 27,8 | 23,6 | 32,1 | 50,3 | 45,7 | 55,0 | 16,6 | 13,1 | 20,0 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 879 |
| Malade avec Medical Home | 12,5 | 6,8 | 18,1 | 34,4 | 25,7 | 43,0 | 40,4 | 31,7 | 49,1 | 12,7 | 7,3 | 18,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 250 |
| Malade sans Medical Home | 17,0 | 5,2 | 28,8 | 50,7 | 34,8 | 66,7 | 26,3 | 12,7 | 39,9 | 5,9 | 1,0 | 10,9 | . | . | . | 111 |
| Ville | 7,0 | 3,9 | 10,1 | 28,9 | 23,0 | 34,9 | 49,1 | 42,6 | 55,5 | 14,4 | 9,9 | 18,8 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 500 |
| Agglomération | 6,7 | 4,2 | 9,2 | 32,7 | 27,7 | 37,8 | 44,8 | 39,5 | 50,1 | 14,1 | 10,5 | 17,8 | 1,7 | 0,2 | 3,1 | 731 |
| Zone rurale | 7,5 | 2,6 | 12,4 | 32,7 | 23,7 | 41,6 | 46,8 | 37,5 | 56,1 | 12,8 | 6,7 | 18,9 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 172 |
| Suisse alémanique | 5,8 | 3,5 | 8,0 | 32,6 | 28,1 | 37,1 | 46,5 | 41,8 | 51,2 | 14,1 | 10,8 | 17,4 | 1,1 | 0,1 | 2,0 | 496 |
| Suisse romande | 11,4 | 8,0 | 14,9 | 28,1 | 23,5 | 32,8 | 43,8 | 38,8 | 48,8 | 16,2 | 12,4 | 19,9 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 801 |
| Suisse italienne | 11,9 | 6,6 | 17,1 | 29,6 | 22,4 | 36,8 | 45,9 | 38,0 | 53,8 | 10,8 | 5,7 | 15,9 | 1,9 | 0,0 | 4,1 | 159 |
| ZH | 5,4 | 1,9 | 8,8 | 28,5 | 21,2 | 35,8 | 52,2 | 44,2 | 60,2 | 12,9 | 7,7 | 18,2 | 1,1 | 0,0 | 2,6 | 159 |
| CH sans ZH | 7,7 | 5,6 | 9,8 | 32,1 | 28,2 | 36,0 | 44,5 | 40,5 | 48,6 | 14,6 | 11,8 | 17,5 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 1297 |
| VD | 11,4 | 5,5 | 17,3 | 30,3 | 22,0 | 38,5 | 41,2 | 32,6 | 49,9 | 16,2 | 9,8 | 22,6 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | 132 |
| CH sans VD | 7,0 | 5,1 | 8,9 | 31,6 | 27,9 | 35,3 | 46,3 | 42,4 | 50,1 | 14,2 | 11,5 | 16,9 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 1324 |
| VS | 7,8 | 3,1 | 12,4 | 21,3 | 14,2 | 28,3 | 53,1 | 44,4 | 61,9 | 17,2 | 10,1 | 24,2 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 145 |
| CH sans VS | 7,3 | 5,4 | 9,2 | 31,9 | 28,3 | 35,5 | 45,6 | 41,8 | 49,4 | 14,2 | 11,6 | 16,9 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 1311 |
| GE | 10,9 | 8,0 | 13,7 | 29,0 | 24,8 | 33,2 | 43,3 | 38,8 | 47,9 | 16,2 | 12,8 | 19,7 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 505 |
| CH sans GE | 7,1 | 5,2 | 9,0 | 31,6 | 28,0 | 35,3 | 46,0 | 42,2 | 49,9 | 14,2 | 11,6 | 16,9 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 951 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1411a : Avez-vous parlé avec votre médecin des chutes ?

Base : Répondants déclarant une probabilité de tomber modérée ou élevée.

Tableau 6.137 Discussion avec le médecin sur les risques de chute, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| FR | 65,0 | 56,6 | 73,5 | 33,7 | 25,3 | 42,0 | 1,3 | 0,0 | 3,1 | 142 |
| AU | 63,1 | 53,1 | 73,0 | 36,4 | 26,5 | 46,3 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 318 |
| US | 62,7 | 55,9 | 69,6 | 36,2 | 29,4 | 43,0 | 1,1 | 0,0 | 2,5 | 318 |
| NZ | 56,4 | 40,6 | 72,2 | 43,6 | 27,8 | 59,4 | . | . | . | 47 |
| CH | 51,1 | 45,2 | 57,1 | 48,8 | 42,8 | 54,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 549 |
| CA | 45,2 | 40,6 | 49,9 | 53,9 | 49,2 | 58,6 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 896 |
| UK | 43,4 | 34,5 | 52,2 | 54,1 | 45,2 | 63,0 | 2,6 | 0,0 | 5,5 | 149 |
| DE | 39,3 | 32,0 | 46,6 | 60,7 | 53,4 | 68,0 | . | . | . | 200 |
| NO | 31,7 | 22,1 | 41,4 | 66,7 | 56,9 | 76,4 | 1,6 | 0,0 | 4,1 | 126 |
| SE | 30,9 | 28,1 | 33,8 | 68,4 | 65,6 | 71,2 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 1685 |
| NL | 29,9 | 22,3 | 37,5 | 68,5 | 60,7 | 76,3 | 1,6 | 0,0 | 4,1 | 151 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.138 Discussion avec le médecin sur les risques de chute, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 51,1 | 45,1 | 57,1 | 48,8 | 42,8 | 54,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 549 |
| Homme | 44,7 | 34,0 | 55,4 | 55,0 | 44,3 | 65,7 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 183 |
| Femme | 53,8 | 46,5 | 61,0 | 46,2 | 39,0 | 53,5 | . | . | . | 366 |
| 75–79 ans | 49,3 | 39,4 | 59,1 | 50,7 | 40,9 | 60,6 | . | . | . | 206 |
| 80+ ans | 52,2 | 44,7 | 59,8 | 47,6 | 40 | 55,2 | 0,1 | 0 | 0,4 | 343 |
| Scolarité obligatoire | 52,7 | 42,6 | 62,9 | 47,0 | 36,8 | 57,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 184 |
| Secondaire II | 49,8 | 41,7 | 58,0 | 50,2 | 42,0 | 58,3 | . | . | . | 267 |
| Tertiaire | 56,0 | 39,9 | 72,0 | 44,0 | 28,0 | 60,1 | . | . | . | 94 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 51,7 | 44,0 | 59,3 | 48,2 | 40,5 | 55,9 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 338 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 50,3 | 40,7 | 59,8 | 49,7 | 40,2 | 59,3 | . | . | . | 211 |
| Né en Suisse | 47,3 | 40,5 | 54,1 | 52,7 | 45,9 | 59,5 | . | . | . | 370 |
| Né à l'étranger | 64,7 | 53,0 | 76,3 | 34,9 | 23,3 | 46,6 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 179 |
| Medical Home | 56,0 | 46,3 | 65,6 | 43,8 | 34,2 | 53,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 220 |
| Sans Medical Home | 45,2 | 32,1 | 58,4 | 54,8 | 41,6 | 67,9 | . | . | . | 132 |
| Malade | 57,6 | 48,5 | 66,6 | 42,4 | 33,4 | 51,5 | . | . | . | 251 |
| Non-malade | 43,7 | 35,4 | 52,1 | 56,1 | 47,8 | 64,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 270 |
| Malade avec Medical Home | 58,8 | 45,5 | 72,2 | 41,2 | 27,8 | 54,5 | . | . | . | 114 |
| Malade sans Medical Home | 57,5 | 36,9 | 78,1 | 42,5 | 21,9 | 63,1 | . | . | . | 63 |
| Ville | 57,4 | 46,6 | 68,2 | 42,6 | 31,8 | 53,4 | . | . | . | 183 |
| Agglomération | 54,3 | 45,7 | 62,9 | 45,6 | 37,0 | 54,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 283 |
| Zone rurale | 38,8 | 24,4 | 53,2 | 61,2 | 46,8 | 75,6 | . | . | . | 61 |
| Suisse alémanique | 46,4 | 38,6 | 54,2 | 53,6 | 45,8 | 61,4 | . | . | . | 179 |
| Suisse romande | 66,0 | 58,1 | 74,0 | 34,0 | 26,0 | 41,9 | . | . | . | 304 |
| Suisse italienne | 56,5 | 44,2 | 68,8 | 42,1 | 29,8 | 54,4 | 1,4 | 0,0 | 4,1 | 66 |
| ZH | 49,0 | 35,0 | 63,0 | 51,0 | 37,0 | 65,0 | . | . | . | 53 |
| CH sans ZH | 51,5 | 44,9 | 58,1 | 48,4 | 41,8 | 55,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 496 |
| VD | 65,6 | 52,0 | 79,2 | 34,4 | 20,8 | 48,0 | . | . | . | 51 |
| CH sans VD | 49,9 | 43,5 | 56,3 | 50,0 | 43,6 | 56,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 498 |
| VS | 67,8 | 52,8 | 82,7 | 32,2 | 17,3 | 47,2 | . | . | . | 42 |
| CH sans VS | 50,6 | 44,4 | 56,8 | 49,3 | 43,1 | 55,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 507 |
| GE | 62,5 | 55,4 | 69,6 | 37,5 | 30,4 | 44,6 | . | . | . | 199 |
| CH sans GE | 50,5 | 44,2 | 56,8 | 49,4 | 43,1 | 55,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 350 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1412 : À quelle fréquence vous sentez-vous isolé/e des autres ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.139 Sentiment d'isolement, comparaison internationale (2017, en %)

| | Presque jamais ou jamais | | | Parfois | | | Souvent | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| DE | 89,5 | 87,1 | 91,8 | 7,4 | 5,4 | 9,3 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 751 |
| NZ | 84,6 | 80,8 | 88,4 | 13,2 | 9,6 | 16,8 | 2,2 | 0,7 | 3,7 | . | . | . | 500 |
| CH | 84,3 | 82,6 | 86,1 | 12,8 | 11,2 | 14,4 | 2,4 | 1,7 | 3,1 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 3238 |
| SE | 82,9 | 81,8 | 84,0 | 12,5 | 11,5 | 13,4 | 4,3 | 3,7 | 4,9 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 7000 |
| NL | 82,7 | 80,0 | 85,5 | 13,2 | 10,8 | 15,7 | 4,0 | 2,6 | 5,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 750 |
| CA | 82,1 | 80,5 | 83,6 | 12,1 | 10,7 | 13,5 | 4,6 | 3,8 | 5,4 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 4549 |
| NO | 81,6 | 78,3 | 85,0 | 12,5 | 9,7 | 15,4 | 5,5 | 3,4 | 7,5 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 750 |
| UK | 80,1 | 76,9 | 83,2 | 12,7 | 10,1 | 15,3 | 5,4 | 3,6 | 7,2 | 1,9 | 0,9 | 2,9 | 753 |
| US | 77,6 | 74,6 | 80,6 | 15,3 | 12,7 | 17,9 | 6,1 | 4,4 | 7,9 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 1392 |
| AU | 74,8 | 71,6 | 77,9 | 20,1 | 17,4 | 22,9 | 4,5 | 2,8 | 6,2 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2500 |
| FR | 68,0 | 64,5 | 71,6 | 24,0 | 20,8 | 27,3 | 7,3 | 5,2 | 9,5 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.140 Sentiment d'isolement, Suisse (2017, en %)

| | Presque jamais ou jamais | | | Parfois | | | Souvent | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 84,3 | 82,6 | 86,1 | 12,8 | 11,2 | 14,4 | 2,4 | 1,7 | 3,1 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 3238 |
| Homme | 87,5 | 85,1 | 89,8 | 10,4 | 8,2 | 12,6 | 1,7 | 0,9 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 1526 |
| Femme | 81,8 | 79,3 | 84,3 | 14,7 | 12,4 | 17,0 | 2,9 | 1,9 | 4,0 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1712 |
| 65–69 ans | 85,7 | 82,4 | 88,9 | 12,8 | 9,6 | 15,9 | 1,6 | 0,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 828 |
| 70–74 ans | 89,8 | 87,3 | 92,4 | 8,2 | 5,9 | 10,5 | 1,4 | 0,4 | 2,3 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 954 |
| 75–79 ans | 84,4 | 80,7 | 88,1 | 11,5 | 8,2 | 14,8 | 3,4 | 1,5 | 5,4 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 697 |
| 80+ ans | 77,1 | 73,0 | 81,3 | 18,6 | 14,7 | 22,6 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 76,6 | 72,4 | 80,9 | 18,4 | 14,5 | 22,3 | 4,0 | 2,1 | 5,9 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 706 |
| Secondaire II | 87,1 | 85,0 | 89,1 | 11,0 | 9,0 | 12,9 | 1,7 | 1,0 | 2,4 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1765 |
| Tertiaire | 84,8 | 80,7 | 89,0 | 12,0 | 8,1 | 15,8 | 2,6 | 1,0 | 4,2 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 86,8 | 84,9 | 88,7 | 10,9 | 9,1 | 12,7 | 1,9 | 1,2 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 77,1 | 73,2 | 81,1 | 18,2 | 14,5 | 21,9 | 3,8 | 2,2 | 5,4 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 807 |
| Né en Suisse | 85,9 | 83,9 | 87,8 | 11,3 | 9,6 | 13,1 | 2,5 | 1,7 | 3,3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 2217 |
| Né à l'étranger | 78,5 | 74,6 | 82,4 | 18,3 | 14,5 | 22,0 | 2,0 | 1,1 | 2,9 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | 1015 |
| Medical Home | 86,0 | 83,3 | 88,7 | 12,1 | 9,6 | 14,6 | 1,7 | 0,8 | 2,7 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1249 |
| Sans Medical Home | 76,5 | 72,0 | 80,9 | 18,4 | 14,3 | 22,5 | 4,7 | 2,6 | 6,7 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 726 |
| Malade | 78,6 | 74,9 | 82,3 | 17,3 | 13,8 | 20,7 | 3,9 | 2,3 | 5,5 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 948 |
| Non-malade | 87,8 | 85,9 | 89,6 | 9,9 | 8,2 | 11,7 | 1,7 | 1,0 | 2,4 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 80,5 | 75,4 | 85,5 | 16,6 | 11,8 | 21,4 | 2,8 | 0,9 | 4,7 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 70,8 | 60,9 | 80,7 | 21,9 | 12,6 | 31,3 | 7,0 | 2,2 | 11,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 210 |
| Ville | 82,9 | 79,6 | 86,1 | 13,4 | 10,4 | 16,4 | 3,4 | 1,9 | 4,9 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1026 |
| Agglomération | 85,5 | 83,1 | 88,0 | 11,2 | 9,0 | 13,4 | 2,6 | 1,5 | 3,7 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 1643 |
| Zone rurale | 82,9 | 78,8 | 87,1 | 15,8 | 11,7 | 19,9 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 454 |
| Suisse alémanique | 86,4 | 84,1 | 88,7 | 11,5 | 9,3 | 13,6 | 1,8 | 1,0 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1040 |
| Suisse romande | 79,9 | 77,3 | 82,5 | 15,9 | 13,4 | 18,3 | 3,4 | 2,3 | 4,6 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 1869 |
| Suisse italienne | 77,1 | 72,5 | 81,8 | 16,3 | 12,1 | 20,4 | 4,8 | 2,5 | 7,1 | 1,8 | 0,5 | 3,1 | 329 |
| ZH | 87,2 | 83,5 | 91,0 | 10,9 | 7,3 | 14,4 | 1,9 | 0,4 | 3,4 | . | . | . | 332 |
| CH sans ZH | 83,7 | 81,8 | 85,7 | 13,2 | 11,4 | 15,0 | 2,5 | 1,7 | 3,3 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 2906 |
| VD | 82,0 | 77,5 | 86,4 | 13,5 | 9,5 | 17,5 | 3,6 | 1,5 | 5,8 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 324 |
| CH sans VD | 84,5 | 82,7 | 86,4 | 12,7 | 11,0 | 14,5 | 2,3 | 1,6 | 3,0 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 2914 |
| VS | 79,6 | 74,7 | 84,4 | 16,2 | 11,8 | 20,7 | 3,6 | 1,5 | 5,7 | 0,6 | 0,0 | 1,8 | 321 |
| CH sans VS | 84,5 | 82,7 | 86,3 | 12,6 | 11,0 | 14,3 | 2,3 | 1,6 | 3,0 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 2917 |
| GE | 77,8 | 75,3 | 80,4 | 17,5 | 15,1 | 19,9 | 3,8 | 2,7 | 5,0 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 1160 |
| CH sans GE | 84,7 | 82,9 | 86,5 | 12,5 | 10,8 | 14,2 | 2,3 | 1,6 | 3,0 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1414 : Est-ce que vous apportez des soins ou de l'assistance au moins une fois par semaine à une ou plusieurs personnes qui ont des problèmes liés à l'âge, des maladies chroniques ou des handicaps ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.141 Fournit des soins ou de l'assistance, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| NO | 26,5 | 22,7 | 30,2 | 72,9 | 69,1 | 76,6 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 750 |
| DE | 23,8 | 20,3 | 27,2 | 75,4 | 71,9 | 78,8 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 751 |
| NL | 22,5 | 19,2 | 25,7 | 77,1 | 73,8 | 80,4 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 750 |
| SE | 21,3 | 20,0 | 22,5 | 78,5 | 77,3 | 79,7 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 7000 |
| UK | 20,7 | 17,4 | 24,0 | 78,3 | 75,0 | 81,7 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 753 |
| CA | 20,4 | 18,8 | 22,0 | 79,0 | 77,4 | 80,6 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 4549 |
| US | 20,2 | 17,5 | 23,0 | 79,0 | 76,2 | 81,8 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 1392 |
| AU | 15,5 | 12,5 | 18,5 | 84,0 | 80,9 | 87,0 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 2500 |
| CH | 14,9 | 13,2 | 16,6 | 85,0 | 83,3 | 86,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 3238 |
| NZ | 13,9 | 10,3 | 17,5 | 84,8 | 81,2 | 88,5 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | 500 |
| FR | 7,3 | 5,2 | 9,3 | 92,7 | 90,7 | 94,8 | . | . | . | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.142 Fournit des soins ou de l'assistance, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| NO | 27,5 | 23,2 | 31,7 | 72,5 | 68,3 | 76,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 651 |
| DE | 25,2 | 20,4 | 30,0 | 74,8 | 70,0 | 79,6 | . | . | . | 547 |
| AU | 22,6 | 17,2 | 28,0 | 77,0 | 71,6 | 82,4 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1670 |
| SE | 20,1 | 18,6 | 21,7 | 79,4 | 77,9 | 80,9 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 5000 |
| NL | 20,0 | 16,0 | 23,9 | 79,9 | 75,9 | 83,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 582 |
| US | 19,0 | 16,1 | 21,9 | 80,8 | 77,9 | 83,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1116 |
| CA | 16,5 | 14,6 | 18,3 | 83,2 | 81,4 | 85,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 3147 |
| NZ | 14,7 | 9,8 | 19,6 | 84,9 | 80,0 | 89,8 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 379 |
| UK | 14,1 | 10,6 | 17,5 | 85,5 | 82,0 | 89,0 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 581 |
| CH | 12,9 | 10,6 | 15,2 | 87,1 | 84,8 | 89,4 | . | . | . | 1084 |
| FR | 3,3 | 2,2 | 4,5 | 96,7 | 95,5 | 97,8 | . | . | . | 860 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.143 Fournit des soins ou de l'assistance, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 14,9 | 13,2 | 16,6 | 85,0 | 83,3 | 86,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 3238 |
| Homme | 13,5 | 11,0 | 16,0 | 86,4 | 84,0 | 88,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1526 |
| Femme | 16,0 | 13,6 | 18,4 | 83,8 | 81,4 | 86,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1712 |
| 65-69 ans | 16,2 | 12,9 | 19,6 | 83,8 | 80,4 | 87,1 | . | . | . | 828 |
| 70-74 ans | 15,9 | 12,6 | 19,2 | 84,1 | 80,7 | 87,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 954 |
| 75-79 ans | 12,5 | 9,1 | 16,0 | 87,2 | 83,8 | 90,7 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 697 |
| 80+ ans | 14,4 | 10,8 | 18,0 | 85,4 | 81,8 | 89,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 11,8 | 8,6 | 15,0 | 88,1 | 85,0 | 91,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 706 |
| Secondaire II | 15,8 | 13,5 | 18,1 | 84,1 | 81,8 | 86,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1765 |
| Tertiaire | 16,7 | 12,7 | 20,7 | 83,2 | 79,2 | 87,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 16,2 | 14,1 | 18,3 | 83,6 | 81,6 | 85,7 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 11,1 | 8,3 | 14,0 | 88,9 | 86,0 | 91,7 | . | . | . | 807 |
| Né en Suisse | 15,3 | 13,3 | 17,3 | 84,6 | 82,6 | 86,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2217 |
| Né à l'étranger | 13,6 | 10,1 | 17,0 | 86,4 | 83,0 | 89,9 | . | . | . | 1015 |
| Medical Home | 14,5 | 11,7 | 17,2 | 85,5 | 82,8 | 88,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1249 |
| Sans Medical Home | 15,7 | 11,7 | 19,6 | 84,3 | 80,4 | 88,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 726 |
| Malade | 14,8 | 11,6 | 18,0 | 85,2 | 82,0 | 88,4 | . | . | . | 948 |
| Non-malade | 15,1 | 13,0 | 17,2 | 84,8 | 82,7 | 86,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 15,7 | 10,7 | 20,6 | 84,3 | 79,4 | 89,3 | . | . | . | 463 |
| Malade sans Medical Home | 13,4 | 7,3 | 19,4 | 86,6 | 80,6 | 92,7 | . | . | . | 210 |
| Ville | 18,8 | 15,2 | 22,4 | 81,2 | 77,6 | 84,8 | . | . | . | 1026 |
| Agglomération | 12,1 | 9,8 | 14,3 | 87,8 | 85,5 | 90,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1643 |
| Zone rurale | 15,0 | 11,0 | 18,9 | 84,9 | 81,0 | 88,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 454 |
| Suisse alémanique | 13,4 | 11,2 | 15,7 | 86,5 | 84,3 | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1040 |
| Suisse romande | 19,3 | 16,7 | 21,9 | 80,4 | 77,8 | 83,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1869 |
| Suisse italienne | 14,0 | 10,1 | 17,9 | 85,4 | 81,4 | 89,4 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 329 |
| ZH | 11,8 | 8,3 | 15,4 | 88,0 | 84,4 | 91,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 332 |
| CH sans ZH | 15,5 | 13,6 | 17,5 | 84,4 | 82,4 | 86,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2906 |
| VD | 19,1 | 14,7 | 23,6 | 80,7 | 76,2 | 85,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 14,5 | 12,6 | 16,3 | 85,4 | 83,6 | 87,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2914 |
| VS | 20,4 | 15,7 | 25,2 | 79,4 | 74,7 | 84,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 321 |
| CH sans VS | 14,6 | 12,8 | 16,4 | 85,2 | 83,5 | 87,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2917 |
| GE | 18,3 | 15,9 | 20,6 | 81,6 | 79,3 | 83,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1160 |
| CH sans GE | 14,7 | 12,9 | 16,5 | 85,2 | 83,4 | 87,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.144 Fournit des soins ou de l'assistance, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | Échantillon |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 12,9 | 10,6 | 15,2 | 87,1 | 84,8 | 89,4 | 1084 |
| Homme | 14,9 | 11,4 | 18,4 | 85,1 | 81,6 | 88,6 | 493 |
| Femme | 11,4 | 8,4 | 14,4 | 88,6 | 85,6 | 91,6 | 591 |
| 65-69 ans | 12,3 | 8,5 | 16,1 | 87,7 | 83,9 | 91,5 | 349 |
| 70-74 ans | 13,0 | 9,0 | 17,1 | 87,0 | 82,9 | 91,0 | 300 |
| 75-79 ans | 14,2 | 8,8 | 19,7 | 85,8 | 80,3 | 91,2 | 209 |
| 80+ ans | 12,3 | 7,0 | 17,5 | 87,7 | 82,5 | 93,0 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 8,8 | 4,8 | 12,9 | 91,2 | 87,1 | 95,2 | 216 |
| Secondaire II | 13,3 | 10,3 | 16,4 | 86,7 | 83,6 | 89,7 | 628 |
| Tertiaire | 18,5 | 12,9 | 24,1 | 81,5 | 75,9 | 87,1 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 13,6 | 8,2 | 18,9 | 86,4 | 81,1 | 91,8 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 8,3 | 4,5 | 12,0 | 91,7 | 88,0 | 95,5 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 14,2 | 11,1 | 17,4 | 85,8 | 82,6 | 88,9 | 645 |
| Né en Suisse | 13,5 | 10,9 | 16,1 | 86,5 | 83,9 | 89,1 | 863 |
| Né à l'étranger | 10,3 | 5,1 | 15,5 | 89,7 | 84,5 | 94,9 | 220 |
| Ville | 13,2 | 8,6 | 17,7 | 86,8 | 82,3 | 91,4 | 293 |
| Agglomération | 12,3 | 9,2 | 15,4 | 87,7 | 84,6 | 90,8 | 540 |
| Zone rurale | 13,7 | 8,7 | 18,7 | 86,3 | 81,3 | 91,3 | 251 |
| Medical Home | 17,9 | 13,4 | 22,4 | 82,1 | 77,6 | 86,6 | 392 |
| Sans Medical Home | 9,3 | 4,8 | 13,9 | 90,7 | 86,1 | 95,2 | 180 |
| Malade | 11,9 | 8,1 | 15,8 | 88,1 | 84,2 | 91,9 | 305 |
| Non-malade | 13,3 | 10,5 | 16,2 | 86,7 | 83,8 | 89,5 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 16,7 | 10,0 | 23,4 | 83,3 | 76,6 | 90,0 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 8,2 | 0,4 | 15,9 | 91,8 | 84,1 | 99,6 | 52 |
| Suisse alémanique | 11,8 | 8,9 | 14,7 | 88,2 | 85,3 | 91,1 | 551 |
| Suisse romande | 15,7 | 11,6 | 19,9 | 84,3 | 80,1 | 88,4 | 355 |
| Suisse italienne | 15,2 | 9,3 | 21,1 | 84,8 | 78,9 | 90,7 | 178 |
| VD | 11,9 | 7,1 | 16,6 | 88,1 | 83,4 | 92,9 | 178 |
| CH sans VD | 13,0 | 10,5 | 15,5 | 87,0 | 84,5 | 89,5 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1408 : Est-ce qu'un médecin vous a déjà dit que vous avez ... ?

- De l'hypertension ou une haute pression sanguine. (A1)
- Une maladie cardiaque, y compris une crise cardiaque. (A2)
- Du diabète. (A3)
- De l'asthme ou une maladie pulmonaire chronique comme de la bronchite chronique, emphysème ou bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). (A4)
- Une dépression, anxiété ou d'autres problèmes psychiques. (A5)
- Un cancer. (A6)
- Des douleurs articulaires ou de l'arthrite. (A8)
- Une attaque cérébrale, un AVC. (A9)
- Des problèmes neurologiques comme la démence, la maladie d'Alzheimer. (A10)

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.145 S'est vu diagnostiquer de l'hypertension ou une haute pression sanguine, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 60,1 | 56,7 | 63,4 | 38,4 | 35,1 | 41,7 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 1392 |
| DE | 53,4 | 49,5 | 57,4 | 45,0 | 41,0 | 48,9 | 1,0 | 0,1 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 751 |
| SE | 52,0 | 50,6 | 53,5 | 44,8 | 43,3 | 46,3 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 7000 |
| CA | 49,7 | 47,8 | 51,7 | 48,8 | 46,8 | 50,8 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 4549 |
| UK | 48,1 | 44,1 | 52,1 | 49,4 | 45,4 | 53,4 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | 2,6 | 753 |
| NO | 45,9 | 41,6 | 50,2 | 52,1 | 47,8 | 56,4 | 1,8 | 0,7 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 750 |
| CH | 45,5 | 43,1 | 48,0 | 52,1 | 49,6 | 54,5 | 2,3 | 1,5 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 3238 |
| NL | 43,4 | 39,5 | 47,2 | 55,4 | 51,5 | 59,2 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 750 |
| FR | 43,3 | 39,4 | 47,1 | 56,1 | 52,2 | 60,0 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 750 |
| AU | 42,9 | 39,0 | 46,8 | 56,1 | 52,3 | 60,0 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 2500 |
| NZ | 37,0 | 32,0 | 42,0 | 61,1 | 56,0 | 66,1 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 500 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.146 S'est vu diagnostiquer de l'hypertension ou une haute pression sanguine, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| US | 63,0 | 59,5 | 66,6 | 36,4 | 32,8 | 39,9 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 1116 | |
| DE | 55,4 | 50,2 | 60,7 | 43,9 | 38,6 | 49,1 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 547 | |
| CA | 51,7 | 49,3 | 54,1 | 47,4 | 45,1 | 49,8 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 3147 | |
| AU | 50,2 | 44,5 | 55,8 | 49,1 | 43,5 | 54,8 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 1670 | |
| SE | 48,2 | 46,3 | 50,2 | 51,4 | 49,4 | 53,3 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 5000 | |
| NL | 46,7 | 41,6 | 51,9 | 52,5 | 47,3 | 57,7 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 582 | |
| CH | 46,0 | 42,3 | 49,7 | 53,5 | 49,8 | 57,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1084 | |
| NO | 44,1 | 39,4 | 48,8 | 55,7 | 50,9 | 60,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 651 | |
| UK | 38,7 | 34,0 | 43,4 | 61,2 | 56,5 | 65,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 581 | |
| FR | 36,5 | 32,6 | 40,4 | 63,5 | 59,6 | 67,4 | . | . | . | 860 | |
| NZ | 32,9 | 26,4 | 39,3 | 66,8 | 60,3 | 73,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 379 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.147 S'est vu diagnostiquer de l'hypertension ou une haute pression sanguine, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 45,5 | 43,1 | 48,0 | 52,1 | 49,6 | 54,5 | 2,3 | 1,5 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 3238 |
| Homme | 44,9 | 41,3 | 48,5 | 52,2 | 48,6 | 55,8 | 2,8 | 1,5 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1526 |
| Femme | 46,1 | 42,7 | 49,5 | 52,0 | 48,6 | 55,4 | 1,9 | 0,9 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1712 |
| 65-69 ans | 39,1 | 34,4 | 43,7 | 58,7 | 54,0 | 63,4 | 2,2 | 0,8 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 828 |
| 70-74 ans | 43,3 | 38,7 | 47,9 | 54,4 | 49,8 | 59,0 | 1,9 | 0,7 | 3,2 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 954 |
| 75-79 ans | 48,9 | 43,6 | 54,3 | 48,3 | 43,0 | 53,6 | 2,7 | 0,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 697 |
| 80+ ans | 52,3 | 47,2 | 57,3 | 45,3 | 40,3 | 50,4 | 2,3 | 0,7 | 3,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 54,1 | 49,0 | 59,2 | 43,7 | 38,6 | 48,8 | 2,2 | 0,6 | 3,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 706 |
| Secondaire II | 44,0 | 40,8 | 47,2 | 53,6 | 50,4 | 56,7 | 2,4 | 1,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1765 |
| Tertiaire | 37,6 | 32,3 | 42,9 | 60,0 | 54,6 | 65,4 | 1,8 | 0,0 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 46,2 | 43,3 | 49,0 | 51,6 | 48,8 | 54,5 | 2,0 | 1,2 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 43,8 | 39,0 | 48,6 | 53,3 | 48,5 | 58,1 | 2,9 | 1,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 807 |
| Né en Suisse | 44,2 | 41,4 | 47,1 | 53,7 | 50,9 | 56,6 | 2,0 | 1,2 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2217 |
| Né à l'étranger | 50,7 | 45,7 | 55,6 | 45,8 | 40,9 | 50,6 | 3,3 | 1,5 | 5,1 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1015 |
| Medical Home | 54,9 | 50,9 | 58,8 | 44,1 | 40,1 | 48,0 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1249 |
| Sans Medical Home | 40,2 | 34,8 | 45,6 | 57,1 | 51,6 | 62,6 | 2,6 | 0,7 | 4,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 726 |
| Ville | 48,0 | 43,4 | 52,5 | 49,6 | 45,1 | 54,2 | 2,3 | 0,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1026 |
| Agglomération | 43,0 | 39,5 | 46,6 | 54,4 | 50,9 | 58,0 | 2,5 | 1,3 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1643 |
| Zone rurale | 46,5 | 40,8 | 52,2 | 51,8 | 46,1 | 57,5 | 1,6 | 0,2 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 454 |
| Suisse alémanique | 45,6 | 42,3 | 48,9 | 52,0 | 48,7 | 55,3 | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1040 |
| Suisse romande | 46,4 | 43,0 | 49,7 | 51,0 | 47,6 | 54,3 | 2,4 | 1,4 | 3,4 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 1869 |
| Suisse italienne | 41,4 | 35,9 | 46,9 | 57,4 | 51,9 | 62,9 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 329 |
| ZH | 46,7 | 41,1 | 52,3 | 52,0 | 46,5 | 57,6 | 1,3 | 0,0 | 2,5 | . | . | . | 332 |
| CH sans ZH | 45,3 | 42,6 | 48,0 | 52,1 | 49,3 | 54,8 | 2,5 | 1,6 | 3,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2906 |
| VD | 46,4 | 40,8 | 52,1 | 50,8 | 45,1 | 56,4 | 2,5 | 0,7 | 4,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 324 |
| CH sans VD | 45,5 | 42,8 | 48,1 | 52,2 | 49,6 | 54,8 | 2,2 | 1,4 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2914 |
| VS | 42,8 | 36,9 | 48,6 | 54,7 | 48,8 | 60,6 | 2,5 | 0,6 | 4,5 | . | . | . | 321 |
| CH sans VS | 45,7 | 43,1 | 48,2 | 52,0 | 49,4 | 54,5 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2917 |
| GE | 46,4 | 43,3 | 49,4 | 50,6 | 47,5 | 53,7 | 2,4 | 1,4 | 3,4 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1160 |
| CH sans GE | 45,5 | 42,9 | 48,1 | 52,2 | 49,6 | 54,8 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.148 S'est vu diagnostiquer de l'hypertension ou une haute pression sanguine, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 46,0 | 42,3 | 49,7 | 53,5 | 49,8 | 57,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1084 |
| Homme | 50,0 | 44,3 | 55,7 | 49,6 | 43,9 | 55,3 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 493 |
| Femme | 43,0 | 38,2 | 47,9 | 56,5 | 51,6 | 61,4 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 591 |
| 65-69 ans | 41,1 | 34,4 | 47,8 | 58,8 | 52,1 | 65,5 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 349 |
| 70-74 ans | 41,9 | 35,0 | 48,8 | 57,9 | 51,0 | 64,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 300 |
| 75-79 ans | 50,0 | 41,9 | 58,2 | 48,4 | 40,3 | 56,5 | 1,6 | 0,0 | 3,5 | 209 |
| 80+ ans | 52,4 | 44,4 | 60,4 | 47,6 | 39,6 | 55,6 | . | . | . | 226 |
| Scolarité obligatoire | 52,4 | 43,9 | 60,9 | 47,2 | 38,7 | 55,7 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 216 |
| Secondaire II | 44,5 | 39,9 | 49,2 | 55,4 | 50,8 | 60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 628 |
| Tertiaire | 43,3 | 35,1 | 51,5 | 55,4 | 47,1 | 63,6 | 1,4 | 0,0 | 3,4 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 44,5 | 35,7 | 53,4 | 55,5 | 46,6 | 64,3 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 32,9 | 25,0 | 40,7 | 66,2 | 58,3 | 74,1 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 50,5 | 45,7 | 55,3 | 49,2 | 44,4 | 54,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 645 |
| Né en Suisse | 44,6 | 40,6 | 48,7 | 55,1 | 51,0 | 59,2 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 863 |
| Né à l'étranger | 51,9 | 42,9 | 60,9 | 46,9 | 37,9 | 55,9 | 1,2 | 0,0 | 2,7 | 220 |
| Ville | 49,8 | 42,4 | 57,2 | 50,0 | 42,6 | 57,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 293 |
| Agglomération | 43,2 | 38,0 | 48,4 | 56,0 | 50,8 | 61,3 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 540 |
| Zone rurale | 47,5 | 39,9 | 55,0 | 52,4 | 44,9 | 60,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 251 |
| Medical Home | 47,5 | 41,3 | 53,7 | 52,4 | 46,1 | 58,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 392 |
| Sans Medical Home | 46,3 | 36,8 | 55,8 | 53,3 | 43,8 | 62,8 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 180 |
| Suisse alémanique | 48,7 | 43,9 | 53,5 | 50,9 | 46,1 | 55,7 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 551 |
| Suisse romande | 39,8 | 33,8 | 45,7 | 59,8 | 53,9 | 65,7 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 355 |
| Suisse italienne | 37,9 | 30,0 | 45,9 | 61,3 | 53,3 | 69,3 | 0,8 | 0,0 | 1,9 | 178 |
| VD | 39,4 | 31,4 | 47,5 | 59,3 | 51,3 | 67,4 | 1,2 | 0,0 | 2,8 | 178 |
| CH sans VD | 46,6 | 42,6 | 50,6 | 53,0 | 49,0 | 57,0 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.149 S'est vu diagnostiquer une maladie cardiaque, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| DE | 22,3 | 19,0 | 25,5 | 76,2 | 72,9 | 79,6 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 751 |
| SE | 21,7 | 20,5 | 22,9 | 75,6 | 74,3 | 76,8 | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 7000 |
| US | 21,4 | 18,6 | 24,3 | 77,0 | 74,1 | 79,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 2,0 | 1392 |
| NO | 18,6 | 15,2 | 21,9 | 79,5 | 76,0 | 83,0 | 1,4 | 0,4 | 2,4 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 750 |
| CH | 18,3 | 16,3 | 20,2 | 79,2 | 77,2 | 81,2 | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 3238 |
| NL | 17,7 | 14,8 | 20,7 | 80,5 | 77,4 | 83,5 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 750 |
| CA | 17,6 | 16,1 | 19,1 | 80,6 | 79,0 | 82,1 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 4549 |
| FR | 15,8 | 12,9 | 18,7 | 84,0 | 81,0 | 86,9 | . | . | . | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 750 |
| UK | 14,4 | 11,7 | 17,2 | 83,8 | 80,9 | 86,7 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 1,9 | 753 |
| AU | 13,7 | 11,3 | 16,2 | 81,2 | 78,2 | 84,1 | 4,5 | 2,8 | 6,3 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 2500 |
| NZ | 9,5 | 6,5 | 12,5 | 89,0 | 85,9 | 92,2 | 1,3 | 0,2 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 500 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.150 S'est vu diagnostiquer une maladie cardiaque, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| DE | 24,5 | 20,0 | 29,0 | 74,6 | 70,1 | 79,2 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 547 |
| NO | 23,6 | 19,5 | 27,6 | 76,3 | 72,3 | 80,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 651 |
| US | 22,3 | 19,4 | 25,3 | 76,6 | 73,7 | 79,6 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 1116 |
| NL | 20,6 | 16,7 | 24,5 | 79,3 | 75,5 | 83,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 582 |
| SE | 20,0 | 18,4 | 21,5 | 79,3 | 77,7 | 80,9 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 5000 |
| AU | 18,7 | 14,1 | 23,3 | 80,7 | 76,1 | 85,3 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 1670 |
| CH | 18,6 | 15,7 | 21,6 | 80,9 | 77,9 | 83,9 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 1084 |
| CA | 17,7 | 15,9 | 19,5 | 81,8 | 80,0 | 83,7 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 3147 |
| NZ | 13,7 | 9,3 | 18,0 | 86,1 | 81,7 | 90,4 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 379 |
| FR | 13,1 | 10,4 | 15,8 | 86,9 | 84,2 | 89,6 | . | . | . | 860 |
| UK | 11,2 | 8,2 | 14,1 | 88,8 | 85,9 | 91,8 | . | . | . | 581 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.151 S'est vu diagnostiquer une maladie cardiaque, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | Échantillon n | |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | | IC limite sup. |
| Total | 18,3 | 16,3 | 20,2 | 79,2 | 77,2 | 81,2 | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 3238 |
| Homme | 24,3 | 21,2 | 27,4 | 72,5 | 69,3 | 75,7 | 3,0 | 1,7 | 4,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1526 |
| Femme | 13,4 | 11,0 | 15,8 | 84,6 | 82,1 | 87,1 | 1,8 | 0,9 | 2,7 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1712 |
| 65-69 ans | 14,9 | 11,5 | 18,3 | 84,0 | 80,5 | 87,5 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | . | . | . | 828 |
| 70-74 ans | 15,6 | 12,2 | 19,1 | 81,9 | 78,3 | 85,5 | 2,0 | 0,8 | 3,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 954 |
| 75-79 ans | 17,5 | 13,4 | 21,6 | 79,3 | 75 | 83,7 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 697 |
| 80+ ans | 25,4 | 21 | 29,7 | 70,9 | 66,3 | 75,4 | 3,4 | 1,5 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 18,0 | 14,0 | 21,9 | 80,6 | 76,6 | 84,6 | 1,3 | 0,3 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 706 |
| Secondaire II | 18,5 | 16,0 | 21,0 | 78,4 | 75,7 | 81,0 | 3,0 | 1,9 | 4,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1765 |
| Tertiaire | 17,8 | 13,8 | 21,9 | 80,8 | 76,7 | 85,0 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 18,6 | 16,3 | 20,8 | 79,1 | 76,8 | 81,4 | 2,2 | 1,3 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 17,3 | 13,6 | 21,1 | 79,6 | 75,6 | 83,5 | 2,8 | 1,2 | 4,4 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 807 |
| Né en Suisse | 18,3 | 16,1 | 20,5 | 79,1 | 76,8 | 81,4 | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2217 |
| Né à l'étranger | 18,0 | 14,1 | 21,9 | 79,9 | 75,9 | 83,9 | 1,7 | 0,4 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 1015 |
| Medical Home | 23,7 | 20,3 | 27,1 | 74,2 | 70,7 | 77,7 | 2,1 | 1,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1249 |
| Sans Medical Home | 16,5 | 12,3 | 20,8 | 80,8 | 76,3 | 85,4 | 2,5 | 0,6 | 4,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 726 |
| Ville | 18,5 | 14,9 | 22,0 | 79,8 | 76,1 | 83,5 | 1,5 | 0,3 | 2,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1026 |
| Agglomération | 18,7 | 15,9 | 21,5 | 78,7 | 75,7 | 81,6 | 2,5 | 1,4 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1643 |
| Zone rurale | 18,3 | 13,9 | 22,6 | 79,1 | 74,5 | 83,7 | 2,6 | 0,8 | 4,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 19,0 | 16,4 | 21,6 | 78,4 | 75,7 | 81,1 | 2,4 | 1,4 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1040 |
| Suisse romande | 16,6 | 14,1 | 19,0 | 80,9 | 78,3 | 83,5 | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 1869 |
| Suisse italienne | 15,9 | 11,9 | 19,9 | 81,9 | 77,7 | 86,1 | 1,6 | 0,1 | 3,1 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 329 |
| ZH | 18,6 | 14,3 | 22,9 | 77,8 | 73,2 | 82,3 | 3,4 | 1,5 | 5,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 332 |
| CH sans ZH | 18,2 | 16,0 | 20,3 | 79,5 | 77,3 | 81,7 | 2,1 | 1,3 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2906 |
| VD | 17,9 | 13,7 | 22,1 | 79,2 | 74,7 | 83,7 | 2,0 | 0,3 | 3,7 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 324 |
| CH sans VD | 18,3 | 16,2 | 20,3 | 79,2 | 77,1 | 81,4 | 2,4 | 1,5 | 3,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2914 |
| VS | 15,7 | 11,5 | 19,9 | 82,8 | 78,4 | 87,1 | 1,5 | 0,0 | 3,1 | . | . | . | 321 |
| CH sans VS | 18,4 | 16,4 | 20,4 | 79,1 | 77,0 | 81,1 | 2,4 | 1,6 | 3,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 2917 |
| GE | 15,8 | 13,6 | 18,0 | 82,2 | 79,9 | 84,5 | 1,8 | 1,0 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1160 |
| CH sans GE | 18,4 | 16,4 | 20,4 | 79,0 | 76,9 | 81,2 | 2,4 | 1,6 | 3,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.152 S'est vu diagnostiquer une maladie cardiaque, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | Échantillon n | |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | | IC limite sup. |
| Total | 18,6 | 15,7 | 21,6 | 80,9 | 77,9 | 83,9 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 1084 |
| Homme | 26,9 | 21,8 | 32,0 | 73,0 | 67,9 | 78,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 493 |
| Femme | 12,4 | 9,1 | 15,8 | 86,8 | 83,4 | 90,3 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 591 |
| 65-69 ans | 12,4 | 7,9 | 16,9 | 86,7 | 82,1 | 91,3 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | 349 |
| 70-74 ans | 13,4 | 9,1 | 17,8 | 86,5 | 82,2 | 90,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 300 |
| 75-79 ans | 25,5 | 18,5 | 32,5 | 73,7 | 66,6 | 80,8 | 0,8 | 0,0 | 2,3 | 209 |
| 80+ ans | 25,0 | 17,6 | 32,4 | 75,0 | 67,6 | 82,4 | . | . | . | 226 |
| Scolarité obligatoire | 17,8 | 11,0 | 24,6 | 82,1 | 75,3 | 88,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 216 |
| Secondaire II | 18,9 | 15,1 | 22,7 | 80,7 | 76,9 | 84,5 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 628 |
| Tertiaire | 19,7 | 13,4 | 25,9 | 80,0 | 73,7 | 86,2 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 18,9 | 12,3 | 25,6 | 81,1 | 74,4 | 87,7 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 15,0 | 9,2 | 20,9 | 84,0 | 77,9 | 90,1 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 19,7 | 15,7 | 23,6 | 80,0 | 76,0 | 83,9 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 645 |
| Né en Suisse | 19,0 | 15,7 | 22,2 | 80,6 | 77,3 | 83,8 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 863 |
| Né à l'étranger | 17,3 | 9,8 | 24,9 | 82,3 | 74,8 | 89,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 220 |
| Ville | 16,5 | 10,9 | 22,1 | 83,4 | 77,7 | 89,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 293 |
| Agglomération | 22,2 | 17,8 | 26,7 | 77,2 | 72,7 | 81,7 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 540 |
| Zone rurale | 13,9 | 8,5 | 19,4 | 85,4 | 79,9 | 91,0 | 0,6 | 0,0 | 1,9 | 251 |
| Medical Home | 23,4 | 18,3 | 28,4 | 76,5 | 71,5 | 81,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 392 |
| Sans Medical Home | 12,7 | 7,7 | 17,7 | 87,3 | 82,3 | 92,3 | . | . | . | 180 |
| Suisse alémanique | 20,2 | 16,3 | 24,1 | 79,2 | 75,3 | 83,2 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 551 |
| Suisse romande | 13,2 | 9,4 | 17,1 | 86,6 | 82,7 | 90,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 355 |
| Suisse italienne | 21,1 | 14,1 | 28,2 | 78,5 | 71,4 | 85,5 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 178 |
| VD | 16,4 | 10,4 | 22,5 | 83,1 | 77,0 | 89,1 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 178 |
| CH sans VD | 18,8 | 15,6 | 22,0 | 80,7 | 77,5 | 83,9 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.153 S'est vu diagnostiquer du diabète, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| FR | 27,3 | 23,8 | 30,8 | 72,7 | 69,2 | 76,2 | . | . | . | . | . | . | 750 |
| US | 24,2 | 21,2 | 27,2 | 74,8 | 71,8 | 77,8 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1392 |
| CA | 20,2 | 18,5 | 21,8 | 79,3 | 77,7 | 80,9 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 4549 |
| DE | 19,7 | 16,6 | 22,8 | 79,7 | 76,5 | 82,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 751 |
| UK | 17,1 | 14,1 | 20,2 | 82,0 | 78,9 | 85,1 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 753 |
| AU | 16,8 | 13,8 | 19,8 | 82,4 | 79,3 | 85,4 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2500 |
| NL | 15,3 | 12,5 | 18,1 | 84,1 | 81,2 | 86,9 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | . | . | . | 750 |
| SE | 14,0 | 13,0 | 15,1 | 84,7 | 83,6 | 85,8 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 7000 |
| NZ | 12,8 | 9,3 | 16,3 | 86,4 | 82,8 | 90,0 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 500 |
| CH | 12,4 | 10,7 | 14,0 | 86,8 | 85,1 | 88,4 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| NO | 11,5 | 8,8 | 14,2 | 88,0 | 85,2 | 90,7 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.154 S'est vu diagnostiquer du diabète, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 26,8 | 23,3 | 30,2 | 72,5 | 68,9 | 76,0 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 1116 |
| CA | 20,6 | 18,6 | 22,5 | 78,7 | 76,7 | 80,7 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 3147 |
| NL | 19,1 | 14,9 | 23,3 | 80,6 | 76,4 | 84,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 582 |
| FR | 17,1 | 14,0 | 20,1 | 82,7 | 79,6 | 85,8 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 860 |
| UK | 15,5 | 12,1 | 19,0 | 84,5 | 81,0 | 87,9 | . | . | . | 581 |
| NZ | 15,2 | 10,6 | 19,9 | 84,4 | 79,7 | 89,1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 379 |
| DE | 14,3 | 10,8 | 17,7 | 84,1 | 80,4 | 87,8 | 1,6 | 0,0 | 3,1 | 547 |
| AU | 13,7 | 10,3 | 17,2 | 85,8 | 82,4 | 89,2 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1670 |
| SE | 13,3 | 12,0 | 14,7 | 86,4 | 85,0 | 87,8 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 5000 |
| CH | 12,3 | 9,9 | 14,8 | 87,3 | 84,8 | 89,8 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1084 |
| NO | 10,6 | 7,5 | 13,6 | 89,2 | 86,1 | 92,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 651 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.155 S'est vu diagnostiquer du diabète, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| | Total | 12,4 | 10,7 | 14,0 | 86,8 | 85,1 | 88,4 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | |
| Homme | 14,8 | 12,3 | 17,3 | 83,9 | 81,3 | 86,5 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1526 |
| Femme | 10,4 | 8,3 | 12,6 | 89,1 | 86,9 | 91,2 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1712 |
| 65-69 ans | 12,8 | 9,6 | 16,0 | 86,9 | 83,6 | 90,1 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | . | . | . | 828 |
| 70-74 ans | 10,5 | 7,6 | 13,4 | 88,5 | 85,5 | 91,5 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 954 |
| 75-79 ans | 13,9 | 10,3 | 17,5 | 85 | 81,3 | 88,8 | 1,1 | 0 | 2,3 | . | . | . | 697 |
| 80+ ans | 12,5 | 9,1 | 15,8 | 86,4 | 82,9 | 89,8 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 0,2 | 0 | 0,5 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 18,0 | 14,0 | 22,1 | 81,3 | 77,3 | 85,4 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 706 |
| Secondaire II | 10,8 | 8,9 | 12,8 | 88,3 | 86,3 | 90,3 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1765 |
| Tertiaire | 8,6 | 5,8 | 11,4 | 90,4 | 87,5 | 93,4 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 12,1 | 10,2 | 14,0 | 87,1 | 85,2 | 89,1 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 13,2 | 10,0 | 16,5 | 85,7 | 82,4 | 89,0 | 1,0 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 807 |
| Né en Suisse | 12,1 | 10,3 | 14,0 | 87,1 | 85,2 | 89,0 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2217 |
| Né à l'étranger | 13,3 | 10,0 | 16,5 | 85,7 | 82,4 | 89,0 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1015 |
| Medical Home | 13,7 | 10,9 | 16,4 | 84,9 | 82,0 | 87,7 | 1,2 | 0,4 | 2,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1249 |
| Sans Medical Home | 11,1 | 7,9 | 14,2 | 88,4 | 85,1 | 91,7 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | . | . | . | 726 |
| Ville | 11,7 | 8,9 | 14,5 | 86,2 | 83,1 | 89,2 | 1,8 | 0,6 | 3,1 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1026 |
| Agglomération | 12,8 | 10,4 | 15,3 | 86,7 | 84,2 | 89,2 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | . | . | . | 1643 |
| Zone rurale | 13,5 | 9,4 | 17,5 | 86,5 | 82,4 | 90,5 | . | . | . | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 12,1 | 9,9 | 14,3 | 87,2 | 85,0 | 89,4 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1040 |
| Suisse romande | 12,8 | 10,5 | 15,1 | 85,8 | 83,4 | 88,1 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1869 |
| Suisse italienne | 13,6 | 9,9 | 17,3 | 85,5 | 81,6 | 89,3 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | . | . | . | 329 |
| ZH | 10,9 | 7,4 | 14,4 | 88,5 | 84,9 | 92,0 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | . | . | . | 332 |
| CH sans ZH | 12,7 | 10,8 | 14,5 | 86,4 | 84,5 | 88,3 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2906 |
| VD | 12,3 | 8,6 | 16,0 | 86,3 | 82,3 | 90,2 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 324 |
| CH sans VD | 12,4 | 10,6 | 14,1 | 86,8 | 85,0 | 88,6 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2914 |
| VS | 8,9 | 5,7 | 12,2 | 90,7 | 87,4 | 94,1 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | . | . | . | 321 |
| CH sans VS | 12,5 | 10,8 | 14,2 | 86,6 | 84,8 | 88,3 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2917 |
| GE | 14,3 | 12,1 | 16,5 | 83,6 | 81,3 | 85,9 | 2,1 | 1,1 | 3,0 | . | . | . | 1160 |
| CH sans GE | 12,2 | 10,5 | 14,0 | 86,9 | 85,2 | 88,7 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.156 S'est vu diagnostiquer du diabète, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| | Total | 12,3 | 9,9 | 14,8 | 87,3 | 84,8 | 89,8 | 0,4 | 0,0 | |
| Homme | 15,7 | 11,5 | 19,9 | 83,9 | 79,7 | 88,2 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 493 |
| Femme | 9,8 | 6,9 | 12,8 | 89,9 | 86,9 | 92,8 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 591 |
| 65-69 ans | 11,8 | 7,0 | 16,6 | 87,6 | 82,8 | 92,5 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 349 |
| 70-74 ans | 10,9 | 6,9 | 14,9 | 89,0 | 85,0 | 93,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 300 |
| 75-79 ans | 15,8 | 9,8 | 21,9 | 83,4 | 77,2 | 89,6 | 0,8 | 0,0 | 2,3 | 209 |
| 80+ ans | 11,2 | 6,4 | 16,0 | 88,8 | 84,0 | 93,6 | . | . | . | 226 |
| Scolarité obligatoire | 15,7 | 9,7 | 21,6 | 84,2 | 78,3 | 90,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 216 |
| Secondaire II | 11,9 | 8,8 | 15,1 | 87,8 | 84,7 | 91,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 628 |
| Tertiaire | 8,6 | 4,6 | 12,6 | 91,2 | 87,2 | 95,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 10,0 | 4,7 | 15,3 | 90,0 | 84,7 | 95,3 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 10,5 | 4,7 | 16,2 | 88,6 | 82,6 | 94,6 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 14,1 | 10,8 | 17,4 | 85,7 | 82,3 | 89,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 645 |
| Né en Suisse | 12,9 | 10,1 | 15,8 | 86,7 | 83,8 | 89,6 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 863 |
| Né à l'étranger | 9,7 | 5,7 | 13,7 | 90,1 | 86,0 | 94,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 220 |
| Ville | 13,5 | 8,6 | 18,5 | 85,9 | 80,8 | 90,9 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 293 |
| Agglomération | 14,2 | 10,3 | 18,0 | 85,4 | 81,5 | 89,4 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 540 |
| Zone rurale | 7,5 | 4,0 | 11,0 | 92,5 | 89,0 | 96,0 | . | . | . | 251 |
| Medical Home | 15,0 | 10,3 | 19,6 | 85,0 | 80,4 | 89,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 392 |
| Sans Medical Home | 9,9 | 4,1 | 15,7 | 89,3 | 83,2 | 95,3 | 0,8 | 0,0 | 2,5 | 180 |
| Suisse alémanique | 11,4 | 8,4 | 14,5 | 88,1 | 85,0 | 91,3 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 551 |
| Suisse romande | 14,1 | 9,4 | 18,8 | 85,8 | 81,1 | 90,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 355 |
| Suisse italienne | 16,7 | 10,4 | 23,1 | 82,9 | 76,5 | 89,2 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 178 |
| VD | 11,5 | 6,4 | 16,6 | 88,3 | 83,1 | 93,4 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 178 |
| CH sans VD | 12,4 | 9,8 | 15,1 | 87,2 | 84,5 | 89,9 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.157 S'est vu diagnostiquer de l'asthme ou une maladie pulmonaire chronique, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 22,1 | 19,2 | 25,0 | 76,0 | 73,0 | 79,0 | 1,2 | 0,5 | 1,9 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 1392 |
| NO | 16,9 | 13,6 | 20,2 | 82,5 | 79,2 | 85,8 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 750 |
| CA | 14,9 | 13,5 | 16,2 | 83,7 | 82,3 | 85,1 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 4549 |
| NL | 14,2 | 11,5 | 17,0 | 85,5 | 82,8 | 88,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 750 |
| UK | 14,1 | 11,4 | 16,9 | 85,0 | 82,1 | 87,8 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 753 |
| AU | 13,5 | 10,7 | 16,3 | 83,5 | 80,5 | 86,5 | 2,8 | 1,6 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2500 |
| DE | 13,5 | 10,8 | 16,2 | 86,0 | 83,3 | 88,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 751 |
| SE | 12,6 | 11,6 | 13,6 | 85,2 | 84,2 | 86,3 | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 7000 |
| NZ | 12,4 | 9,1 | 15,7 | 86,5 | 83,2 | 89,9 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 500 |
| FR | 12,3 | 9,8 | 14,9 | 87,0 | 84,3 | 89,6 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 750 |
| CH | 8,5 | 7,2 | 9,8 | 89,4 | 88,0 | 90,9 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 3238 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.158 S'est vu diagnostiquer de l'asthme ou une maladie pulmonaire chronique, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 17,5 | 14,7 | 20,3 | 81,9 | 79,1 | 84,7 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 1116 |
| NL | 16,5 | 12,6 | 20,5 | 83,4 | 79,4 | 87,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 582 |
| NO | 16,1 | 12,5 | 19,8 | 83,4 | 79,7 | 87,1 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 651 |
| CA | 16,0 | 14,2 | 17,8 | 83,7 | 81,9 | 85,5 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 3147 |
| AU | 15,9 | 11,6 | 20,2 | 83,5 | 79,2 | 87,9 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 1670 |
| NZ | 12,4 | 8,3 | 16,4 | 87,3 | 83,2 | 91,3 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 379 |
| SE | 12,4 | 11,1 | 13,7 | 87,3 | 86,0 | 88,6 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 5000 |
| DE | 9,3 | 6,4 | 12,2 | 90,0 | 86,9 | 93,0 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 547 |
| CH | 9,2 | 7,1 | 11,2 | 90,5 | 88,4 | 92,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1084 |
| UK | 8,6 | 5,9 | 11,2 | 91,3 | 88,7 | 94,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 581 |
| FR | 4,7 | 2,9 | 6,5 | 95,3 | 93,5 | 97,1 | . | . | . | 860 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.159 S'est vu diagnostiquer de l'asthme ou une maladie pulmonaire chronique, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 8,5 | 7,2 | 9,8 | 89,4 | 88,0 | 90,9 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| Homme | 8,3 | 6,3 | 10,2 | 89,9 | 87,8 | 92,0 | 1,7 | 0,8 | 2,5 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1526 |
| Femme | 8,7 | 6,8 | 10,5 | 89,0 | 87,0 | 91,1 | 2,2 | 1,2 | 3,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1712 |
| 65-69 ans | 7,1 | 4,8 | 9,3 | 91,7 | 89,3 | 94,1 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | . | . | . | 828 |
| 70-74 ans | 9,8 | 6,9 | 12,6 | 87,9 | 84,9 | 91,0 | 2,0 | 0,9 | 3,2 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 954 |
| 75-79 ans | 8,9 | 6,0 | 11,8 | 88,9 | 85,6 | 92,2 | 2,1 | 0,5 | 3,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 697 |
| 80+ ans | 8,4 | 5,7 | 11,1 | 88,8 | 85,7 | 91,9 | 2,5 | 0,9 | 4,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 10,3 | 7,2 | 13,5 | 87,7 | 84,3 | 91,1 | 2,0 | 0,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 706 |
| Secondaire II | 8,0 | 6,3 | 9,6 | 90,1 | 88,3 | 91,9 | 1,9 | 1,1 | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1765 |
| Tertiaire | 8,0 | 5,2 | 10,9 | 89,2 | 85,8 | 92,5 | 2,3 | 0,7 | 4,0 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 8,2 | 6,6 | 9,7 | 89,9 | 88,2 | 91,6 | 1,8 | 1,1 | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 9,5 | 6,8 | 12,1 | 88,2 | 85,3 | 91,1 | 2,2 | 0,9 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 807 |
| Né en Suisse | 8,0 | 6,6 | 9,5 | 90,2 | 88,6 | 91,8 | 1,7 | 1,0 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2217 |
| Né à l'étranger | 10,2 | 7,2 | 13,3 | 86,5 | 83,1 | 89,9 | 3,0 | 1,3 | 4,8 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1015 |
| Medical Home | 11,5 | 8,9 | 14,0 | 86,6 | 83,9 | 89,3 | 1,9 | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1249 |
| Sans Medical Home | 8,5 | 5,5 | 11,5 | 90,0 | 86,7 | 93,3 | 1,4 | 0,1 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 726 |
| Ville | 8,3 | 5,8 | 10,7 | 89,6 | 87,0 | 92,3 | 2,0 | 0,7 | 3,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1026 |
| Agglomération | 9,1 | 7,0 | 11,1 | 88,5 | 86,3 | 90,8 | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1643 |
| Zone rurale | 8,7 | 5,6 | 11,7 | 89,7 | 86,3 | 93,0 | 1,6 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 8,1 | 6,3 | 9,8 | 89,7 | 87,8 | 91,7 | 2,1 | 1,1 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1040 |
| Suisse romande | 9,9 | 8,0 | 11,9 | 88,1 | 86,0 | 90,1 | 1,9 | 1,1 | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1869 |
| Suisse italienne | 7,5 | 4,5 | 10,4 | 91,4 | 88,2 | 94,5 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 329 |
| ZH | 9,7 | 6,4 | 13,0 | 87,4 | 83,7 | 91,0 | 2,7 | 0,9 | 4,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 332 |
| CH sans ZH | 8,2 | 6,8 | 9,7 | 89,9 | 88,2 | 91,5 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2906 |
| VD | 9,4 | 6,1 | 12,7 | 86,9 | 83,2 | 90,7 | 3,5 | 1,4 | 5,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 8,4 | 7,0 | 9,8 | 89,7 | 88,1 | 91,2 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2914 |
| VS | 11,7 | 7,8 | 15,6 | 87,3 | 83,3 | 91,3 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 321 |
| CH sans VS | 8,3 | 7,0 | 9,7 | 89,5 | 88,0 | 91,0 | 2,0 | 1,3 | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2917 |
| GE | 9,6 | 7,8 | 11,5 | 87,7 | 85,6 | 89,8 | 2,4 | 1,4 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1160 |
| CH sans GE | 8,4 | 7,0 | 9,8 | 89,5 | 88,0 | 91,1 | 1,9 | 1,2 | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.160 S'est vu diagnostiquer de l'asthme ou une maladie pulmonaire chronique, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 9,2 | 7,1 | 11,2 | 90,5 | 88,4 | 92,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1084 |
| Homme | 10,8 | 7,3 | 14,3 | 88,6 | 85,1 | 92,2 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 493 |
| Femme | 7,9 | 5,4 | 10,4 | 92,0 | 89,4 | 94,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 591 |
| 65-69 ans | 9,1 | 5,0 | 13,2 | 90,4 | 86,3 | 94,6 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 349 |
| 70-74 ans | 8,5 | 4,9 | 12,2 | 91,1 | 87,4 | 94,8 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 300 |
| 75-79 ans | 12,0 | 6,9 | 17,2 | 87,6 | 82,4 | 92,8 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 209 |
| 80+ ans | 7,2 | 3,6 | 10,9 | 92,8 | 89,1 | 96,4 | . | . | . | 226 |
| Scolarité obligatoire | 5,4 | 2,3 | 8,5 | 94,1 | 90,9 | 97,3 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 216 |
| Secondaire II | 10,5 | 7,6 | 13,4 | 89,2 | 86,3 | 92,1 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 628 |
| Tertiaire | 9,6 | 5,2 | 13,9 | 90,1 | 85,7 | 94,5 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 8,1 | 3,9 | 12,3 | 91,9 | 87,7 | 96,1 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 4,8 | 1,3 | 8,4 | 94,8 | 91,2 | 98,4 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 10,7 | 7,8 | 13,5 | 89,0 | 86,1 | 91,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 645 |
| Né en Suisse | 9,4 | 7,1 | 11,8 | 90,4 | 88,0 | 92,7 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 863 |
| Né à l'étranger | 8,0 | 3,5 | 12,6 | 91,1 | 86,4 | 95,7 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 220 |
| Ville | 7,9 | 4,4 | 11,3 | 91,4 | 87,9 | 95,0 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 293 |
| Agglomération | 9,0 | 6,0 | 12,1 | 90,7 | 87,6 | 93,8 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 540 |
| Zone rurale | 10,7 | 6,2 | 15,2 | 89,3 | 84,8 | 93,8 | . | . | . | 251 |
| Medical Home | 13,0 | 9,0 | 17,1 | 86,5 | 82,4 | 90,6 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 392 |
| Sans Medical Home | 7,6 | 3,7 | 11,4 | 92,2 | 88,3 | 96,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 180 |
| Suisse alémanique | 8,8 | 6,2 | 11,3 | 91,0 | 88,4 | 93,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 551 |
| Suisse romande | 10,1 | 6,1 | 14,2 | 89,5 | 85,4 | 93,5 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 355 |
| Suisse italienne | 9,9 | 5,0 | 14,8 | 89,2 | 84,2 | 94,2 | 0,9 | 0,0 | 2,2 | 178 |
| VD | 9,3 | 4,6 | 14,0 | 89,7 | 84,8 | 94,5 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 178 |
| CH sans VD | 9,1 | 6,9 | 11,4 | 90,6 | 88,4 | 92,9 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.161 Maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement), comparaison internationale (2017, en %)

| Pays | Hypertension, haute pression sanguine | | | Pays | Maladie cardiaque (y c. crise cardiaque) | | | Pays | Diabète | | | Pays | Asthme, maladie pulmonaire chronique | | | Échantillon n |
|-----------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------|--|----------------|----------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 60,9 | 57,6 | 64,2 | SE | 23,9 | 22,6 | 25,1 | FR | 27,3 | 23,8 | 30,8 | US | 23,3 | 20,3 | 26,3 | 1392 |
| DE | 54,4 | 50,4 | 58,3 | DE | 23 | 19,7 | 26,3 | US | 24,6 | 21,6 | 27,6 | NO | 17,4 | 14,1 | 20,7 | 750 |
| SE | 54,4 | 53,0 | 55,9 | US | 21,7 | 18,9 | 24,5 | CA | 20,5 | 18,8 | 22,1 | AU | 16,3 | 13,3 | 19,3 | 2500 |
| CA | 50,6 | 48,6 | 52,6 | CH | 20,6 | 18,6 | 22,6 | DE | 19,9 | 16,8 | 23 | CA | 15,7 | 14,4 | 17,1 | 4549 |
| UK | 49,0 | 45,0 | 53,0 | NO | 19,9 | 16,5 | 23,4 | UK | 17,6 | 14,5 | 20,7 | UK | 14,7 | 11,9 | 17,5 | 753 |
| CH | 47,8 | 45,3 | 50,3 | CA | 18,7 | 17,2 | 20,2 | AU | 17,5 | 14,4 | 20,6 | SE | 14,4 | 13,3 | 15,4 | 7000 |
| NO | 47,7 | 43,4 | 52,0 | NL | 18,4 | 15,4 | 21,4 | NL | 15,9 | 13,1 | 18,8 | NL | 14,3 | 11,6 | 17 | 750 |
| NL | 44,5 | 40,6 | 48,3 | AU | 18,3 | 15,4 | 21,2 | SE | 15 | 14 | 16,1 | DE | 13,5 | 10,9 | 16,2 | 751 |
| FR | 43,8 | 39,9 | 47,7 | FR | 15,8 | 12,9 | 18,7 | NZ | 13,3 | 9,8 | 16,9 | NZ | 13,3 | 10 | 16,7 | 500 |
| AU | 43,5 | 39,7 | 47,4 | UK | 15,1 | 12,3 | 17,9 | CH | 13,1 | 11,4 | 14,8 | FR | 12,7 | 10,1 | 15,4 | 750 |
| NZ | 38,6 | 33,6 | 43,7 | NZ | 10,8 | 7,7 | 13,9 | NO | 11,9 | 9,1 | 14,7 | CH | 10,4 | 9 | 11,9 | 3238 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan

Tableau 6.162 Maladies chroniques diagnostiquées, comparaison internationale (2014, en %)

| Pays | Hypertension, haute pression sanguine | | | Pays | Maladie cardiaque (y c. crise cardiaque) | | | Pays | Diabète | | | Pays | Asthme, maladie pulmonaire chronique | | | Échantillon n |
|-----------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------|--|----------------|----------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 63,0 | 59,5 | 66,6 | DE | 24,5 | 20,0 | 29,0 | US | 26,8 | 23,3 | 30,2 | US | 17,5 | 14,7 | 20,3 | 1116 |
| DE | 55,4 | 50,2 | 60,7 | NO | 23,6 | 19,5 | 27,6 | CA | 20,6 | 18,6 | 22,5 | NL | 16,5 | 12,6 | 20,5 | 582 |
| CA | 51,7 | 49,3 | 54,1 | US | 22,3 | 19,4 | 25,3 | NL | 19,1 | 14,9 | 23,3 | NO | 16,1 | 12,5 | 19,8 | 651 |
| AU | 50,2 | 44,5 | 55,8 | NL | 20,6 | 16,7 | 24,5 | FR | 17,1 | 14,0 | 20,1 | CA | 16,0 | 14,2 | 17,8 | 3147 |
| SE | 48,2 | 46,3 | 50,2 | SE | 20,0 | 18,4 | 21,5 | UK | 15,5 | 12,1 | 19,0 | AU | 15,9 | 11,6 | 20,2 | 1670 |
| NL | 46,7 | 41,6 | 51,9 | AU | 18,7 | 14,1 | 23,3 | NZ | 15,2 | 10,6 | 19,9 | NZ | 12,4 | 8,3 | 16,4 | 379 |
| CH | 46,0 | 42,3 | 49,7 | CH | 18,6 | 15,7 | 21,6 | DE | 14,3 | 10,8 | 17,7 | SE | 12,4 | 11,1 | 13,7 | 5000 |
| NO | 44,1 | 39,4 | 48,8 | CA | 17,7 | 15,9 | 19,5 | AU | 13,7 | 10,3 | 17,2 | DE | 9,3 | 6,4 | 12,2 | 547 |
| UK | 38,7 | 34,0 | 43,4 | NZ | 13,7 | 9,3 | 18,0 | SE | 13,3 | 12,0 | 14,7 | CH | 9,2 | 7,1 | 11,2 | 1084 |
| FR | 36,5 | 32,6 | 40,4 | FR | 13,1 | 10,4 | 15,8 | CH | 12,3 | 9,9 | 14,8 | UK | 8,6 | 5,9 | 11,2 | 581 |
| NZ | 32,9 | 26,4 | 39,3 | UK | 11,2 | 8,2 | 14,1 | NO | 10,6 | 7,5 | 13,6 | FR | 4,7 | 2,9 | 6,5 | 860 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.163 Maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement), Suisse (2017, en %)

| | Hypertension, haute pression sanguine | | | Maladie cardiaque (y c. crise cardiaque) | | | Diabète | | | Asthme, maladie pulmonaire chronique | | | Échantillon n |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 47,8 | 45,3 | 50,3 | 20,6 | 18,6 | 22,6 | 13,1 | 11,4 | 14,8 | 10,4 | 9,0 | 11,9 | 3238 |
| Homme | 47,6 | 44,0 | 51,2 | 27,3 | 24,1 | 30,5 | 16,0 | 13,4 | 18,6 | 9,9 | 7,9 | 12,0 | 1526 |
| Femme | 47,9 | 44,6 | 51,3 | 15,2 | 12,7 | 17,7 | 10,8 | 8,6 | 13,0 | 10,8 | 8,8 | 12,9 | 1712 |
| 65-69 ans | 41,2 | 36,6 | 45,9 | 16,0 | 12,5 | 19,5 | 13,1 | 9,9 | 16,4 | 8,3 | 5,9 | 10,7 | 828 |
| 70-74 ans | 45,2 | 40,6 | 49,8 | 17,7 | 14,1 | 21,3 | 11,2 | 8,2 | 14,2 | 11,8 | 8,8 | 14,8 | 954 |
| 75-79 ans | 51,7 | 46,4 | 57,0 | 20,5 | 16,2 | 24,9 | 15 | 11,2 | 18,7 | 11,0 | 7,7 | 14,3 | 697 |
| 80+ ans | 54,5 | 49,5 | 59,6 | 28,8 | 24,3 | 33,4 | 13,4 | 10,0 | 16,8 | 11,0 | 7,9 | 14,1 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 56,2 | 51,1 | 61,3 | 19,3 | 15,3 | 23,3 | 18,5 | 14,5 | 22,6 | 12,3 | 8,9 | 15,7 | 706 |
| Secondaire II | 46,4 | 43,2 | 49,6 | 21,5 | 18,9 | 24,1 | 11,6 | 9,6 | 13,7 | 9,8 | 8,0 | 11,7 | 1765 |
| Tertiaire | 39,4 | 34,0 | 44,8 | 18,7 | 14,6 | 22,8 | 9,1 | 6,3 | 12,0 | 10,4 | 7,1 | 13,6 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 48,2 | 45,3 | 51,1 | 20,7 | 18,4 | 23,1 | 12,7 | 10,8 | 14,7 | 10,0 | 8,3 | 11,7 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 46,6 | 41,8 | 51,5 | 20,1 | 16,2 | 24,0 | 14,2 | 10,9 | 17,5 | 11,7 | 8,8 | 14,6 | 807 |
| Né en Suisse | 46,2 | 43,4 | 49,0 | 20,8 | 18,5 | 23,1 | 12,9 | 10,9 | 14,8 | 9,7 | 8,1 | 11,3 | 2217 |
| Né à l'étranger | 53,9 | 49,1 | 58,8 | 19,7 | 15,7 | 23,7 | 13,9 | 10,7 | 17,2 | 13,2 | 9,9 | 16,6 | 1015 |
| Medical Home | 55,9 | 52,0 | 59,9 | 25,8 | 22,3 | 29,3 | 14,9 | 12,1 | 17,8 | 13,4 | 10,7 | 16,1 | 1249 |
| Sans Medical Home | 42,9 | 37,4 | 48,4 | 19,0 | 14,5 | 23,6 | 11,6 | 8,3 | 14,9 | 10,0 | 6,7 | 13,2 | 726 |
| Ville | 50,3 | 45,8 | 54,9 | 19,9 | 16,2 | 23,6 | 13,6 | 10,5 | 16,6 | 10,2 | 7,5 | 12,9 | 1026 |
| Agglomération | 45,5 | 42,0 | 49,1 | 21,2 | 18,2 | 24,1 | 13,3 | 10,8 | 15,8 | 11,4 | 9,1 | 13,6 | 1643 |
| Zone rurale | 48,1 | 42,4 | 53,8 | 20,8 | 16,3 | 25,4 | 13,5 | 9,4 | 17,5 | 10,2 | 6,9 | 13,6 | 454 |
| Suisse alémanique | 47,9 | 44,6 | 51,2 | 21,5 | 18,8 | 24,1 | 12,7 | 10,5 | 14,9 | 10,1 | 8,2 | 12,1 | 1040 |
| Suisse romande | 48,8 | 45,4 | 52,1 | 18,7 | 16,1 | 21,3 | 13,9 | 11,5 | 16,2 | 11,8 | 9,8 | 13,9 | 1869 |
| Suisse italienne | 42,3 | 36,8 | 47,8 | 17,5 | 13,4 | 21,7 | 14,5 | 10,7 | 18,4 | 8,4 | 5,2 | 11,5 | 329 |
| ZH | 48,0 | 42,4 | 53,5 | 22,1 | 17,5 | 26,6 | 11,5 | 8,0 | 15,1 | 12,5 | 8,8 | 16,1 | 332 |
| CH sans ZH | 47,8 | 45,0 | 50,5 | 20,3 | 18,0 | 22,5 | 13,4 | 11,6 | 15,3 | 10,0 | 8,4 | 11,6 | 2906 |
| VD | 48,9 | 43,2 | 54,6 | 19,9 | 15,5 | 24,4 | 13,2 | 9,3 | 17,0 | 12,9 | 9,1 | 16,6 | 324 |
| CH sans VD | 47,7 | 45,1 | 50,3 | 20,6 | 18,5 | 22,8 | 13,1 | 11,3 | 14,9 | 10,2 | 8,6 | 11,8 | 2914 |
| VS | 45,3 | 39,4 | 51,2 | 17,2 | 12,9 | 21,6 | 9,3 | 5,9 | 12,6 | 12,4 | 8,4 | 16,4 | 321 |
| CH sans VS | 47,9 | 45,3 | 50,5 | 20,7 | 18,6 | 22,8 | 13,3 | 11,5 | 15,0 | 10,3 | 8,8 | 11,9 | 2917 |
| GE | 48,8 | 45,7 | 51,9 | 17,6 | 15,3 | 19,9 | 16,4 | 14,1 | 18,7 | 12,0 | 10,0 | 14,1 | 1160 |
| CH sans GE | 47,7 | 45,1 | 50,3 | 20,8 | 18,6 | 22,9 | 12,9 | 11,2 | 14,7 | 10,3 | 8,8 | 11,9 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.164 Maladies chroniques diagnostiquées, Suisse (2014, en %)

| | Hypertension, haute pression sanguine | | | Maladie cardiaque (y c. crise cardiaque) | | | Diabète | | | Asthme, maladie pulmonaire chronique | | | Échantillon n |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 46,0 | 42,3 | 49,7 | 18,6 | 15,7 | 21,6 | 12,3 | 9,9 | 14,8 | 9,2 | 7,1 | 11,2 | 1084 |
| Homme | 50,0 | 44,3 | 55,7 | 26,9 | 21,8 | 32,0 | 15,7 | 11,5 | 19,9 | 10,8 | 7,3 | 14,3 | 493 |
| Femme | 43,0 | 38,2 | 47,9 | 12,4 | 9,1 | 15,8 | 9,8 | 6,9 | 12,8 | 7,9 | 5,4 | 10,4 | 591 |
| 65-69 ans | 41,1 | 34,4 | 47,8 | 12,4 | 7,9 | 16,9 | 11,8 | 7,0 | 16,6 | 9,1 | 5,0 | 13,2 | 349 |
| 70-74 ans | 41,9 | 35,0 | 48,8 | 13,4 | 9,1 | 17,8 | 10,9 | 6,9 | 14,9 | 8,5 | 4,9 | 12,2 | 300 |
| 75-79 ans | 50,0 | 41,9 | 58,2 | 25,5 | 18,5 | 32,5 | 15,8 | 9,8 | 21,9 | 12,0 | 6,9 | 17,2 | 209 |
| 80+ ans | 52,4 | 44,4 | 60,4 | 25,0 | 17,6 | 32,4 | 11,2 | 6,4 | 16,0 | 7,2 | 3,6 | 10,9 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 52,4 | 43,9 | 60,9 | 17,8 | 11,0 | 24,6 | 15,7 | 9,7 | 21,6 | 5,4 | 2,3 | 8,5 | 216 |
| Secondaire II | 44,5 | 39,9 | 49,2 | 18,9 | 15,1 | 22,7 | 11,9 | 8,8 | 15,1 | 10,5 | 7,6 | 13,4 | 628 |
| Tertiaire | 43,3 | 35,1 | 51,5 | 19,7 | 13,4 | 25,9 | 8,6 | 4,6 | 12,6 | 9,6 | 5,2 | 13,9 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 44,5 | 35,7 | 53,4 | 18,9 | 12,3 | 25,6 | 10,0 | 4,7 | 15,3 | 8,1 | 3,9 | 12,3 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 32,9 | 25,0 | 40,7 | 15,0 | 9,2 | 20,9 | 10,5 | 4,7 | 16,2 | 4,8 | 1,3 | 8,4 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 50,5 | 45,7 | 55,3 | 19,7 | 15,7 | 23,6 | 14,1 | 10,8 | 17,4 | 10,7 | 7,8 | 13,5 | 645 |
| Né en Suisse | 44,6 | 40,6 | 48,7 | 19,0 | 15,7 | 22,2 | 12,9 | 10,1 | 15,8 | 9,4 | 7,1 | 11,8 | 863 |
| Né à l'étranger | 51,9 | 42,9 | 60,9 | 17,3 | 9,8 | 24,9 | 9,7 | 5,7 | 13,7 | 8,0 | 3,5 | 12,6 | 220 |
| Ville | 49,8 | 42,4 | 57,2 | 16,5 | 10,9 | 22,1 | 13,5 | 8,6 | 18,5 | 7,9 | 4,4 | 11,3 | 293 |
| Agglomération | 43,2 | 38,0 | 48,4 | 22,2 | 17,8 | 26,7 | 14,2 | 10,3 | 18,0 | 9,0 | 6,0 | 12,1 | 540 |
| Zone rurale | 47,5 | 39,9 | 55,0 | 13,9 | 8,5 | 19,4 | 7,5 | 4,0 | 11,0 | 10,7 | 6,2 | 15,2 | 251 |
| Medical Home | 47,5 | 41,3 | 53,7 | 23,4 | 18,3 | 28,4 | 15,0 | 10,3 | 19,6 | 13,0 | 9,0 | 17,1 | 392 |
| Sans Medical Home | 46,3 | 36,8 | 55,8 | 12,7 | 7,7 | 17,7 | 9,9 | 4,1 | 15,7 | 7,6 | 3,7 | 11,4 | 180 |
| Suisse alémanique | 48,7 | 43,9 | 53,5 | 20,2 | 16,3 | 24,1 | 11,4 | 8,4 | 14,5 | 8,8 | 6,2 | 11,3 | 551 |
| Suisse romande | 39,8 | 33,8 | 45,7 | 13,2 | 9,4 | 17,1 | 14,1 | 9,4 | 18,8 | 10,1 | 6,1 | 14,2 | 355 |
| Suisse italienne | 37,9 | 30,0 | 45,9 | 21,1 | 14,1 | 28,2 | 16,7 | 10,4 | 23,1 | 9,9 | 5,0 | 14,8 | 178 |
| VD | 39,4 | 31,4 | 47,5 | 16,4 | 10,4 | 22,5 | 11,5 | 6,4 | 16,6 | 9,3 | 4,6 | 14,0 | 178 |
| CH sans VD | 46,6 | 42,6 | 50,6 | 18,8 | 15,6 | 22,0 | 12,4 | 9,8 | 15,1 | 9,1 | 6,9 | 11,4 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.165 S'est vu diagnostiquer une dépression, de l'anxiété ou d'autres problèmes psychiques, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 19,2 | 16,4 | 22,0 | 79,7 | 76,9 | 82,6 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 1392 |
| UK | 14,8 | 11,9 | 17,6 | 83,4 | 80,4 | 86,5 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 753 |
| CA | 13,5 | 12,2 | 14,8 | 85,1 | 83,7 | 86,4 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 4549 |
| FR | 11,3 | 8,7 | 13,8 | 88,5 | 85,9 | 91,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | . | . | . | 750 |
| AU | 9,5 | 7,5 | 11,4 | 85,4 | 82,9 | 87,8 | 5,0 | 3,4 | 6,6 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2500 |
| CH | 9,1 | 7,7 | 10,5 | 88,7 | 87,2 | 90,2 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| DE | 9,0 | 6,6 | 11,4 | 90,0 | 87,5 | 92,5 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 751 |
| NZ | 8,9 | 6,1 | 11,6 | 89,8 | 86,9 | 92,7 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 500 |
| SE | 8,5 | 7,6 | 9,3 | 87,6 | 86,6 | 88,6 | 3,5 | 3,0 | 4,1 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 7000 |
| NO | 8,3 | 5,9 | 10,8 | 90,5 | 88,0 | 93,1 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 750 |
| NL | 6,1 | 4,3 | 7,9 | 93,5 | 91,7 | 95,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.166 S'est vu diagnostiquer une dépression, de l'anxiété ou d'autres problèmes psychiques, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 20,4 | 17,4 | 23,4 | 79,2 | 76,2 | 82,3 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 1116 |
| NO | 13,9 | 10,4 | 17,5 | 85,4 | 81,8 | 89,0 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 651 |
| AU | 12,3 | 9,0 | 15,7 | 87,5 | 84,1 | 90,8 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1670 |
| CA | 12,2 | 10,8 | 13,7 | 87,5 | 86,0 | 88,9 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 3147 |
| NZ | 11,9 | 7,3 | 16,4 | 87,6 | 83,0 | 92,2 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 379 |
| CH | 10,3 | 7,9 | 12,7 | 89,6 | 87,2 | 92,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1084 |
| DE | 8,3 | 5,3 | 11,2 | 90,7 | 87,6 | 93,8 | 1,0 | 0,0 | 2,2 | 547 |
| SE | 8,3 | 7,2 | 9,3 | 91,4 | 90,3 | 92,4 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 5000 |
| FR | 7,0 | 4,9 | 9,2 | 93,0 | 90,8 | 95,1 | . | . | . | 860 |
| UK | 6,9 | 4,7 | 9,1 | 93,0 | 90,8 | 95,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 581 |
| NL | 5,1 | 2,9 | 7,2 | 94,1 | 91,5 | 96,6 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 582 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.167 S'est vu diagnostiquer une dépression, de l'anxiété ou d'autres problèmes psychiques, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 9,1 | 7,7 | 10,5 | 88,7 | 87,2 | 90,2 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| Homme | 6,3 | 4,5 | 8,1 | 92,0 | 90,0 | 94,0 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1526 |
| Femme | 11,3 | 9,2 | 13,4 | 86,1 | 83,8 | 88,3 | 2,5 | 1,5 | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1712 |
| 65-69 ans | 11,7 | 8,6 | 14,9 | 86,3 | 83,1 | 89,6 | 1,9 | 0,9 | 3,0 | . | . | . | 828 |
| 70-74 ans | 8,0 | 5,7 | 10,3 | 89,7 | 87,1 | 92,4 | 2,1 | 0,8 | 3,3 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 954 |
| 75-79 ans | 7,8 | 5,0 | 10,7 | 89,9 | 86,7 | 93 | 2,3 | 0,7 | 3,8 | . | . | . | 697 |
| 80+ ans | 8,2 | 5,6 | 10,9 | 89,3 | 86,3 | 92,4 | 2,1 | 0,6 | 3,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 11,9 | 8,7 | 15,2 | 86,1 | 82,6 | 89,5 | 2,0 | 0,7 | 3,4 | . | . | . | 706 |
| Secondaire II | 8,7 | 6,9 | 10,4 | 89,1 | 87,2 | 91,1 | 2,2 | 1,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1765 |
| Tertiaire | 6,2 | 3,6 | 8,8 | 91,6 | 88,7 | 94,5 | 1,8 | 0,6 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 8,3 | 6,8 | 9,9 | 89,8 | 88,1 | 91,5 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 11,3 | 8,3 | 14,3 | 85,6 | 82,3 | 89,0 | 2,9 | 1,4 | 4,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 807 |
| Né en Suisse | 9,0 | 7,3 | 10,6 | 89,2 | 87,4 | 90,9 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2217 |
| Né à l'étranger | 9,7 | 6,9 | 12,4 | 86,9 | 83,7 | 90,0 | 3,1 | 1,5 | 4,7 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1015 |
| Medical Home | 9,7 | 7,4 | 12,0 | 87,4 | 84,8 | 90,0 | 2,9 | 1,5 | 4,3 | . | . | . | 1249 |
| Sans Medical Home | 10,1 | 6,9 | 13,2 | 88,4 | 85,1 | 91,6 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 726 |
| Ville | 9,4 | 6,8 | 12,0 | 88,6 | 85,8 | 91,4 | 1,9 | 0,8 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1026 |
| Agglomération | 8,9 | 6,9 | 10,9 | 89,1 | 86,9 | 91,2 | 2,0 | 1,1 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1643 |
| Zone rurale | 9,5 | 6,0 | 12,9 | 88,1 | 84,4 | 91,9 | 2,3 | 0,6 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 8,0 | 6,2 | 9,9 | 90,1 | 88,1 | 92,1 | 1,7 | 0,8 | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1040 |
| Suisse romande | 12,1 | 10,0 | 14,1 | 84,8 | 82,5 | 87,1 | 3,0 | 1,9 | 4,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1869 |
| Suisse italienne | 9,4 | 6,1 | 12,7 | 87,1 | 83,3 | 90,9 | 3,2 | 1,2 | 5,2 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 329 |
| ZH | 6,8 | 4,0 | 9,6 | 91,1 | 87,8 | 94,3 | 2,0 | 0,4 | 3,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 332 |
| CH sans ZH | 9,6 | 8,0 | 11,1 | 88,2 | 86,5 | 89,9 | 2,1 | 1,4 | 2,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2906 |
| VD | 14,0 | 10,0 | 18,1 | 83,4 | 79,2 | 87,7 | 2,3 | 0,7 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 8,6 | 7,1 | 10,1 | 89,2 | 87,6 | 90,8 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2914 |
| VS | 9,7 | 6,1 | 13,3 | 87,2 | 83,2 | 91,1 | 2,8 | 1,0 | 4,6 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 321 |
| CH sans VS | 9,1 | 7,6 | 10,5 | 88,8 | 87,2 | 90,4 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2917 |
| GE | 13,0 | 10,9 | 15,1 | 82,8 | 80,5 | 85,2 | 4,2 | 2,9 | 5,5 | . | . | . | 1160 |
| CH sans GE | 8,9 | 7,4 | 10,3 | 89,0 | 87,4 | 90,7 | 2,0 | 1,3 | 2,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.168 S'est vu diagnostiquer une dépression, de l'anxiété ou d'autres problèmes psychiques, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 10,3 | 7,9 | 12,7 | 89,6 | 87,2 | 92,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1084 |
| Homme | 8,3 | 4,6 | 12,0 | 91,7 | 87,9 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 493 |
| Femme | 11,9 | 8,7 | 15,1 | 88,0 | 84,8 | 91,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 591 |
| 65-69 ans | 13,2 | 7,8 | 18,6 | 86,5 | 81,2 | 91,9 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 349 |
| 70-74 ans | 9,6 | 5,1 | 14,1 | 90,4 | 85,9 | 94,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 300 |
| 75-79 ans | 8,8 | 4,3 | 13,4 | 91,2 | 86,6 | 95,7 | . | . | . | 209 |
| 80+ ans | 9,1 | 4,8 | 13,4 | 90,9 | 86,6 | 95,2 | . | . | . | 226 |
| Scolarité obligatoire | 14,2 | 7,4 | 20,9 | 85,8 | 79,1 | 92,6 | . | . | . | 216 |
| Secondaire II | 9,4 | 6,6 | 12,1 | 90,5 | 87,7 | 93,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 628 |
| Tertiaire | 9,3 | 5,1 | 13,6 | 90,5 | 86,3 | 94,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 4,3 | 1,1 | 7,4 | 95,7 | 92,6 | 98,9 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 10,8 | 4,9 | 16,6 | 88,8 | 82,9 | 94,7 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 11,9 | 8,6 | 15,2 | 88,1 | 84,8 | 91,4 | . | . | . | 645 |
| Né en Suisse | 9,3 | 6,9 | 11,7 | 90,6 | 88,2 | 93,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 863 |
| Né à l'étranger | 15,1 | 7,6 | 22,5 | 84,8 | 77,4 | 92,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 220 |
| Ville | 10,3 | 5,4 | 15,1 | 89,7 | 84,8 | 94,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 293 |
| Agglomération | 8,8 | 5,6 | 11,9 | 91,1 | 88,0 | 94,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 540 |
| Zone rurale | 13,5 | 8,0 | 18,9 | 86,5 | 81,1 | 92,0 | . | . | . | 251 |
| Medical Home | 13,7 | 9,6 | 17,8 | 86,3 | 82,2 | 90,4 | . | . | . | 392 |
| Sans Medical Home | 12,4 | 5,5 | 19,2 | 87,6 | 80,8 | 94,5 | . | . | . | 180 |
| Suisse alémanique | 10,6 | 7,4 | 13,7 | 89,4 | 86,3 | 92,6 | . | . | . | 551 |
| Suisse romande | 9,3 | 5,8 | 12,8 | 90,3 | 86,7 | 93,9 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 355 |
| Suisse italienne | 11,8 | 6,8 | 16,9 | 88,2 | 83,1 | 93,2 | . | . | . | 178 |
| VD | 5,1 | 2,1 | 8,0 | 94,7 | 91,7 | 97,7 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 178 |
| CH sans VD | 10,8 | 8,2 | 13,4 | 89,1 | 86,5 | 91,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.169 S'est vu diagnostiquer un cancer, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 18,7 | 16,1 | 21,4 | 78,3 | 75,6 | 81,1 | 2,5 | 1,6 | 3,4 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 1392 |
| CA | 15,1 | 13,7 | 16,6 | 80,4 | 78,8 | 82,0 | 4,2 | 3,4 | 4,9 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 4549 |
| NO | 13,9 | 10,9 | 16,9 | 81,9 | 78,6 | 85,3 | 3,9 | 2,2 | 5,6 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 750 |
| UK | 12,4 | 9,8 | 15,1 | 83,7 | 80,8 | 86,7 | 3,6 | 2,1 | 5,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 753 |
| NL | 11,5 | 9,0 | 13,9 | 86,2 | 83,6 | 88,9 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 750 |
| SE | 11,0 | 10,1 | 11,9 | 80,6 | 79,4 | 81,7 | 8,0 | 7,3 | 8,8 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 7000 |
| AU | 10,8 | 8,4 | 13,1 | 84,6 | 81,9 | 87,3 | 4,3 | 2,8 | 5,8 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2500 |
| DE | 10,3 | 7,9 | 12,7 | 85,3 | 82,5 | 88,2 | 3,6 | 2,1 | 5,2 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 751 |
| CH | 10,0 | 8,5 | 11,4 | 86,6 | 84,9 | 88,3 | 3,3 | 2,5 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| NZ | 7,9 | 5,0 | 10,9 | 87,8 | 84,4 | 91,3 | 3,9 | 1,9 | 5,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 500 |
| FR | 4,8 | 3,1 | 6,5 | 94,1 | 92,3 | 96,0 | 1,0 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.170 S'est vu diagnostiquer un cancer, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 22,2 | 19,2 | 25,2 | 77,3 | 74,2 | 80,3 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 1116 |
| NL | 16,4 | 12,4 | 20,4 | 82,3 | 78,2 | 86,5 | 1,2 | 0,0 | 2,8 | 582 |
| CA | 16,3 | 14,5 | 18,0 | 83,1 | 81,3 | 84,8 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 3147 |
| AU | 16,2 | 12,0 | 20,5 | 83,1 | 78,8 | 87,3 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 1670 |
| SE | 14,5 | 13,1 | 16,0 | 85,3 | 83,9 | 86,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 5000 |
| NO | 14,1 | 10,8 | 17,3 | 85,7 | 82,4 | 88,9 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 651 |
| NZ | 13,5 | 9,2 | 17,8 | 86,2 | 81,9 | 90,5 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 379 |
| DE | 12,7 | 9,1 | 16,4 | 86,5 | 82,7 | 90,2 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 547 |
| CH | 11,1 | 8,9 | 13,2 | 88,6 | 86,4 | 90,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1084 |
| UK | 6,9 | 4,4 | 9,3 | 93,1 | 90,7 | 95,6 | . | . | . | 581 |
| FR | 5,9 | 4,1 | 7,6 | 94,1 | 92,4 | 95,9 | . | . | . | 860 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.171 S'est vu diagnostiquer un cancer, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 10,0 | 8,5 | 11,4 | 86,6 | 84,9 | 88,3 | 3,3 | 2,5 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| Homme | 12,2 | 9,8 | 14,7 | 84,4 | 81,7 | 87,1 | 3,3 | 2,0 | 4,5 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 1526 |
| Femme | 8,1 | 6,3 | 10,0 | 88,3 | 86,2 | 90,5 | 3,4 | 2,2 | 4,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1712 |
| 65-69 ans | 10,2 | 7,2 | 13,3 | 87,1 | 83,8 | 90,3 | 2,7 | 1,4 | 4,0 | . | . | . | 828 |
| 70-74 ans | 12,0 | 8,9 | 15,0 | 84,2 | 80,8 | 87,7 | 3,6 | 1,8 | 5,5 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 954 |
| 75-79 ans | 9,3 | 6,2 | 12,3 | 87,2 | 83,7 | 90,7 | 3,5 | 1,7 | 5,4 | . | . | . | 697 |
| 80+ ans | 8,2 | 5,5 | 10,9 | 87,9 | 84,6 | 91,1 | 3,7 | 1,7 | 5,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 9,2 | 6,2 | 12,2 | 88,0 | 84,6 | 91,3 | 2,8 | 1,2 | 4,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 706 |
| Secondaire II | 10,5 | 8,5 | 12,5 | 86,1 | 83,9 | 88,3 | 3,3 | 2,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1765 |
| Tertiaire | 8,9 | 5,8 | 12,0 | 85,9 | 82,1 | 89,7 | 4,8 | 2,4 | 7,2 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 10,0 | 8,3 | 11,7 | 86,1 | 84,2 | 88,1 | 3,7 | 2,7 | 4,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 9,8 | 6,8 | 12,8 | 87,8 | 84,6 | 91,0 | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 807 |
| Né en Suisse | 10,4 | 8,6 | 12,1 | 86,1 | 84,2 | 88,1 | 3,4 | 2,4 | 4,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2217 |
| Né à l'étranger | 8,5 | 5,6 | 11,5 | 88,1 | 84,9 | 91,3 | 3,1 | 1,7 | 4,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1015 |
| Medical Home | 14,9 | 12,1 | 17,8 | 80,7 | 77,6 | 83,8 | 4,4 | 2,8 | 6,0 | . | . | . | 1249 |
| Sans Medical Home | 8,8 | 5,5 | 12,2 | 89,0 | 85,4 | 92,6 | 2,0 | 0,6 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 726 |
| Ville | 9,1 | 6,4 | 11,9 | 85,3 | 82,0 | 88,7 | 5,5 | 3,4 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1026 |
| Agglomération | 9,9 | 7,8 | 12,1 | 87,1 | 84,7 | 89,5 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1643 |
| Zone rurale | 11,2 | 7,6 | 14,8 | 87,3 | 83,6 | 91,1 | 1,3 | 0,1 | 2,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 454 |
| Suisse alémanique | 9,7 | 7,7 | 11,6 | 86,9 | 84,7 | 89,1 | 3,3 | 2,2 | 4,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1040 |
| Suisse romande | 11,4 | 9,1 | 13,6 | 85,1 | 82,6 | 87,6 | 3,4 | 2,2 | 4,5 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1869 |
| Suisse italienne | 7,5 | 4,5 | 10,5 | 89,0 | 85,5 | 92,5 | 3,5 | 1,5 | 5,5 | . | . | . | 329 |
| ZH | 8,3 | 5,2 | 11,3 | 88,4 | 84,9 | 91,9 | 3,1 | 1,3 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 332 |
| CH sans ZH | 10,3 | 8,6 | 12,0 | 86,2 | 84,3 | 88,1 | 3,4 | 2,4 | 4,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2906 |
| VD | 9,1 | 5,7 | 12,4 | 87,7 | 84,0 | 91,5 | 3,0 | 1,2 | 4,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 10,0 | 8,4 | 11,6 | 86,5 | 84,7 | 88,3 | 3,4 | 2,5 | 4,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2914 |
| VS | 9,3 | 5,8 | 12,9 | 86,2 | 81,9 | 90,4 | 4,0 | 1,5 | 6,4 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 321 |
| CH sans VS | 10,0 | 8,4 | 11,5 | 86,6 | 84,8 | 88,3 | 3,3 | 2,4 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2917 |
| GE | 10,6 | 8,7 | 12,5 | 84,4 | 82,2 | 86,7 | 4,9 | 3,5 | 6,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1160 |
| CH sans GE | 9,9 | 8,3 | 11,5 | 86,7 | 84,9 | 88,5 | 3,3 | 2,3 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.172 S'est vu diagnostiquer un cancer, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 11,1 | 8,9 | 13,2 | 88,6 | 86,4 | 90,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1084 |
| Homme | 13,6 | 10,1 | 17,1 | 86,2 | 82,6 | 89,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 493 |
| Femme | 9,1 | 6,5 | 11,8 | 90,4 | 87,7 | 93,1 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 591 |
| 65-69 ans | 10,1 | 6,4 | 13,8 | 89,6 | 85,9 | 93,4 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 349 |
| 70-74 ans | 12,3 | 8,0 | 16,6 | 87,6 | 83,3 | 91,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 300 |
| 75-79 ans | 10,6 | 6,1 | 15,1 | 88,4 | 83,7 | 93,1 | 1,0 | 0,0 | 2,6 | 209 |
| 80+ ans | 11,4 | 6,6 | 16,1 | 88,5 | 83,8 | 93,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 7,0 | 3,1 | 10,8 | 93,0 | 89,2 | 96,9 | . | . | . | 216 |
| Secondaire II | 12,5 | 9,7 | 15,4 | 87,2 | 84,4 | 90,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 628 |
| Tertiaire | 10,6 | 5,7 | 15,4 | 89,2 | 84,4 | 94,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 20,0 | 12,4 | 27,6 | 80,0 | 72,4 | 87,6 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 8,2 | 4,6 | 11,9 | 90,8 | 86,7 | 94,9 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 10,2 | 7,6 | 12,8 | 89,6 | 86,9 | 92,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 645 |
| Né en Suisse | 11,4 | 9,0 | 13,8 | 88,3 | 85,8 | 90,7 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 863 |
| Né à l'étranger | 9,7 | 5,0 | 14,4 | 90,0 | 85,3 | 94,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 220 |
| Ville | 12,9 | 8,3 | 17,5 | 86,9 | 82,3 | 91,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 293 |
| Agglomération | 11,1 | 8,1 | 14,2 | 88,3 | 85,1 | 91,4 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 540 |
| Zone rurale | 9,0 | 5,2 | 12,7 | 91,0 | 87,3 | 94,8 | . | . | . | 251 |
| Medical Home | 18,5 | 13,8 | 23,2 | 81,2 | 76,5 | 86,0 | 0,3 | 0 | 0,6 | 392 |
| Sans Medical Home | 5,2 | 2,3 | 8,0 | 94,8 | 92,0 | 97,7 | . | . | . | 180 |
| Suisse alémanique | 10,7 | 8,0 | 13,4 | 89,0 | 86,2 | 91,7 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 551 |
| Suisse romande | 12,6 | 8,8 | 16,3 | 87,1 | 83,3 | 90,9 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 355 |
| Suisse italienne | 9,0 | 3,5 | 14,6 | 90,4 | 84,8 | 96,0 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 178 |
| VD | 15,4 | 9,7 | 21,2 | 83,7 | 77,8 | 89,5 | 0,9 | 0,0 | 2,3 | 178 |
| CH sans VD | 10,7 | 8,4 | 12,9 | 89,1 | 86,7 | 91,4 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.173 S'est vu diagnostiquer des douleurs articulaires, de l'arthrite, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 56,0 | 52,6 | 59,4 | 42,7 | 39,3 | 46,1 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 1392 |
| CA | 51,3 | 49,3 | 53,3 | 47,0 | 45,0 | 49,0 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 4549 |
| UK | 50,6 | 46,6 | 54,6 | 48,0 | 44,0 | 52,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 753 |
| FR | 47,7 | 43,8 | 51,5 | 52,0 | 48,1 | 55,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | . | . | . | 750 |
| DE | 42,9 | 38,9 | 46,8 | 55,5 | 51,5 | 59,4 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 1,6 | 751 |
| AU | 41,8 | 38,0 | 45,7 | 57,6 | 53,7 | 61,4 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 2500 |
| CH | 37,8 | 35,5 | 40,2 | 59,5 | 57,1 | 61,9 | 2,5 | 1,7 | 3,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 3238 |
| NZ | 37,0 | 32,0 | 41,9 | 62,3 | 57,4 | 67,3 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 500 |
| SE | 32,6 | 31,2 | 34,0 | 59,9 | 58,5 | 61,4 | 7,0 | 6,2 | 7,7 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 7000 |
| NL | 27,3 | 23,8 | 30,7 | 71,9 | 68,4 | 75,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 750 |
| NO | 25,5 | 21,7 | 29,2 | 73,8 | 70,1 | 77,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.174 S'est vu diagnostiquer des douleurs articulaires, de l'arthrite, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| FR | 60,9 | 57,0 | 64,9 | 38,5 | 34,6 | 42,5 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 860 |
| US | 55,5 | 51,8 | 59,3 | 43,8 | 40,0 | 47,5 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 1116 |
| CA | 48,0 | 45,7 | 50,4 | 51,4 | 49,0 | 53,8 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 3147 |
| AU | 44,0 | 38,4 | 49,7 | 55,6 | 50,0 | 61,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1670 |
| DE | 39,3 | 34,1 | 44,4 | 59,8 | 54,6 | 65,0 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 547 |
| CH | 39,2 | 35,5 | 42,9 | 60,5 | 56,8 | 64,2 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1084 |
| UK | 34,2 | 29,5 | 38,8 | 65,8 | 61,2 | 70,5 | . | . | . | 581 |
| NZ | 32,2 | 26,0 | 38,4 | 66,4 | 60,1 | 72,7 | 1,4 | 0,0 | 3,2 | 379 |
| NL | 31,0 | 26,1 | 35,9 | 68,7 | 63,8 | 73,6 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 582 |
| SE | 24,8 | 23,1 | 26,5 | 74,4 | 72,7 | 76,2 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 5000 |
| NO | 24,1 | 20,0 | 28,1 | 75,4 | 71,3 | 79,4 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 651 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.175 S'est vu diagnostiquer des douleurs articulaires, de l'arthrite, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 37,8 | 35,5 | 40,2 | 59,5 | 57,1 | 61,9 | 2,5 | 1,7 | 3,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 3238 |
| Homme | 31,4 | 28,1 | 34,7 | 65,7 | 62,3 | 69,0 | 2,7 | 1,6 | 3,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1526 |
| Femme | 43,0 | 39,6 | 46,3 | 54,5 | 51,2 | 57,9 | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1712 |
| 65–69 ans | 34,8 | 30,3 | 39,3 | 63,4 | 58,8 | 68,0 | 1,8 | 0,6 | 3,0 | . | . | . | 828 |
| 70–74 ans | 33,8 | 29,6 | 38,1 | 62,6 | 58,2 | 67,0 | 3,3 | 1,5 | 5,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 954 |
| 75–79 ans | 42,1 | 36,9 | 47,4 | 55,0 | 49,7 | 60,3 | 2,5 | 0,9 | 4,2 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 697 |
| 80+ ans | 41,7 | 36,7 | 46,6 | 55,7 | 50,7 | 60,7 | 2,4 | 0,8 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 44,1 | 39,0 | 49,2 | 53,6 | 48,4 | 58,7 | 2,4 | 0,7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 706 |
| Secondaire II | 36,5 | 33,4 | 39,5 | 60,9 | 57,8 | 63,9 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1765 |
| Tertiaire | 32,0 | 26,9 | 37,0 | 64,9 | 59,8 | 70,1 | 2,7 | 1,0 | 4,3 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 35,8 | 33,0 | 38,5 | 61,8 | 59,1 | 64,6 | 2,2 | 1,4 | 3,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 43,8 | 39,0 | 48,6 | 52,7 | 47,9 | 57,5 | 3,2 | 1,4 | 5,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 807 |
| Né en Suisse | 35,8 | 33,1 | 38,5 | 61,7 | 59,0 | 64,5 | 2,3 | 1,5 | 3,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2217 |
| Né à l'étranger | 45,4 | 40,5 | 50,3 | 51,1 | 46,2 | 56,0 | 3,1 | 1,3 | 4,9 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1015 |
| Medical Home | 43,5 | 39,5 | 47,4 | 54,5 | 50,5 | 58,4 | 1,9 | 0,9 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1249 |
| Sans Medical Home | 39,2 | 33,8 | 44,6 | 56,9 | 51,4 | 62,4 | 3,7 | 1,5 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 726 |
| Ville | 34,4 | 30,2 | 38,6 | 61,3 | 56,9 | 65,6 | 4,2 | 2,2 | 6,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1026 |
| Agglomération | 38,1 | 34,6 | 41,5 | 59,8 | 56,3 | 63,2 | 2,0 | 1,0 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1643 |
| Zone rurale | 42,2 | 36,5 | 47,8 | 55,9 | 50,2 | 61,5 | 1,9 | 0,3 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 34,9 | 31,7 | 38,0 | 62,3 | 59,1 | 65,5 | 2,7 | 1,7 | 3,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1040 |
| Suisse romande | 44,6 | 41,3 | 47,9 | 52,9 | 49,6 | 56,3 | 1,9 | 1,2 | 2,7 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1869 |
| Suisse italienne | 45,8 | 40,2 | 51,4 | 52,5 | 47,0 | 58,1 | 1,7 | 0,2 | 3,1 | . | . | . | 329 |
| ZH | 33,1 | 27,8 | 38,3 | 62,9 | 57,5 | 68,3 | 3,9 | 1,7 | 6,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 332 |
| CH sans ZH | 38,8 | 36,2 | 41,5 | 58,8 | 56,1 | 61,5 | 2,2 | 1,4 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2906 |
| VD | 41,2 | 35,5 | 46,8 | 55,9 | 50,2 | 61,5 | 2,2 | 0,6 | 3,7 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 324 |
| CH sans VD | 37,5 | 35,0 | 40,1 | 59,8 | 57,2 | 62,4 | 2,5 | 1,7 | 3,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2914 |
| VS | 43,0 | 37,1 | 48,8 | 52,9 | 47,1 | 58,8 | 3,8 | 1,6 | 6,0 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 321 |
| CH sans VS | 37,6 | 35,1 | 40,1 | 59,8 | 57,3 | 62,3 | 2,4 | 1,6 | 3,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2917 |
| GE | 47,2 | 44,2 | 50,3 | 50,4 | 47,4 | 53,5 | 2,0 | 1,1 | 2,9 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1160 |
| CH sans GE | 37,3 | 34,8 | 39,8 | 60,0 | 57,5 | 62,6 | 2,5 | 1,7 | 3,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.176 S'est vu diagnostiquer des douleurs articulaires, de l'arthrite, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 39,2 | 35,5 | 42,9 | 60,5 | 56,8 | 64,2 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1084 |
| Homme | 34,3 | 28,7 | 39,8 | 65,7 | 60,1 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 493 |
| Femme | 42,9 | 38,0 | 47,9 | 56,6 | 51,7 | 61,6 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 591 |
| 65–69 ans | 43,7 | 36,9 | 50,4 | 56,3 | 49,6 | 63,1 | . | . | . | 349 |
| 70–74 ans | 38,8 | 31,9 | 45,8 | 60,7 | 53,8 | 67,7 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 300 |
| 75–79 ans | 33,9 | 26,0 | 41,8 | 66,1 | 58,2 | 74,0 | . | . | . | 209 |
| 80+ ans | 39,1 | 31,0 | 47,2 | 60,2 | 52,1 | 68,3 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 38,7 | 30,3 | 47,1 | 61,2 | 52,8 | 69,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 216 |
| Secondaire II | 39,8 | 35,1 | 44,5 | 59,8 | 55,1 | 64,5 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 628 |
| Tertiaire | 38,7 | 30,2 | 47,2 | 61,1 | 52,6 | 69,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 36,4 | 28,0 | 44,8 | 63,6 | 55,2 | 72,0 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 35,9 | 27,3 | 44,6 | 63,2 | 54,5 | 71,9 | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 41,9 | 37,1 | 46,8 | 57,9 | 53,1 | 62,8 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 645 |
| Né en Suisse | 38,2 | 34,2 | 42,3 | 61,5 | 57,4 | 65,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 863 |
| Né à l'étranger | 44,0 | 35,0 | 53,1 | 55,9 | 46,8 | 64,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 220 |
| Ville | 37,3 | 30,2 | 44,5 | 62,5 | 55,4 | 69,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 293 |
| Agglomération | 40,0 | 34,7 | 45,2 | 60,0 | 54,8 | 65,3 | . | . | . | 540 |
| Zone rurale | 39,7 | 32,1 | 47,4 | 59,3 | 51,7 | 67,0 | 0,9 | 0,0 | 2,4 | 251 |
| Medical Home | 48,6 | 42,4 | 54,8 | 50,9 | 44,7 | 57,1 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 392 |
| Sans Medical Home | 30,4 | 21,4 | 39,5 | 69,2 | 60,1 | 78,2 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 180 |
| Suisse alémanique | 40,0 | 35,2 | 44,7 | 59,9 | 55,2 | 64,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 551 |
| Suisse romande | 35,8 | 29,8 | 41,7 | 63,4 | 57,4 | 69,4 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 355 |
| Suisse italienne | 44,5 | 36,2 | 52,7 | 55,1 | 46,8 | 63,4 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 178 |
| VD | 33,2 | 25,6 | 40,7 | 64,6 | 56,7 | 72,4 | 2,3 | 0,0 | 6,2 | 178 |
| CH sans VD | 39,8 | 35,8 | 43,8 | 60,1 | 56,1 | 64,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.177 S'est vu diagnostiquer une attaque cérébrale, un AVC, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 9,6 | 7,5 | 11,7 | 88,9 | 86,6 | 91,1 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 1392 |
| UK | 8,5 | 6,3 | 10,7 | 90,6 | 88,3 | 92,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 753 |
| DE | 7,9 | 5,7 | 10,0 | 91,7 | 89,5 | 93,9 | . | . | . | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 751 |
| SE | 7,7 | 6,9 | 8,5 | 90,3 | 89,5 | 91,2 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 7000 |
| CA | 7,5 | 6,4 | 8,6 | 91,7 | 90,6 | 92,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 4549 |
| NO | 6,2 | 4,3 | 8,2 | 93,4 | 91,4 | 95,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | . | . | . | 750 |
| CH | 5,4 | 4,3 | 6,5 | 93,5 | 92,2 | 94,7 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 3238 |
| NL | 5,0 | 3,3 | 6,6 | 94,4 | 92,7 | 96,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 750 |
| AU | 4,5 | 3,1 | 5,9 | 93,9 | 92,4 | 95,5 | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 2500 |
| FR | 4,2 | 2,5 | 5,8 | 95,8 | 94,2 | 97,5 | . | . | . | . | . | . | 750 |
| NZ | 2,7 | 1,1 | 4,3 | 97,2 | 95,5 | 98,8 | . | . | . | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 500 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan

Tableau 6.178 S'est vu diagnostiquer une attaque cérébrale, un AVC, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 5,4 | 4,3 | 6,5 | 93,5 | 92,2 | 94,7 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 3238 |
| Homme | 7,6 | 5,6 | 9,6 | 90,8 | 88,6 | 92,9 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1526 |
| Femme | 3,6 | 2,4 | 4,9 | 95,6 | 94,2 | 96,9 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1712 |
| 65–69 ans | 3,7 | 1,9 | 5,5 | 95,3 | 93,4 | 97,3 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 828 |
| 70–74 ans | 5,0 | 2,9 | 7,1 | 94,5 | 92,3 | 96,6 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 954 |
| 75–79 ans | 6,3 | 3,7 | 8,9 | 92,0 | 89 | 95,0 | 1,3 | 0,0 | 2,6 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 697 |
| 80+ ans | 7,0 | 4,5 | 9,6 | 91,5 | 88,8 | 94,3 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 5,3 | 3,2 | 7,5 | 94,1 | 91,8 | 96,4 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | . | . | . | 706 |
| Secondaire II | 5,5 | 4,0 | 7,0 | 93,4 | 91,8 | 95,1 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1765 |
| Tertiaire | 4,3 | 2,3 | 6,2 | 93,6 | 91,1 | 96,1 | 1,5 | 0,1 | 2,9 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 5,6 | 4,3 | 7,0 | 93,3 | 91,8 | 94,7 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 4,8 | 2,7 | 6,8 | 94,0 | 91,7 | 96,3 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 807 |
| Né en Suisse | 5,2 | 3,9 | 6,5 | 93,8 | 92,4 | 95,2 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2217 |
| Né à l'étranger | 6,2 | 3,9 | 8,5 | 92,1 | 89,5 | 94,7 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 1015 |
| Medical Home | 6,0 | 4,0 | 7,9 | 92,1 | 90,0 | 94,3 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 1249 |
| Sans Medical Home | 4,3 | 2,1 | 6,4 | 95,4 | 93,2 | 97,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 726 |
| Ville | 4,9 | 2,9 | 6,9 | 93,4 | 91,0 | 95,8 | 1,2 | 0,1 | 2,4 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 1026 |
| Agglomération | 6,4 | 4,7 | 8,2 | 92,6 | 90,7 | 94,4 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1643 |
| Zone rurale | 4,2 | 2,1 | 6,3 | 95,1 | 92,9 | 97,3 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 454 |
| Suisse alémanique | 5,4 | 3,9 | 6,9 | 93,4 | 91,8 | 95,1 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1040 |
| Suisse romande | 5,8 | 4,2 | 7,3 | 93,3 | 91,7 | 95,0 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1869 |
| Suisse italienne | 4,4 | 2,2 | 6,5 | 94,1 | 91,5 | 96,7 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | . | . | . | 329 |
| ZH | 4,3 | 2,1 | 6,5 | 94,7 | 92,4 | 97,1 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 332 |
| CH sans ZH | 5,6 | 4,4 | 6,9 | 93,2 | 91,8 | 94,6 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 2906 |
| VD | 5,0 | 2,7 | 7,3 | 93,9 | 91,3 | 96,5 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 324 |
| CH sans VD | 5,5 | 4,2 | 6,7 | 93,4 | 92,1 | 94,7 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 2914 |
| VS | 4,6 | 2,1 | 7,1 | 94,4 | 91,6 | 97,2 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 321 |
| CH sans VS | 5,4 | 4,3 | 6,6 | 93,4 | 92,1 | 94,7 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 2917 |
| GE | 6,0 | 4,6 | 7,4 | 92,6 | 91,0 | 94,2 | 1,4 | 0,7 | 2,2 | . | . | . | 1160 |
| CH sans GE | 5,4 | 4,2 | 6,6 | 93,5 | 92,2 | 94,8 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.179 S'est vu diagnostiquer des problèmes neurologiques, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 97,8 | 97,1 | 98,5 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 3238 |
| Homme | 1,7 | 0,7 | 2,6 | 97,8 | 96,8 | 98,9 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1526 |
| Femme | 2,0 | 1,1 | 2,9 | 97,8 | 96,9 | 98,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1712 |
| 65–69 ans | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 99,1 | 98,4 | 99,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | . | . | . | 828 |
| 70–74 ans | 1,5 | 0,2 | 2,8 | 97,9 | 96,4 | 99,4 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 954 |
| 75–79 ans | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 99,4 | 99 | 99,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 697 |
| 80+ ans | 4,6 | 2,6 | 6,6 | 94,9 | 92,8 | 97 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 2,1 | 0,8 | 3,4 | 97,7 | 96,3 | 99,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | . | . | . | 706 |
| Secondaire II | 1,8 | 1,0 | 2,7 | 98,0 | 97,1 | 98,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1765 |
| Tertiaire | 1,5 | 0,2 | 2,9 | 97,3 | 95,5 | 99,1 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 1,7 | 1,0 | 2,4 | 97,9 | 97,2 | 98,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 2,3 | 1,0 | 3,7 | 97,5 | 96,1 | 98,9 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 807 |
| Né en Suisse | 1,9 | 1,1 | 2,6 | 97,9 | 97,2 | 98,7 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2217 |
| Né à l'étranger | 1,8 | 0,5 | 3,0 | 97,5 | 96,0 | 98,9 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 1015 |
| Medical Home | 2,0 | 0,9 | 3,0 | 97,8 | 96,7 | 98,8 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | . | . | . | 1249 |
| Sans Medical Home | 3,1 | 1,2 | 5,0 | 96,1 | 93,9 | 98,3 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 726 |
| Ville | 2,4 | 1,1 | 3,7 | 97,5 | 96,1 | 98,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1026 |
| Agglomération | 1,3 | 0,6 | 2,1 | 98,2 | 97,3 | 99,0 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | . | . | . | 1643 |
| Zone rurale | 2,7 | 0,7 | 4,7 | 97,2 | 95,2 | 99,2 | . | . | . | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 98,1 | 97,3 | 99,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1040 |
| Suisse romande | 2,4 | 1,4 | 3,4 | 97,1 | 96,0 | 98,1 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1869 |
| Suisse italienne | 2,4 | 0,7 | 4,1 | 97,1 | 95,2 | 99,0 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | . | . | . | 329 |
| ZH | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 99,1 | 98,0 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | 332 |
| CH sans ZH | 2,0 | 1,3 | 2,8 | 97,6 | 96,8 | 98,4 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2906 |
| VD | 3,4 | 1,3 | 5,5 | 96,0 | 93,8 | 98,2 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 1,7 | 1,0 | 2,4 | 98,0 | 97,3 | 98,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2914 |
| VS | 1,9 | 0,2 | 3,5 | 98,1 | 96,5 | 99,8 | . | . | . | . | . | . | 321 |
| CH sans VS | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 97,8 | 97,1 | 98,5 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2917 |
| GE | 2,0 | 1,1 | 3,0 | 97,2 | 96,2 | 98,3 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1160 |
| CH sans GE | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 97,9 | 97,1 | 98,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.180 S'est vu diagnostiquer des problèmes neurologiques, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 2,3 | 1,1 | 3,5 | 97,7 | 96,5 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1084 |
| Homme | 2,7 | 0,9 | 4,4 | 97,3 | 95,5 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 493 |
| Femme | 2,0 | 0,5 | 3,6 | 98,0 | 96,4 | 99,5 | . | . | . | 591 |
| 65–69 ans | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 99,2 | 98,2 | 100,0 | . | . | . | 349 |
| 70–74 ans | 2,1 | 0,1 | 4,1 | 97,8 | 95,8 | 99,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 300 |
| 75–79 ans | 4,8 | 1,0 | 8,6 | 95,2 | 91,4 | 99,0 | . | . | . | 209 |
| 80+ ans | 2,0 | 0,0 | 4,4 | 98,0 | 95,6 | 100,0 | . | . | . | 226 |
| Scolarité obligatoire | 1,3 | 0,0 | 3,3 | 98,7 | 96,7 | 100,0 | . | . | . | 216 |
| Secondaire II | 3,0 | 1,3 | 4,6 | 97,0 | 95,4 | 98,7 | . | . | . | 628 |
| Tertiaire | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 99,1 | 98,3 | 100,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 2,6 | 0,0 | 5,3 | 97,4 | 94,7 | 100,0 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 4,1 | 0,4 | 7,7 | 95,9 | 92,3 | 99,6 | . | . | . | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 1,9 | 0,5 | 3,3 | 98,1 | 96,7 | 99,5 | . | . | . | 645 |
| Né en Suisse | 2,7 | 1,3 | 4,1 | 97,3 | 95,9 | 98,7 | . | . | . | 863 |
| Né à l'étranger | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 99,4 | 98,5 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 220 |
| Ville | 1,7 | 0,0 | 3,6 | 98,2 | 96,3 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 293 |
| Agglomération | 2,2 | 0,5 | 3,8 | 97,8 | 96,2 | 99,5 | . | . | . | 540 |
| Zone rurale | 3,2 | 0,5 | 6,0 | 96,8 | 94,0 | 99,5 | . | . | . | 251 |
| Medical Home | 2,6 | 0,5 | 4,7 | 97,4 | 95,3 | 99,5 | . | . | . | 392 |
| Sans Medical Home | 2,8 | 0,0 | 6,1 | 97,2 | 93,9 | 100,0 | . | . | . | 180 |
| Suisse alémanique | 2,6 | 1,0 | 4,1 | 97,4 | 95,9 | 99,0 | . | . | . | 551 |
| Suisse romande | 2,0 | 0,4 | 3,6 | 97,9 | 96,3 | 99,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 355 |
| Suisse italienne | . | . | . | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . | 178 |
| VD | 1,7 | 0,0 | 3,5 | 98,1 | 96,2 | 99,9 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 178 |
| CH sans VD | 2,4 | 1,1 | 3,6 | 97,6 | 96,4 | 98,9 | . | . | . | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.181 Maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement, suite), comparaison internationale (2017, en %)

| Dépression, anxiété, autres problèmes psychiques | | | | Cancer | | | Douleurs articulaires, arthrite | | | Attaque cérébrale, AVC | | | Échantillon | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------|------------------|------------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 19,6 | 16,7 | 22,4 | US | 21,2 | 18,5 | 24,0 | US | 56,7 | 53,3 | 60,1 | US | 10,2 | 8,0 | 12,3 | 1392 |
| UK | 16,0 | 13,0 | 19,0 | CA | 19,3 | 17,7 | 20,9 | CA | 52,2 | 50,2 | 54,2 | SE | 9,2 | 8,4 | 10,0 | 7000 |
| AU | 14,4 | 12,0 | 16,9 | SE | 19,0 | 17,9 | 20,2 | UK | 51,1 | 47,1 | 55,1 | UK | 8,9 | 6,6 | 11,1 | 753 |
| CA | 14,4 | 13,1 | 15,7 | NO | 17,8 | 14,5 | 21,1 | FR | 48,0 | 44,1 | 51,9 | DE | 7,9 | 5,7 | 10,0 | 751 |
| SE | 12,0 | 11,0 | 13,0 | UK | 16,0 | 13,1 | 19,0 | DE | 43,6 | 39,6 | 47,5 | CA | 7,6 | 6,5 | 8,8 | 4549 |
| FR | 11,5 | 9,0 | 14,1 | AU | 15,1 | 12,4 | 17,8 | AU | 42,2 | 38,4 | 46,1 | NO | 6,6 | 4,5 | 8,6 | 750 |
| CH | 11,2 | 9,7 | 12,7 | DE | 13,9 | 11,1 | 16,7 | CH | 40,3 | 37,9 | 42,7 | CH | 6,3 | 5,1 | 7,5 | 3238 |
| NZ | 10,0 | 7,1 | 13,0 | NL | 13,7 | 11,1 | 16,4 | SE | 39,5 | 38,1 | 41,0 | AU | 5,8 | 4,2 | 7,3 | 2500 |
| DE | 9,6 | 7,2 | 12,1 | CH | 13,3 | 11,6 | 15,0 | NZ | 37,5 | 32,6 | 42,5 | NL | 5,2 | 3,5 | 6,8 | 750 |
| NO | 9,2 | 6,7 | 11,7 | NZ | 11,9 | 8,4 | 15,3 | NL | 27,4 | 23,9 | 30,8 | FR | 4,2 | 2,5 | 5,8 | 750 |
| NL | 6,2 | 4,4 | 8,0 | FR | 5,8 | 3,9 | 7,6 | NO | 25,6 | 21,8 | 29,3 | NZ | 2,7 | 1,1 | 4,3 | 500 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.182 Maladies chroniques diagnostiquées (suite), comparaison internationale (2014, en %)

| Dépression, anxiété, autres problèmes psychiques | | | | Cancer | | | Douleurs articulaires, arthrite | | | Échantillon | | |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|----------------|---------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 20,4 | 17,4 | 23,4 | US | 22,2 | 19,2 | 25,2 | FR | 60,9 | 57,0 | 64,9 | 860 |
| NO | 13,9 | 10,4 | 17,5 | NL | 16,4 | 12,4 | 20,4 | US | 55,5 | 51,8 | 59,3 | 1116 |
| AU | 12,3 | 9,0 | 15,7 | CA | 16,3 | 14,5 | 18,0 | CA | 48,0 | 45,7 | 50,4 | 3147 |
| CA | 12,2 | 10,8 | 13,7 | AU | 16,2 | 12,0 | 20,5 | AU | 44,0 | 38,4 | 49,7 | 1670 |
| NZ | 11,9 | 7,3 | 16,4 | SE | 14,5 | 13,1 | 16,0 | DE | 39,3 | 34,1 | 44,4 | 547 |
| CH | 10,3 | 7,9 | 12,7 | NO | 14,1 | 10,8 | 17,3 | CH | 39,2 | 35,5 | 42,9 | 1084 |
| DE | 8,3 | 5,3 | 11,2 | NZ | 13,5 | 9,2 | 17,8 | UK | 34,2 | 29,5 | 38,8 | 581 |
| SE | 8,3 | 7,2 | 9,3 | DE | 12,7 | 9,1 | 16,4 | NZ | 32,2 | 26,0 | 38,4 | 379 |
| FR | 7,0 | 4,9 | 9,2 | CH | 11,1 | 8,9 | 13,2 | NL | 31,0 | 26,1 | 35,9 | 582 |
| UK | 6,9 | 4,7 | 9,1 | UK | 6,9 | 4,4 | 9,3 | SE | 24,8 | 23,1 | 26,5 | 5000 |
| NL | 5,1 | 2,9 | 7,2 | FR | 5,9 | 4,1 | 7,6 | NO | 24,1 | 20,0 | 28,1 | 651 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.183 Maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement, suite), Suisse (2017, en %)

| | Dépression, anxiété, autres problèmes psychiques | | | Cancer | | | Douleurs articulaires, arthrite | | | Problèmes neurologiques (e.g. démence, maladie d'Alzheimer) | | | Attaque cérébrale, AVC | | | Échantillon n |
|---------------------------------|--|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|------------|------------|------------------------|------------|------------|---------------|
| | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 11,2 | 9,7 | 12,7 | 13,3 | 11,6 | 15,0 | 40,3 | 37,9 | 42,7 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 6,3 | 5,1 | 7,5 | 3238 |
| Homme | 7,9 | 5,9 | 9,9 | 15,5 | 12,8 | 18,1 | 34,2 | 30,8 | 37,5 | 2,1 | 1,0 | 3,1 | 9,0 | 6,8 | 11,1 | 1526 |
| Femme | 13,8 | 11,6 | 16,0 | 11,6 | 9,4 | 13,7 | 45,2 | 41,9 | 48,6 | 2,1 | 1,3 | 3,0 | 4,1 | 2,8 | 5,4 | 1712 |
| 65-69 ans | 13,7 | 10,4 | 16,9 | 12,9 | 9,7 | 16,2 | 36,6 | 32,0 | 41,2 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 4,5 | 2,5 | 6,4 | 828 |
| 70-74 ans | 10,1 | 7,5 | 12,7 | 15,6 | 12,1 | 19,0 | 37,1 | 32,7 | 41,4 | 1,9 | 0,4 | 3,4 | 5,3 | 3,2 | 7,4 | 954 |
| 75-79 ans | 10,1 | 7,0 | 13,3 | 12,8 | 9,3 | 16,3 | 44,7 | 39,4 | 50,0 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 7,5 | 4,7 | 10,4 | 697 |
| 80+ ans | 10,4 | 7,4 | 13,3 | 11,8 | 8,6 | 15,1 | 44,1 | 39,1 | 49,0 | 5,0 | 3,0 | 7,1 | 8,2 | 5,5 | 11,0 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 13,9 | 10,5 | 17,4 | 12,0 | 8,6 | 15,3 | 46,4 | 41,3 | 51,5 | 2,3 | 1,0 | 3,7 | 5,9 | 3,6 | 8,2 | 706 |
| Secondaire II | 10,8 | 8,9 | 12,8 | 13,8 | 11,6 | 16,0 | 39,0 | 35,9 | 42,1 | 2,0 | 1,1 | 2,9 | 6,3 | 4,8 | 7,9 | 1765 |
| Tertiaire | 8,0 | 5,1 | 10,8 | 13,7 | 9,9 | 17,4 | 34,6 | 29,5 | 39,8 | 2,3 | 0,6 | 3,9 | 5,7 | 3,4 | 8,1 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 10,1 | 8,4 | 11,8 | 13,7 | 11,8 | 15,7 | 38,0 | 35,2 | 40,7 | 2,0 | 1,2 | 2,7 | 6,5 | 5,1 | 8,0 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 14,2 | 10,9 | 17,6 | 12,1 | 8,9 | 15,3 | 47,0 | 42,2 | 51,8 | 2,5 | 1,1 | 3,9 | 5,6 | 3,4 | 7,7 | 807 |
| Né en Suisse | 10,8 | 9,0 | 12,5 | 13,8 | 11,8 | 15,7 | 38,1 | 35,4 | 40,9 | 2,1 | 1,3 | 2,8 | 6,1 | 4,7 | 7,4 | 2217 |
| Né à l'étranger | 12,8 | 9,6 | 15,9 | 11,6 | 8,4 | 14,8 | 48,5 | 43,6 | 53,4 | 2,3 | 1,0 | 3,6 | 7,2 | 4,8 | 9,6 | 1015 |
| Medical Home | 12,6 | 10,0 | 15,2 | 19,3 | 16,2 | 22,4 | 45,4 | 41,5 | 49,4 | 2,2 | 1,2 | 3,3 | 7,5 | 5,4 | 9,6 | 1249 |
| Sans Medical Home | 11,4 | 8,2 | 14,7 | 10,9 | 7,3 | 14,4 | 42,9 | 37,5 | 48,4 | 3,9 | 1,7 | 6,0 | 4,5 | 2,4 | 6,7 | 726 |
| Ville | 11,3 | 8,5 | 14,1 | 14,6 | 11,3 | 18,0 | 38,5 | 34,2 | 42,9 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 6,1 | 3,8 | 8,4 | 1026 |
| Agglomération | 10,8 | 8,7 | 13,0 | 12,8 | 10,5 | 15,2 | 40,0 | 36,6 | 43,5 | 1,8 | 1,0 | 2,7 | 7,4 | 5,5 | 9,3 | 1643 |
| Zone rurale | 11,8 | 8,0 | 15,5 | 12,5 | 8,8 | 16,3 | 44,1 | 38,4 | 49,7 | 2,7 | 0,7 | 4,7 | 4,7 | 2,5 | 6,9 | 454 |
| Suisse alémanique | 9,7 | 7,7 | 11,7 | 13,0 | 10,8 | 15,2 | 37,6 | 34,4 | 40,8 | 1,8 | 0,9 | 2,7 | 6,2 | 4,7 | 7,8 | 1040 |
| Suisse romande | 15,0 | 12,8 | 17,3 | 14,7 | 12,3 | 17,2 | 46,6 | 43,3 | 49,9 | 2,8 | 1,8 | 3,9 | 6,5 | 4,8 | 8,1 | 1869 |
| Suisse italienne | 12,6 | 8,8 | 16,3 | 11,0 | 7,5 | 14,5 | 47,5 | 41,9 | 53,0 | 2,9 | 1,0 | 4,8 | 5,9 | 3,3 | 8,5 | 329 |
| ZH | 8,8 | 5,6 | 12,0 | 11,4 | 7,9 | 14,9 | 37,0 | 31,6 | 42,4 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 4,9 | 2,6 | 7,2 | 332 |
| CH sans ZH | 11,7 | 10,0 | 13,4 | 13,7 | 11,8 | 15,6 | 41,0 | 38,3 | 43,7 | 2,3 | 1,6 | 3,1 | 6,6 | 5,2 | 7,9 | 2906 |
| VD | 16,4 | 12,1 | 20,6 | 12,1 | 8,4 | 15,8 | 43,3 | 37,7 | 49,0 | 3,8 | 1,6 | 6,0 | 5,6 | 3,1 | 8,1 | 324 |
| CH sans VD | 10,7 | 9,1 | 12,3 | 13,4 | 11,6 | 15,2 | 40,0 | 37,4 | 42,6 | 1,9 | 1,2 | 2,7 | 6,3 | 5,1 | 7,6 | 2914 |
| VS | 12,5 | 8,6 | 16,4 | 13,3 | 9,1 | 17,5 | 46,8 | 40,9 | 52,6 | 1,9 | 0,2 | 3,5 | 5,3 | 2,6 | 8,1 | 321 |
| CH sans VS | 11,1 | 9,5 | 12,7 | 13,3 | 11,6 | 15,0 | 40,0 | 37,5 | 42,5 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 6,3 | 5,1 | 7,6 | 2917 |
| GE | 17,2 | 14,8 | 19,5 | 15,5 | 13,2 | 17,7 | 49,2 | 46,2 | 52,3 | 2,6 | 1,6 | 3,7 | 7,4 | 5,8 | 9,0 | 1160 |
| CH sans GE | 10,8 | 9,2 | 12,4 | 13,2 | 11,4 | 14,9 | 39,8 | 37,2 | 42,3 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 6,2 | 4,9 | 7,5 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.184 Maladies chroniques diagnostiquées (suite), Suisse (2014, en %)

| | Dépression, anxiété, autres problèmes psychiques | | | Cancer | | | Douleurs articulaires, arthrite | | | Problèmes neurologiques (e.g. démence, maladie d'Alzheimer) | | | Échantillon n |
|--------------------------|--|------------|-------------|------------------|------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|------------|------------|---------------|
| | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | Part de oui en % | IC inf. | IC sup. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10,3 | 7,9 | 12,7 | 11,1 | 8,9 | 13,2 | 39,2 | 35,5 | 42,9 | 2,3 | 1,1 | 3,5 | 1084 |
| Homme | 8,3 | 4,6 | 12 | 13,6 | 10,1 | 17,1 | 34,3 | 28,7 | 39,8 | 2,7 | 0,9 | 4,4 | 493 |
| Femme | 11,9 | 8,7 | 15,1 | 9,1 | 6,5 | 11,8 | 42,9 | 38 | 47,9 | 2,0 | 0,5 | 3,6 | 591 |
| 65-69 ans | 13,2 | 7,8 | 18,6 | 10,1 | 6,4 | 13,8 | 43,7 | 36,9 | 50,4 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 349 |
| 70-74 ans | 9,6 | 5,1 | 14,1 | 12,3 | 8,0 | 16,6 | 38,8 | 31,9 | 45,8 | 2,1 | 0,1 | 4,1 | 300 |
| 75-79 ans | 8,8 | 4,3 | 13,4 | 10,6 | 6,1 | 15,1 | 33,9 | 26,0 | 41,8 | 4,8 | 1,0 | 8,6 | 209 |
| 80+ ans | 9,1 | 4,8 | 13,4 | 11,4 | 6,6 | 16,1 | 39,1 | 31,0 | 47,2 | 2,0 | 0,0 | 4,4 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 14,2 | 7,4 | 20,9 | 7,0 | 3,1 | 10,8 | 38,7 | 30,3 | 47,1 | 1,3 | 0,0 | 3,3 | 216 |
| Secondaire II | 9,4 | 6,6 | 12,1 | 12,5 | 9,7 | 15,4 | 39,8 | 35,1 | 44,5 | 3,0 | 1,3 | 4,6 | 628 |
| Tertiaire | 9,3 | 5,1 | 13,6 | 10,6 | 5,7 | 15,4 | 38,7 | 30,2 | 47,2 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 4,3 | 1,1 | 7,4 | 20 | 12,4 | 27,6 | 36,4 | 28,0 | 44,8 | 2,6 | 0,0 | 5,3 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 10,8 | 4,9 | 16,6 | 8,2 | 4,6 | 11,9 | 35,9 | 27,3 | 44,6 | 4,1 | 0,4 | 7,7 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 11,9 | 8,6 | 15,2 | 10,2 | 7,6 | 12,8 | 41,9 | 37,1 | 46,8 | 1,9 | 0,5 | 3,3 | 645 |
| Né en Suisse | 9,3 | 6,9 | 11,7 | 11,4 | 9,0 | 13,8 | 38,2 | 34,2 | 42,3 | 2,7 | 1,3 | 4,1 | 863 |
| Né à l'étranger | 15,1 | 7,6 | 22,5 | 9,7 | 5,0 | 14,4 | 44,0 | 35,0 | 53,1 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 220 |
| Ville | 10,3 | 5,4 | 15,1 | 12,9 | 8,3 | 17,5 | 37,3 | 30,2 | 44,5 | 1,7 | 0,0 | 3,6 | 293 |
| Agglomération | 8,8 | 5,6 | 11,9 | 11,1 | 8,1 | 14,2 | 40,0 | 34,7 | 45,2 | 2,2 | 0,5 | 3,8 | 540 |
| Zone rurale | 13,5 | 8,0 | 18,9 | 9,0 | 5,2 | 12,7 | 39,7 | 32,1 | 47,4 | 3,2 | 0,5 | 6 | 251 |
| Medical Home | 13,7 | 9,6 | 17,8 | 18,5 | 13,8 | 23,2 | 48,6 | 42,4 | 54,8 | 2,6 | 0,5 | 4,7 | 392 |
| Sans Medical Home | 12,4 | 5,5 | 19,2 | 5,2 | 2,3 | 8,0 | 30,4 | 21,4 | 39,5 | 2,8 | 0,0 | 6,1 | 180 |
| Suisse alémanique | 10,6 | 7,4 | 13,7 | 10,7 | 8,0 | 13,4 | 40,0 | 35,2 | 44,7 | 2,6 | 1,0 | 4,1 | 551 |
| Suisse romande | 9,3 | 5,8 | 12,8 | 12,6 | 8,8 | 16,3 | 35,8 | 29,8 | 41,7 | 2,0 | 0,4 | 3,6 | 355 |
| Suisse italienne | 11,8 | 6,8 | 16,9 | 9,0 | 3,5 | 14,6 | 44,5 | 36,2 | 52,7 | , | , | , | 178 |
| VD | 5,1 | 2,1 | 8,0 | 15,4 | 9,7 | 21,2 | 33,2 | 25,6 | 40,7 | 1,7 | 0,0 | 3,5 | 178 |
| CH sans VD | 10,8 | 8,2 | 13,4 | 10,7 | 8,4 | 12,9 | 39,8 | 35,8 | 43,8 | 2,4 | 1,1 | 3,6 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.185 Nombre de maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement, A1-A8), comparaison internationale (2017, en %)

| | Aucune maladie chronique | | | 1 maladie chronique | | | 2 maladies chroniques | | | 3 maladies chroniques ou plus | | | Échantillon n |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| NZ | 28,4 | 23,8 | 33,0 | 30,1 | 25,4 | 34,9 | 24,1 | 19,7 | 28,4 | 17,4 | 13,5 | 21,4 | 500 |
| NL | 25,2 | 21,9 | 28,6 | 33,5 | 29,8 | 37,1 | 23,1 | 19,8 | 26,3 | 18,3 | 15,3 | 21,3 | 750 |
| AU | 21,7 | 18,7 | 24,7 | 25,9 | 22,4 | 29,3 | 27,7 | 24,3 | 31,2 | 24,7 | 21,3 | 28,1 | 2500 |
| NO | 21,3 | 17,9 | 24,8 | 32,7 | 28,7 | 36,7 | 27,8 | 23,9 | 31,7 | 18,1 | 14,8 | 21,4 | 750 |
| CH | 20,9 | 18,9 | 22,9 | 32,0 | 29,6 | 34,3 | 24,9 | 22,7 | 27,0 | 22,3 | 20,2 | 24,3 | 3238 |
| FR | 20,8 | 17,9 | 23,8 | 29,5 | 26,0 | 33,0 | 26,4 | 22,9 | 29,8 | 23,3 | 19,9 | 26,7 | 750 |
| DE | 17,9 | 14,9 | 21,0 | 27,8 | 24,2 | 31,3 | 27,7 | 24,2 | 31,2 | 26,6 | 23,1 | 30,1 | 751 |
| SE | 16,2 | 15,1 | 17,3 | 28,4 | 27,1 | 29,7 | 28,3 | 26,9 | 29,6 | 27,2 | 25,9 | 28,5 | 7000 |
| UK | 15,5 | 12,7 | 18,4 | 30,3 | 26,6 | 34,0 | 26,3 | 22,7 | 29,8 | 27,9 | 24,3 | 31,5 | 753 |
| CA | 14,5 | 13,1 | 15,8 | 27,0 | 25,2 | 28,9 | 27,0 | 25,3 | 28,7 | 31,5 | 29,6 | 33,3 | 4549 |
| US | 11,5 | 9,3 | 13,7 | 19,5 | 16,9 | 22,2 | 26,8 | 23,7 | 29,8 | 42,2 | 38,8 | 45,6 | 1392 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.186 Nombre de maladies chroniques diagnostiquées (A1-A8), comparaison internationale (2014, en %)

| | Aucune maladie chronique | | | 1 maladie chronique | | | 2 maladies chroniques | | | 3 maladies chroniques ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| NZ | 35,5 | 28,7 | 42,2 | 26,2 | 19,9 | 32,5 | 18,2 | 12,9 | 23,5 | 20,0 | 14,9 | 25,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 379 |
| UK | 31,8 | 27,4 | 36,2 | 35,5 | 30,8 | 40,3 | 18,5 | 14,9 | 22,2 | 14,2 | 10,9 | 17,5 | . | . | . | 581 |
| NO | 25,5 | 21,5 | 29,5 | 31,0 | 26,6 | 35,5 | 22,1 | 18,2 | 26,0 | 21,3 | 17,3 | 25,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 651 |
| SE | 24,5 | 22,9 | 26,2 | 32,1 | 30,3 | 34,0 | 23,6 | 21,9 | 25,2 | 19,8 | 18,1 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000 |
| CH | 21,7 | 18,8 | 24,6 | 33,2 | 29,6 | 36,7 | 25,1 | 21,8 | 28,5 | 20,0 | 17,0 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1084 |
| NL | 21,0 | 17,0 | 25,1 | 32,3 | 27,5 | 37,2 | 24,4 | 20,0 | 28,8 | 22,1 | 17,7 | 26,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 582 |
| FR | 19,4 | 16,2 | 22,6 | 37,0 | 33,1 | 40,9 | 27,5 | 23,9 | 31,1 | 16,1 | 13,1 | 19,1 | . | . | . | 860 |
| DE | 18,3 | 14,1 | 22,5 | 31,4 | 26,5 | 36,3 | 23,0 | 18,6 | 27,4 | 26,7 | 22,0 | 31,4 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 547 |
| AU | 17,4 | 13,3 | 21,4 | 27,2 | 22,2 | 32,2 | 31,9 | 26,3 | 37,4 | 23,5 | 18,9 | 28,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1670 |
| CA | 16,0 | 14,3 | 17,7 | 26,5 | 24,4 | 28,6 | 27,5 | 25,4 | 29,6 | 29,8 | 27,7 | 32,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 3147 |
| US | 12,3 | 9,8 | 14,8 | 19,3 | 16,3 | 22,2 | 25,3 | 22,1 | 28,4 | 43,1 | 39,5 | 46,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1116 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.187 Nombre de maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement, A1-A8), Suisse (2017, en %)

| | Aucune maladie chronique | | | 1 maladie chronique | | | 2 maladies chroniques | | | 3 maladies chroniques ou plus | | | Échantillon n |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 20,9 | 18,9 | 22,9 | 32,0 | 29,6 | 34,3 | 24,9 | 22,7 | 27,0 | 22,3 | 20,2 | 24,3 | 3238 |
| Homme | 21,7 | 18,7 | 24,7 | 30,6 | 27,2 | 33,9 | 24,5 | 21,3 | 27,6 | 23,3 | 20,3 | 26,3 | 1526 |
| Femme | 20,3 | 17,6 | 23,0 | 33,1 | 29,9 | 36,3 | 25,2 | 22,3 | 28,1 | 21,4 | 18,6 | 24,2 | 1712 |
| 65-69 ans | 27,6 | 23,3 | 31,9 | 29,7 | 25,4 | 34,0 | 22,9 | 18,8 | 27,0 | 19,8 | 16,0 | 23,5 | 828 |
| 70-74 ans | 24,5 | 20,5 | 28,6 | 32,4 | 28,1 | 36,8 | 22,0 | 18,3 | 25,7 | 21,0 | 17,2 | 24,8 | 954 |
| 75-79 ans | 18,0 | 14,0 | 22,0 | 32,3 | 27,2 | 37,3 | 24,6 | 20,1 | 29,1 | 25,2 | 20,5 | 29,9 | 697 |
| 80+ ans | 12,2 | 8,9 | 15,5 | 33,8 | 28,9 | 38,6 | 30,2 | 25,6 | 34,9 | 23,8 | 19,6 | 28,0 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 17,1 | 13,2 | 20,9 | 28,3 | 23,7 | 33,0 | 27,2 | 22,6 | 31,7 | 27,4 | 22,8 | 32,0 | 706 |
| Secondaire II | 21,5 | 18,9 | 24,1 | 32,2 | 29,2 | 35,2 | 24,9 | 22,2 | 27,7 | 21,4 | 18,8 | 24,0 | 1765 |
| Tertiaire | 26,5 | 21,6 | 31,5 | 36,0 | 30,7 | 41,4 | 20,2 | 16,0 | 24,4 | 17,2 | 13,2 | 21,3 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 21,7 | 19,3 | 24,0 | 31,9 | 29,2 | 34,5 | 25,2 | 22,7 | 27,6 | 21,3 | 19,0 | 23,7 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 18,8 | 15,0 | 22,5 | 32,2 | 27,6 | 36,8 | 24,1 | 20,0 | 28,2 | 25,0 | 20,8 | 29,1 | 807 |
| Né en Suisse | 21,1 | 18,7 | 23,4 | 33,4 | 30,7 | 36,0 | 24,7 | 22,2 | 27,1 | 20,9 | 18,6 | 23,2 | 2217 |
| Né à l'étranger | 20,4 | 16,4 | 24,4 | 26,7 | 22,4 | 31,0 | 25,8 | 21,6 | 30,0 | 27,2 | 22,7 | 31,6 | 1015 |
| Medical Home | 14,6 | 11,8 | 17,5 | 26,9 | 23,3 | 30,4 | 28,7 | 25,1 | 32,3 | 29,8 | 26,2 | 33,5 | 1249 |
| Sans Medical Home | 22,5 | 17,8 | 27,2 | 33,4 | 28,0 | 38,7 | 24,5 | 19,8 | 29,2 | 19,6 | 15,3 | 23,9 | 726 |
| Ville | 20,7 | 17,0 | 24,4 | 31,6 | 27,3 | 35,8 | 25,4 | 21,4 | 29,3 | 22,3 | 18,6 | 26,0 | 1026 |
| Agglomération | 22,0 | 19,0 | 25,0 | 31,3 | 27,9 | 34,6 | 24,1 | 21,1 | 27,2 | 22,6 | 19,6 | 25,6 | 1643 |
| Zone rurale | 19,6 | 15,2 | 24,1 | 32,0 | 26,7 | 37,3 | 26,1 | 21,1 | 31,2 | 22,2 | 17,4 | 27,0 | 454 |
| Suisse alémanique | 21,5 | 18,8 | 24,1 | 32,7 | 29,6 | 35,8 | 24,5 | 21,7 | 27,4 | 21,3 | 18,6 | 24,0 | 1040 |
| Suisse romande | 19,0 | 16,2 | 21,7 | 30,1 | 27,1 | 33,1 | 25,5 | 22,6 | 28,4 | 25,4 | 22,5 | 28,3 | 1869 |
| Suisse italienne | 22,5 | 17,8 | 27,2 | 30,2 | 25,1 | 35,4 | 26,2 | 21,3 | 31,0 | 21,1 | 16,6 | 25,7 | 329 |
| ZH | 23,4 | 18,6 | 28,1 | 28,7 | 23,6 | 33,7 | 27,2 | 22,3 | 32,1 | 20,8 | 16,2 | 25,4 | 332 |
| CH sans ZH | 20,4 | 18,2 | 22,6 | 32,6 | 30,0 | 35,2 | 24,4 | 22,0 | 26,8 | 22,6 | 20,3 | 24,8 | 2906 |
| VD | 20,3 | 15,7 | 24,9 | 32,5 | 27,2 | 37,8 | 22,2 | 17,5 | 26,9 | 25,0 | 20,1 | 30,0 | 324 |
| CH sans VD | 21,0 | 18,8 | 23,1 | 31,9 | 29,4 | 34,4 | 25,1 | 22,8 | 27,4 | 22,0 | 19,8 | 24,2 | 2914 |
| VS | 20,0 | 15,3 | 24,7 | 32,4 | 26,9 | 37,9 | 26,3 | 21,1 | 31,5 | 21,3 | 16,5 | 26,2 | 321 |
| CH sans VS | 21,0 | 18,9 | 23,1 | 31,9 | 29,5 | 34,3 | 24,8 | 22,6 | 27,0 | 22,3 | 20,2 | 24,4 | 2917 |
| GE | 16,9 | 14,6 | 19,2 | 28,9 | 26,1 | 31,7 | 28,2 | 25,4 | 30,9 | 26,0 | 23,3 | 28,8 | 1160 |
| CH sans GE | 21,2 | 19,0 | 23,3 | 32,1 | 29,7 | 34,6 | 24,7 | 22,4 | 26,9 | 22,0 | 19,9 | 24,2 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.188 Nombre de maladies chroniques diagnostiquées (A1-A8), Suisse (2014, en %)

| | Aucune maladie chronique | | | 1 maladie chronique | | | 2 maladies chroniques | | | 3 maladies chroniques ou plus | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 21,7 | 18,8 | 24,6 | 33,2 | 29,6 | 36,7 | 25,1 | 21,8 | 28,5 | 20,0 | 17,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1084 |
| Homme | 18,7 | 14,5 | 22,9 | 30,6 | 25,4 | 35,8 | 27,6 | 22,2 | 32,9 | 23,1 | 18,3 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 493 |
| Femme | 24,0 | 20,0 | 28,0 | 35,1 | 30,3 | 39,8 | 23,3 | 19,0 | 27,6 | 17,6 | 13,9 | 21,4 | . | . | . | 591 |
| 65-69 ans | 21,2 | 16,2 | 26,2 | 35,9 | 29,5 | 42,2 | 24,5 | 18,3 | 30,6 | 18,4 | 13,0 | 23,9 | . | . | . | 349 |
| 70-74 ans | 26,8 | 20,5 | 33,2 | 32,3 | 25,9 | 38,8 | 23,8 | 17,5 | 30,1 | 17,0 | 12,1 | 21,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 300 |
| 75-79 ans | 20,3 | 14,1 | 26,4 | 29,4 | 21,5 | 37,2 | 27,2 | 20,2 | 34,3 | 23,1 | 16,3 | 29,9 | . | . | . | 209 |
| 80+ ans | 18,6 | 12,9 | 24,2 | 34,2 | 26,5 | 41,8 | 25,3 | 18,0 | 32,7 | 21,9 | 15,2 | 28,6 | . | . | . | 226 |
| Scolarité obligatoire | 21,6 | 14,8 | 28,4 | 30,8 | 22,9 | 38,7 | 29,1 | 21,3 | 36,9 | 18,5 | 11,8 | 25,1 | . | . | . | 216 |
| Secondaire II | 21,0 | 17,5 | 24,6 | 33,9 | 29,5 | 38,3 | 24,2 | 19,9 | 28,4 | 20,8 | 17,0 | 24,7 | . | . | . | 628 |
| Tertiaire | 24,2 | 17,7 | 30,6 | 34,2 | 25,6 | 42,8 | 23,9 | 17,1 | 30,6 | 17,5 | 11,7 | 23,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 17,3 | 11,3 | 23,4 | 43,8 | 34,8 | 52,8 | 24,9 | 17,2 | 32,6 | 14,0 | 8,4 | 19,5 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 31,2 | 23,6 | 38,9 | 33,0 | 24,6 | 41,4 | 19,9 | 12,6 | 27,1 | 15,9 | 10,0 | 21,9 | . | . | . | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 19,0 | 15,5 | 22,6 | 30,8 | 26,4 | 35,2 | 27,0 | 22,6 | 31,5 | 23,1 | 19,0 | 27,2 | . | . | . | 645 |
| Né en Suisse | 22,4 | 19,1 | 25,6 | 34,3 | 30,4 | 38,2 | 23,1 | 19,6 | 26,6 | 20,2 | 16,8 | 23,5 | . | . | . | 863 |
| Né à l'étranger | 18,9 | 12,8 | 25,1 | 27,3 | 19,3 | 35,2 | 34,5 | 25,3 | 43,7 | 19,2 | 12,6 | 25,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 220 |
| Ville | 20,8 | 14,9 | 26,7 | 32,5 | 25,5 | 39,6 | 27,0 | 20,2 | 33,9 | 19,6 | 14,1 | 25,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 293 |
| Agglomération | 21,2 | 17,2 | 25,2 | 33,3 | 28,4 | 38,2 | 24,3 | 19,7 | 28,9 | 21,2 | 16,8 | 25,7 | . | . | . | 540 |
| Zone rurale | 23,8 | 18,0 | 29,7 | 33,5 | 26,3 | 40,6 | 24,8 | 17,9 | 31,7 | 17,9 | 12,1 | 23,6 | . | . | . | 251 |
| Medical Home | 13,0 | 9,1 | 16,9 | 30,7 | 24,9 | 36,5 | 29,8 | 23,9 | 35,7 | 26,5 | 21,1 | 31,8 | 39,2 | 0,0 | 0,1 | 575 |
| Sans Medical Home | 28,2 | 20,2 | 36,3 | 35,7 | 26,3 | 45,1 | 22,3 | 13,6 | 31,0 | 13,8 | 8,6 | 18,9 | . | . | . | 222 |
| Malade | 1,1 | 0,0 | 2,7 | 20,5 | 14,6 | 26,5 | 34,1 | 27,2 | 41,0 | 44,3 | 37,2 | 51,4 | . | . | . | 305 |
| Non-malade | 29,7 | 25,9 | 33,4 | 38,0 | 33,7 | 42,2 | 21,6 | 17,8 | 25,4 | 10,7 | 7,9 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 13,5 | 7,1 | 19,8 | 34,7 | 26,1 | 43,3 | 51,4 | 42,4 | 60,4 | . | . | . | 195 |
| Malade sans Medical Home | . | . | . | 35,2 | 17,1 | 53,3 | 31,2 | 15,8 | 46,7 | 33,6 | 19,2 | 48,0 | . | . | . | 55 |
| Suisse alémanique | 20,1 | 16,4 | 23,7 | 33,4 | 28,9 | 37,9 | 26,2 | 21,9 | 30,6 | 20,3 | 16,5 | 24,2 | . | . | . | 551 |
| Suisse romande | 26,1 | 20,9 | 31,2 | 33,9 | 27,9 | 39,8 | 22,1 | 17,0 | 27,2 | 17,9 | 13,3 | 22,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 355 |
| Suisse italienne | 24,7 | 17,7 | 31,7 | 26,6 | 19,2 | 33,9 | 24,2 | 17,2 | 31,3 | 24,5 | 17,2 | 31,7 | . | . | . | 178 |
| VD | 29,8 | 21,9 | 37,6 | 28,4 | 21,4 | 35,4 | 18,9 | 12,7 | 25,1 | 22,7 | 15,5 | 29,9 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 178 |
| CH sans VD | 21,0 | 17,9 | 24,1 | 33,6 | 29,8 | 37,4 | 25,7 | 22,1 | 29,3 | 19,7 | 16,5 | 22,9 | . | . | . | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1420 : Au cours de l'année dernière, lorsque vous avez reçu des soins pour votre problème de santé, est-ce qu'un professionnel de la santé ... ?

- A parlé avec vous de vos priorités ou des principaux objectifs que vous souhaitez atteindre en soignant votre(vos) maladie(s). (A1)
- Vous a donné des instructions claires sur les symptômes à surveiller et vous a expliqué à quel moment il était nécessaire de consulter. (A3)

Base : Répondants ayant au moins une maladie chronique diagnostiquée.

Tableau 6.189 A eu une discussion sur les priorités ou principaux objectifs à atteindre, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| NZ | 66,5 | 60,8 | 72,3 | 22,6 | 17,4 | 27,9 | 10,5 | 7,0 | 13,9 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 347 |
| US | 66,3 | 62,9 | 69,8 | 26,8 | 23,6 | 30,1 | 4,9 | 3,4 | 6,5 | 1,9 | 0,8 | 3,0 | 1232 |
| DE | 65,5 | 61,4 | 69,7 | 30,4 | 26,4 | 34,4 | 3,7 | 1,9 | 5,4 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 616 |
| FR | 64,2 | 60,0 | 68,4 | 32,9 | 28,8 | 37,0 | 2,7 | 1,3 | 4,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 570 |
| AU | 60,8 | 56,6 | 65,1 | 28,7 | 24,7 | 32,8 | 9,5 | 7,2 | 11,7 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 1842 |
| CA | 57,2 | 55,1 | 59,3 | 33,4 | 31,4 | 35,4 | 7,7 | 6,6 | 8,8 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | 3867 |
| UK | 49,4 | 45,0 | 53,7 | 41,7 | 37,4 | 46,0 | 7,2 | 5,0 | 9,4 | 1,8 | 0,6 | 2,9 | 635 |
| NL | 49,0 | 44,5 | 53,5 | 47,4 | 43,0 | 51,9 | 3,4 | 1,7 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 557 |
| NO | 47,1 | 42,2 | 51,9 | 40,7 | 35,9 | 45,4 | 11,4 | 8,3 | 14,4 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 570 |
| CH | 47,0 | 44,2 | 49,7 | 36,1 | 33,4 | 38,7 | 16,6 | 14,5 | 18,6 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 2591 |
| SE | 26,1 | 24,7 | 27,6 | 54,5 | 52,9 | 56,1 | 15,0 | 13,9 | 16,1 | 4,4 | 3,7 | 5,0 | 5871 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.190 A eu une discussion sur les priorités ou principaux objectifs à atteindre, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 68,1 | 64,4 | 71,8 | 28,9 | 25,4 | 32,5 | 2,9 | 1,6 | 4,3 | 984 |
| UK | 67,0 | 61,5 | 72,5 | 32,6 | 27,1 | 38,1 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 385 |
| DE | 62,0 | 56,3 | 67,6 | 37,4 | 31,7 | 43,0 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 447 |
| AU | 57,7 | 51,5 | 64,0 | 38,6 | 32,5 | 44,7 | 3,7 | 1,3 | 6,1 | 1298 |
| CA | 57,5 | 54,9 | 60,0 | 40,8 | 38,2 | 43,3 | 1,8 | 1,0 | 2,5 | 2645 |
| FR | 50,2 | 45,6 | 54,7 | 49,8 | 45,3 | 54,4 | . | . | . | 687 |
| NZ | 49,7 | 41,1 | 58,2 | 46,3 | 37,7 | 54,9 | 4,0 | 1,4 | 6,6 | 250 |
| NL | 47,6 | 41,7 | 53,4 | 50,4 | 44,5 | 56,2 | 2,1 | 0,4 | 3,8 | 454 |
| CH | 47,4 | 43,1 | 51,7 | 51,3 | 47,0 | 55,6 | 1,2 | 0,4 | 2,1 | 813 |
| NO | 41,1 | 35,6 | 46,6 | 57,1 | 51,5 | 62,6 | 1,8 | 0,3 | 3,2 | 457 |
| SE | 30,2 | 28,2 | 32,3 | 65,7 | 63,5 | 67,8 | 4,1 | 3,1 | 5,0 | 3653 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.191 A eu une discussion sur les priorités ou principaux objectifs à atteindre, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 47,0 | 44,2 | 49,7 | 36,1 | 33,4 | 38,7 | 16,6 | 14,5 | 18,6 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 2591 |
| Homme | 48,8 | 44,7 | 52,8 | 32,8 | 28,9 | 36,6 | 18,1 | 14,9 | 21,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1220 |
| Femme | 45,5 | 41,8 | 49,3 | 38,6 | 34,9 | 42,3 | 15,3 | 12,6 | 18,0 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 1371 |
| 65-69 ans | 49,9 | 44,3 | 55,5 | 31,9 | 26,7 | 37,1 | 17,9 | 13,6 | 22,2 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 612 |
| 70-74 ans | 51,0 | 45,7 | 56,3 | 32,2 | 27,2 | 37,2 | 16,2 | 12,5 | 20,0 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 745 |
| 75-79 ans | 46,5 | 40,6 | 52,4 | 38,3 | 32,4 | 44,1 | 15,0 | 10,7 | 19,3 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 567 |
| 80+ ans | 41,0 | 35,7 | 46,3 | 41,6 | 36,3 | 46,9 | 16,9 | 12,7 | 21,0 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 667 |
| Scolarité obligatoire | 44,1 | 38,5 | 49,6 | 45,8 | 40,1 | 51,4 | 9,7 | 6,5 | 13,0 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 595 |
| Secondaire II | 47,3 | 43,7 | 50,9 | 33,1 | 29,7 | 36,5 | 19,1 | 16,3 | 22,0 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1403 |
| Tertiaire | 54,4 | 48,1 | 60,7 | 28,1 | 22,6 | 33,7 | 17,4 | 12,4 | 22,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 572 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 48,4 | 45,2 | 51,6 | 34,7 | 31,6 | 37,8 | 16,6 | 14,2 | 19,0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 1928 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 43,0 | 37,7 | 48,3 | 39,8 | 34,5 | 45,1 | 16,5 | 12,4 | 20,6 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 663 |
| Né en Suisse | 47,7 | 44,5 | 50,8 | 34,6 | 31,5 | 37,6 | 17,3 | 14,9 | 19,8 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 1760 |
| Né à l'étranger | 44,7 | 39,3 | 50,2 | 41,4 | 35,9 | 46,9 | 13,6 | 10,0 | 17,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 828 |
| Medical Home | 57,4 | 53,2 | 61,7 | 29,3 | 25,3 | 33,3 | 12,8 | 10,1 | 15,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1077 |
| Sans Medical Home | 34,1 | 28,3 | 39,8 | 48,6 | 42,3 | 54,9 | 16,8 | 12,0 | 21,7 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 581 |
| Malade | 52,4 | 47,8 | 57,1 | 38,6 | 34,1 | 43,2 | 8,4 | 5,8 | 11,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 942 |
| Non-malade | 43,1 | 39,6 | 46,6 | 34,8 | 31,4 | 38,2 | 21,7 | 18,7 | 24,7 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 1548 |
| Malade avec Medical Home | 62,7 | 56,3 | 69,2 | 29,3 | 23,2 | 35,5 | 7,6 | 4,2 | 11,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 460 |
| Malade sans Medical Home | 35,6 | 25,9 | 45,4 | 50,5 | 39,7 | 61,3 | 12,3 | 4,5 | 20,1 | 1,5 | 0,0 | 4,3 | 209 |
| Ville | 46,8 | 41,7 | 51,9 | 37,4 | 32,4 | 42,4 | 15,5 | 11,8 | 19,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 826 |
| Agglomération | 45,5 | 41,5 | 49,5 | 35,8 | 31,9 | 39,7 | 18,2 | 15,1 | 21,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1309 |
| Zone rurale | 50,1 | 43,7 | 56,5 | 35,0 | 28,9 | 41,1 | 14,8 | 10,3 | 19,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 361 |
| Suisse alémanique | 45,3 | 41,6 | 49,0 | 37,1 | 33,5 | 40,7 | 17,4 | 14,6 | 20,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 805 |
| Suisse romande | 49,9 | 46,2 | 53,5 | 33,8 | 30,3 | 37,2 | 15,3 | 12,8 | 17,7 | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 1529 |
| Suisse italienne | 54,8 | 48,5 | 61,1 | 33,5 | 27,5 | 39,4 | 11,8 | 7,8 | 15,7 | . | . | . | 257 |
| ZH | 48,3 | 41,9 | 54,7 | 35,5 | 29,4 | 41,7 | 15,3 | 10,8 | 19,9 | 0,8 | 0,0 | 1,9 | 252 |
| CH sans ZH | 46,7 | 43,6 | 49,8 | 36,2 | 33,2 | 39,1 | 16,8 | 14,5 | 19,1 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2339 |
| VD | 48,2 | 41,8 | 54,5 | 35,9 | 29,8 | 41,9 | 14,9 | 10,4 | 19,4 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 259 |
| CH sans VD | 46,9 | 43,9 | 49,8 | 36,1 | 33,2 | 39,0 | 16,7 | 14,5 | 19,0 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2332 |
| VS | 42,7 | 36,1 | 49,2 | 37,2 | 30,8 | 43,6 | 19,1 | 14,0 | 24,1 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 255 |
| CH sans VS | 47,2 | 44,3 | 50,0 | 36,0 | 33,2 | 38,8 | 16,4 | 14,3 | 18,6 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 2336 |
| GE | 46,1 | 42,7 | 49,5 | 33,2 | 30,0 | 36,3 | 19,9 | 17,1 | 22,7 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 957 |
| CH sans GE | 47,0 | 44,1 | 50,0 | 36,2 | 33,4 | 39,1 | 16,4 | 14,2 | 18,6 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 1634 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.192 A eu une discussion sur les priorités ou principaux objectifs à atteindre, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 47,4 | 43,1 | 51,7 | 51,3 | 47,0 | 55,6 | 1,2 | 0,4 | 2,1 | 813 |
| Homme | 52,9 | 46,5 | 59,4 | 46,0 | 39,6 | 52,5 | 1,1 | 0,1 | 2,0 | 379 |
| Femme | 43,0 | 37,4 | 48,7 | 55,6 | 49,9 | 61,3 | 1,4 | 0,1 | 2,7 | 434 |
| 65-69 ans | 53,2 | 45,3 | 61,1 | 46,2 | 38,4 | 54,1 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 258 |
| 70-74 ans | 49,2 | 41,0 | 57,3 | 49,6 | 41,4 | 57,7 | 1,3 | 0,0 | 2,9 | 221 |
| 75-79 ans | 52,5 | 43,2 | 61,9 | 45,9 | 36,5 | 55,2 | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 161 |
| 80+ ans | 34,8 | 26,4 | 43,3 | 63,5 | 55,0 | 72,1 | 1,6 | 0,0 | 3,5 | 173 |
| Scolarité obligatoire | 36,4 | 27,2 | 45,5 | 62,5 | 53,2 | 71,7 | 1,2 | 0,0 | 3,5 | 164 |
| Secondaire II | 48,3 | 42,9 | 53,7 | 50,5 | 45,1 | 55,9 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 479 |
| Tertiaire | 62,3 | 53,0 | 71,5 | 36,0 | 26,9 | 45,2 | 1,7 | 0,0 | 3,6 | 161 |
| Revenu sup. à la moyenne | 49,7 | 39,7 | 59,7 | 50,1 | 40,1 | 60,1 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 140 |
| Revenu dans la moyenne | 43,1 | 32,5 | 53,7 | 53,0 | 42,2 | 63,8 | 3,9 | 0,2 | 7,6 | 138 |
| Revenu inf. à la moyenne | 48,1 | 42,7 | 53,5 | 51,0 | 45,6 | 56,5 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 502 |
| Né en Suisse | 47,1 | 42,4 | 51,8 | 52,0 | 47,3 | 56,8 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 641 |
| Né à l'étranger | 48,2 | 37,8 | 58,7 | 48,8 | 38,4 | 59,3 | 2,9 | 0,0 | 6,1 | 171 |
| Ville | 46,1 | 37,7 | 54,5 | 53,2 | 44,8 | 61,6 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 225 |
| Agglomération | 51,9 | 45,8 | 58,0 | 46,8 | 40,7 | 52,9 | 1,3 | 0,0 | 2,6 | 404 |
| Zone rurale | 39,9 | 31,4 | 48,5 | 58,3 | 49,7 | 66,9 | 1,8 | 0,0 | 3,7 | 184 |
| Medical Home | 60,2 | 53,4 | 67,1 | 38,0 | 31,1 | 44,8 | 1,8 | 0,4 | 3,2 | 337 |
| Sans Medical Home | 39,1 | 27,5 | 50,6 | 60,9 | 49,4 | 72,5 | . | . | . | 128 |
| Malade | 47,9 | 40,7 | 55,1 | 50,8 | 43,6 | 58,0 | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 303 |
| Non-malade | 47,4 | 42,0 | 52,8 | 51,4 | 46,0 | 56,8 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 507 |
| Malade avec Medical Home | 62,7 | 52,2 | 73,3 | 35,4 | 24,9 | 45,9 | 1,9 | 0,0 | 4,6 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 21,0 | 9,9 | 32,2 | 79,0 | 67,8 | 90,1 | . | . | . | 52 |
| Suisse alémanique | 47,8 | 42,4 | 53,3 | 51,2 | 45,7 | 56,6 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 427 |
| Suisse romande | 40,7 | 33,7 | 47,7 | 57,5 | 50,5 | 64,6 | 1,8 | 0,2 | 3,3 | 255 |
| Suisse italienne | 71,3 | 62,8 | 79,7 | 26,5 | 18,2 | 34,8 | 2,2 | 0,0 | 4,4 | 131 |
| VD | 45,2 | 35,7 | 54,8 | 51,7 | 42,1 | 61,3 | 3,1 | 0,0 | 6,1 | 126 |
| CH sans VD | 47,6 | 43,0 | 52,2 | 51,3 | 46,7 | 55,9 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 687 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.193 A reçu des instructions claires sur les symptômes à surveiller, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| FR | 77,0 | 73,3 | 80,7 | 19,8 | 16,3 | 23,3 | 2,7 | 1,3 | 4,1 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 570 |
| AU | 68,0 | 64,2 | 71,9 | 21,0 | 17,7 | 24,2 | 9,5 | 7,2 | 11,7 | 1,6 | 0,5 | 2,6 | 1842 |
| US | 61,9 | 58,4 | 65,5 | 31,4 | 28,0 | 34,8 | 4,8 | 3,3 | 6,3 | 1,9 | 0,7 | 3,0 | 1232 |
| DE | 59,8 | 55,5 | 64,1 | 36,1 | 31,9 | 40,3 | 3,7 | 1,9 | 5,4 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 616 |
| NZ | 59,8 | 53,8 | 65,9 | 29,2 | 23,4 | 34,9 | 10,5 | 7,0 | 13,9 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 347 |
| CA | 54,4 | 52,3 | 56,6 | 37,2 | 35,1 | 39,3 | 7,2 | 6,2 | 8,3 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 3867 |
| CH | 46,7 | 44,0 | 49,4 | 36,4 | 33,7 | 39,1 | 16,6 | 14,5 | 18,6 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2591 |
| UK | 43,8 | 39,4 | 48,1 | 46,4 | 42,0 | 50,7 | 7,2 | 5,0 | 9,4 | 2,6 | 1,3 | 4,0 | 635 |
| NL | 43,3 | 38,8 | 47,7 | 52,7 | 48,2 | 57,2 | 3,4 | 1,7 | 5,0 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 557 |
| NO | 36,4 | 31,7 | 41,1 | 51,1 | 46,3 | 56,0 | 11,5 | 8,4 | 14,6 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 570 |
| SE | 36,3 | 34,7 | 37,8 | 45,4 | 43,8 | 47,0 | 15,3 | 14,1 | 16,4 | 3,1 | 2,6 | 3,7 | 5871 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.194 A reçu des instructions claires sur les symptômes à surveiller, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n | |
| US | 68,4 | 64,8 | 72,0 | 30,4 | 26,9 | 34,0 | 1,2 | 0,5 | 1,9 | 984 | |
| UK | 68,1 | 62,6 | 73,6 | 30,7 | 25,2 | 36,2 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 385 | |
| FR | 66,2 | 61,9 | 70,5 | 33,2 | 29,0 | 37,5 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 687 | |
| AU | 59,9 | 53,6 | 66,1 | 37,7 | 31,5 | 44,0 | 2,4 | 1,1 | 3,6 | 1298 | |
| CA | 58,8 | 56,2 | 61,3 | 40,2 | 37,6 | 42,8 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 2645 | |
| DE | 57,8 | 52,0 | 63,5 | 41,3 | 35,5 | 47,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 447 | |
| NZ | 52,7 | 44,1 | 61,3 | 46,9 | 38,3 | 55,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 250 | |
| NL | 47,7 | 41,9 | 53,6 | 50,7 | 44,8 | 56,6 | 1,6 | 0,1 | 3,1 | 454 | |
| CH | 44,5 | 40,2 | 48,7 | 54,4 | 50,1 | 58,6 | 1,2 | 0,3 | 2,0 | 813 | |
| SE | 43,3 | 41,0 | 45,5 | 54,1 | 51,8 | 56,3 | 2,7 | 1,9 | 3,4 | 3653 | |
| NO | 38,6 | 33,1 | 44,1 | 60,5 | 55,0 | 66,0 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 457 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.195 A reçu des instructions claires sur les symptômes à surveiller, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 46,7 | 44,0 | 49,4 | 36,4 | 33,7 | 39,1 | 16,6 | 14,5 | 18,6 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2591 |
| Homme | 49,5 | 45,4 | 53,5 | 32,2 | 28,4 | 36,0 | 18,1 | 14,9 | 21,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1220 |
| Femme | 44,5 | 40,8 | 48,3 | 39,8 | 36,0 | 43,5 | 15,3 | 12,6 | 18,0 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 1371 |
| 65-69 ans | 52,6 | 47,0 | 58,1 | 29,6 | 24,4 | 34,7 | 17,9 | 13,6 | 22,2 | . | . | . | 612 |
| 70-74 ans | 48,9 | 43,6 | 54,1 | 34,0 | 28,9 | 39,1 | 16,2 | 12,5 | 20,0 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 745 |
| 75-79 ans | 46,3 | 40,4 | 52,1 | 38,5 | 32,6 | 44,3 | 15,0 | 10,7 | 19,3 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 567 |
| 80+ ans | 39,6 | 34,4 | 44,9 | 43,4 | 38 | 48,7 | 16,9 | 12,7 | 21,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 667 |
| Scolarité obligatoire | 46,5 | 40,9 | 52,0 | 43,3 | 37,7 | 49,0 | 9,7 | 6,5 | 13,0 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 595 |
| Secondaire II | 46,8 | 43,2 | 50,4 | 33,8 | 30,3 | 37,2 | 19,1 | 16,3 | 22,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1403 |
| Tertiaire | 47,6 | 41,3 | 53,9 | 35,0 | 28,9 | 41,1 | 17,4 | 12,4 | 22,4 | . | . | . | 572 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 48,1 | 44,9 | 51,3 | 35,1 | 32,0 | 38,2 | 16,6 | 14,2 | 19,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1928 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 42,7 | 37,4 | 48,0 | 40,1 | 34,7 | 45,4 | 16,5 | 12,4 | 20,6 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 663 |
| Né en Suisse | 46,7 | 43,5 | 49,8 | 35,7 | 32,6 | 38,8 | 17,3 | 14,9 | 19,8 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 1760 |
| Né à l'étranger | 46,6 | 41,2 | 52,1 | 39,4 | 33,9 | 44,9 | 13,6 | 10,0 | 17,2 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 828 |
| Medical Home | 57,3 | 53,1 | 61,6 | 29,5 | 25,5 | 33,5 | 12,8 | 10,1 | 15,5 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1077 |
| Sans Medical Home | 36,9 | 31,0 | 42,7 | 46,3 | 40,0 | 52,6 | 16,8 | 12,0 | 21,7 | . | . | . | 581 |
| Malade | 53,6 | 49,0 | 58,2 | 37,8 | 33,2 | 42,3 | 8,4 | 5,8 | 11,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 942 |
| Non-malade | 41,7 | 38,2 | 45,2 | 36,2 | 32,8 | 39,7 | 21,7 | 18,7 | 24,7 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 1548 |
| Malade avec Medical Home | 63,0 | 56,6 | 69,5 | 29,1 | 22,9 | 35,3 | 7,6 | 4,2 | 11,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 460 |
| Malade sans Medical Home | 41,1 | 30,8 | 51,4 | 46,6 | 35,7 | 57,4 | 12,3 | 4,5 | 20,1 | . | . | . | 209 |
| Ville | 45,0 | 40,0 | 50,1 | 39,0 | 34,0 | 44,1 | 15,5 | 11,8 | 19,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 826 |
| Agglomération | 47,0 | 43,0 | 51,0 | 34,4 | 30,5 | 38,3 | 18,2 | 15,1 | 21,4 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1309 |
| Zone rurale | 47,9 | 41,6 | 54,3 | 37,1 | 30,9 | 43,3 | 14,8 | 10,3 | 19,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 361 |
| Suisse alémanique | 42,0 | 38,3 | 45,7 | 40,4 | 36,7 | 44,1 | 17,4 | 14,6 | 20,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 805 |
| Suisse romande | 57,5 | 54,0 | 61,1 | 26,6 | 23,4 | 29,8 | 15,3 | 12,8 | 17,7 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 1529 |
| Suisse italienne | 57,4 | 51,1 | 63,6 | 30,1 | 24,3 | 35,9 | 11,8 | 7,8 | 15,7 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 257 |
| ZH | 41,9 | 35,6 | 48,2 | 42,0 | 35,8 | 48,3 | 15,3 | 10,8 | 19,9 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 252 |
| CH sans ZH | 47,7 | 44,6 | 50,7 | 35,3 | 32,4 | 38,3 | 16,8 | 14,5 | 19,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 2339 |
| VD | 56,9 | 50,6 | 63,2 | 27,5 | 21,8 | 33,2 | 14,9 | 10,4 | 19,4 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 259 |
| CH sans VD | 45,7 | 42,8 | 48,7 | 37,3 | 34,4 | 40,2 | 16,7 | 14,5 | 19,0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2332 |
| VS | 49,1 | 42,5 | 55,7 | 30,4 | 24,4 | 36,5 | 19,1 | 14,0 | 24,1 | 1,4 | 0,0 | 2,7 | 255 |
| CH sans VS | 46,6 | 43,7 | 49,4 | 36,7 | 33,9 | 39,5 | 16,4 | 14,3 | 18,6 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 2336 |
| GE | 52,3 | 49,0 | 55,7 | 27,4 | 24,5 | 30,4 | 19,9 | 17,1 | 22,7 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 957 |
| CH sans GE | 46,3 | 43,4 | 49,3 | 37,0 | 34,1 | 39,8 | 16,4 | 14,2 | 18,6 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 1634 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.196 A reçu des instructions claires sur les symptômes à surveiller, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 44,5 | 40,2 | 48,7 | 54,4 | 50,1 | 58,6 | 1,2 | 0,3 | 2,0 | 813 |
| Homme | 48,5 | 42,0 | 54,9 | 49,7 | 43,3 | 56,2 | 1,8 | 0,3 | 3,3 | 379 |
| Femme | 41,3 | 35,7 | 46,9 | 58,1 | 52,5 | 63,7 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 434 |
| 65-69 ans | 46,9 | 39,1 | 54,7 | 52,3 | 44,5 | 60,1 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 258 |
| 70-74 ans | 50,9 | 42,7 | 59,0 | 48,5 | 40,3 | 56,6 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 221 |
| 75-79 ans | 42,8 | 33,8 | 51,8 | 55,0 | 45,8 | 64,1 | 2,2 | 0,0 | 5,0 | 161 |
| 80+ ans | 37,5 | 28,9 | 46,2 | 61,4 | 52,7 | 70,1 | 1,0 | 0,0 | 2,6 | 173 |
| Scolarité obligatoire | 38,1 | 28,9 | 47,2 | 61,1 | 51,9 | 70,3 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 164 |
| Secondaire II | 44,9 | 39,6 | 50,2 | 53,9 | 48,6 | 59,3 | 1,2 | 0,1 | 2,3 | 479 |
| Tertiaire | 56,6 | 46,9 | 66,3 | 41,7 | 32,1 | 51,3 | 1,8 | 0,0 | 3,7 | 161 |
| Revenu sup. à la moyenne | 39,9 | 30,3 | 49,5 | 59,6 | 50,0 | 69,2 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 140 |
| Revenu dans la moyenne | 47,9 | 37,1 | 58,7 | 50,4 | 39,5 | 61,2 | 1,7 | 0,0 | 4,1 | 138 |
| Revenu inf. à la moyenne | 45,3 | 39,9 | 50,7 | 53,9 | 48,4 | 59,3 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 502 |
| Né en Suisse | 44,1 | 39,4 | 48,7 | 54,9 | 50,3 | 59,6 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 641 |
| Né à l'étranger | 46,7 | 36,3 | 57,1 | 51,5 | 41,0 | 61,9 | 1,9 | 0,0 | 5,0 | 171 |
| Ville | 42,7 | 34,7 | 50,8 | 56,5 | 48,4 | 64,6 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 225 |
| Agglomération | 48,2 | 42,1 | 54,3 | 50,6 | 44,5 | 56,6 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 404 |
| Zone rurale | 38,9 | 30,3 | 47,6 | 59,6 | 50,9 | 68,2 | 1,5 | 0,0 | 3,2 | 184 |
| Medical Home | 51,9 | 45,1 | 58,7 | 46,9 | 40,0 | 53,7 | 1,2 | 0,0 | 2,5 | 337 |
| Sans Medical Home | 26,9 | 18,1 | 35,6 | 72,3 | 63,5 | 81,2 | 0,8 | 0,0 | 1,9 | 128 |
| Malade | 54,1 | 46,8 | 61,4 | 43,3 | 36,1 | 50,6 | 2,6 | 0,4 | 4,8 | 303 |
| Non-malade | 39,7 | 34,5 | 44,9 | 59,9 | 54,7 | 65,1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 507 |
| Malade avec Medical Home | 62,7 | 52,0 | 73,4 | 35,5 | 24,8 | 46,1 | 1,9 | 0,0 | 4,5 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 36,5 | 21,1 | 51,9 | 61,1 | 45,3 | 76,9 | 2,4 | 0,0 | 5,7 | 52 |
| Suisse alémanique | 42,0 | 36,7 | 47,4 | 57,0 | 51,7 | 62,4 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 427 |
| Suisse romande | 46,7 | 39,4 | 53,9 | 51,3 | 44,0 | 58,6 | 2,0 | 0,6 | 3,5 | 255 |
| Suisse italienne | 70,6 | 62,0 | 79,2 | 28,9 | 20,4 | 37,5 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 131 |
| VD | 50,9 | 41,3 | 60,6 | 45,3 | 35,6 | 55,1 | 3,7 | 0,3 | 7,1 | 126 |
| CH sans VD | 44,0 | 39,5 | 48,5 | 55,1 | 50,5 | 59,6 | 1,0 | 0,1 | 1,8 | 687 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1425 : Entre les visites chez le médecin, y a-t-il un professionnel de la santé ... ?

- Qui vous contacte pour savoir comment vous vous portez. (A1)
- Que vous pouvez facilement contacter pour poser une question ou demander un conseil sur votre/(vos) maladie(s). (A2)

Base : Répondants ayant au moins une maladie chronique diagnostiquée.

Tableau 6.197 Professionnel de la santé de contact, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 29,1 | 25,8 | 32,4 | 65,1 | 61,6 | 68,6 | 5,4 | 3,8 | 7,0 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1232 |
| NZ | 24,4 | 19,2 | 29,6 | 64,5 | 58,8 | 70,3 | 10,5 | 7,0 | 13,9 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 347 |
| AU | 20,5 | 17,0 | 24,1 | 68,1 | 64,2 | 72,1 | 9,7 | 7,4 | 11,9 | 1,7 | 0,9 | 2,4 | 1842 |
| UK | 20,2 | 16,5 | 23,8 | 71,9 | 67,9 | 75,9 | 7,5 | 5,2 | 9,7 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 635 |
| FR | 18,2 | 14,7 | 21,7 | 78,6 | 74,9 | 82,3 | 3,2 | 1,7 | 4,7 | . | . | . | 570 |
| NL | 15,1 | 11,9 | 18,3 | 80,9 | 77,4 | 84,4 | 3,4 | 1,7 | 5,0 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 557 |
| DE | 14,1 | 11,0 | 17,1 | 81,2 | 77,7 | 84,6 | 4,0 | 2,1 | 5,8 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 616 |
| SE | 13,9 | 12,8 | 15,0 | 69,7 | 68,2 | 71,2 | 15,8 | 14,7 | 16,9 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 5871 |
| CA | 12,8 | 11,4 | 14,3 | 78,8 | 77,1 | 80,6 | 8,2 | 7,0 | 9,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 3867 |
| NO | 9,6 | 6,6 | 12,6 | 77,8 | 73,8 | 81,9 | 11,7 | 8,6 | 14,8 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 570 |
| CH | 8,3 | 6,9 | 9,8 | 74,1 | 71,6 | 76,5 | 17,5 | 15,4 | 19,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2591 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.198 Professionnel de la santé de contact, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon | |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | IC limite sup. | n |
| UK | 46,3 | 40,4 | 52,2 | 52,7 | 46,8 | 58,7 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 385 |
| US | 30,1 | 26,4 | 33,9 | 69,3 | 65,6 | 73,0 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 984 |
| NZ | 27,9 | 20,4 | 35,3 | 72,0 | 64,5 | 79,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 250 |
| AU | 24,0 | 18,5 | 29,4 | 74,6 | 69,1 | 80,1 | 1,5 | 0,5 | 2,4 | 2,4 | 1298 |
| NL | 23,5 | 18,3 | 28,7 | 75,6 | 70,3 | 80,8 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 1,7 | 454 |
| FR | 22,8 | 19,1 | 26,6 | 77,0 | 73,3 | 80,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 687 |
| SE | 17,3 | 15,6 | 19,0 | 82,0 | 80,3 | 83,7 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 3653 |
| CA | 15,7 | 13,8 | 17,7 | 83,9 | 82,0 | 85,9 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 2645 |
| NO | 15,0 | 10,7 | 19,4 | 84,7 | 80,4 | 89,1 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 457 |
| DE | 13,4 | 9,7 | 17,2 | 86,0 | 82,1 | 89,8 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 447 |
| CH | 9,0 | 6,6 | 11,4 | 90,8 | 88,4 | 93,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 813 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.199 Professionnel de la santé de contact, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 8,3 | 6,9 | 9,8 | 74,1 | 71,6 | 76,5 | 17,5 | 15,4 | 19,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2591 |
| Homme | 6,3 | 4,5 | 8,2 | 74,6 | 71,0 | 78,2 | 19,0 | 15,7 | 22,3 | . | . | . | 1220 |
| Femme | 9,9 | 7,7 | 12,1 | 73,6 | 70,3 | 76,9 | 16,3 | 13,6 | 19,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1371 |
| 65-69 ans | 5,1 | 2,7 | 7,4 | 76,4 | 71,6 | 81,1 | 18,6 | 14,2 | 23,0 | . | . | . | 612 |
| 70-74 ans | 6,8 | 4,2 | 9,4 | 76,1 | 71,7 | 80,4 | 16,8 | 13,1 | 20,6 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 745 |
| 75-79 ans | 7,5 | 4,6 | 10,4 | 76,8 | 71,9 | 81,8 | 15,6 | 11,2 | 20,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 567 |
| 80+ ans | 13,4 | 9,8 | 16,9 | 67,8 | 62,7 | 72,9 | 18,7 | 14,4 | 23,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 667 |
| Scolarité obligatoire | 10,8 | 7,5 | 14,1 | 78,9 | 74,4 | 83,3 | 10,3 | 7,0 | 13,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 595 |
| Secondaire II | 7,0 | 5,2 | 8,8 | 72,7 | 69,5 | 75,9 | 20,2 | 17,3 | 23,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1403 |
| Tertiaire | 10,0 | 6,0 | 14,0 | 71,1 | 65,2 | 77,1 | 18,9 | 13,7 | 24,1 | . | . | . | 572 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 7,1 | 5,5 | 8,6 | 75,2 | 72,4 | 78,0 | 17,7 | 15,2 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1928 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 11,8 | 8,4 | 15,2 | 70,9 | 66,0 | 75,8 | 17,0 | 12,8 | 21,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 663 |
| Né en Suisse | 7,5 | 5,9 | 9,1 | 74,4 | 71,6 | 77,2 | 18,0 | 15,5 | 20,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1760 |
| Né à l'étranger | 11,5 | 7,9 | 15,1 | 72,9 | 68,0 | 77,8 | 15,6 | 11,6 | 19,6 | . | . | . | 828 |
| Medical Home | 9,4 | 7,0 | 11,9 | 76,5 | 73,0 | 80,1 | 14,1 | 11,2 | 16,9 | . | . | . | 1077 |
| Sans Medical Home | 8,0 | 4,9 | 11,2 | 74,6 | 69,2 | 80,1 | 17,3 | 12,4 | 22,2 | . | . | . | 581 |
| Malade | 11,9 | 9,0 | 14,9 | 79,1 | 75,4 | 82,8 | 9,0 | 6,3 | 11,6 | . | . | . | 942 |
| Non-malade | 5,8 | 4,2 | 7,4 | 71,1 | 67,8 | 74,3 | 23,0 | 19,9 | 26,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1548 |
| Malade avec Medical Home | 15,0 | 10,3 | 19,7 | 77,1 | 71,6 | 82,5 | 7,9 | 4,5 | 11,3 | . | . | . | 460 |
| Malade sans Medical Home | 7,9 | 3,6 | 12,2 | 79,4 | 70,8 | 87,9 | 12,8 | 5,0 | 20,6 | . | . | . | 209 |
| Ville | 5,8 | 3,7 | 7,8 | 77,4 | 73,2 | 81,6 | 16,5 | 12,7 | 20,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 826 |
| Agglomération | 8,1 | 5,9 | 10,2 | 73,3 | 69,7 | 76,9 | 18,6 | 15,4 | 21,8 | . | . | . | 1309 |
| Zone rurale | 10,6 | 6,8 | 14,5 | 72,7 | 67,0 | 78,4 | 16,7 | 11,9 | 21,5 | . | . | . | 361 |
| Suisse alémanique | 7,2 | 5,3 | 9,1 | 74,1 | 70,8 | 77,3 | 18,6 | 15,7 | 21,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 805 |
| Suisse romande | 10,5 | 8,0 | 13,0 | 74,0 | 70,8 | 77,2 | 15,5 | 13,1 | 17,9 | . | . | . | 1529 |
| Suisse italienne | 12,9 | 8,8 | 17,0 | 74,2 | 68,7 | 79,6 | 12,6 | 8,5 | 16,6 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 257 |
| ZH | 9,3 | 5,6 | 13,0 | 73,9 | 68,4 | 79,5 | 16,4 | 11,8 | 21,1 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 252 |
| CH sans ZH | 8,1 | 6,5 | 9,7 | 74,1 | 71,4 | 76,8 | 17,7 | 15,4 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2339 |
| VD | 11,4 | 7,3 | 15,4 | 73,6 | 68,0 | 79,2 | 15,1 | 10,6 | 19,6 | . | . | . | 259 |
| CH sans VD | 8,0 | 6,5 | 9,6 | 74,1 | 71,5 | 76,7 | 17,8 | 15,5 | 20,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2332 |
| VS | 8,5 | 5,0 | 11,9 | 71,8 | 66,0 | 77,6 | 19,4 | 14,3 | 24,5 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 255 |
| CH sans VS | 8,3 | 6,8 | 9,8 | 74,2 | 71,6 | 76,7 | 17,4 | 15,2 | 19,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2336 |
| GE | 7,2 | 5,4 | 9,0 | 72,8 | 69,7 | 75,9 | 20,0 | 17,2 | 22,8 | . | . | . | 957 |
| CH sans GE | 8,4 | 6,8 | 9,9 | 74,1 | 71,6 | 76,7 | 17,4 | 15,1 | 19,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1634 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.200 Professionnel de la santé de contact, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 9,0 | 6,6 | 11,4 | 90,8 | 88,4 | 93,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 813 |
| Homme | 9,8 | 6,2 | 13,3 | 90,1 | 86,6 | 93,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 379 |
| Femme | 8,3 | 5,0 | 11,6 | 91,4 | 88,1 | 94,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 434 |
| 65-69 ans | 7,2 | 3,6 | 10,8 | 92,6 | 89,0 | 96,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 258 |
| 70-74 ans | 6,7 | 2,8 | 10,6 | 92,9 | 88,9 | 96,8 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 221 |
| 75-79 ans | 8,8 | 4,1 | 13,5 | 91,0 | 86,3 | 95,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 161 |
| 80+ ans | 13,1 | 6,7 | 19,6 | 86,7 | 80,2 | 93,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 173 |
| Scolarité obligatoire | 8,2 | 2,1 | 14,3 | 91,3 | 85,1 | 97,4 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 164 |
| Secondaire II | 8,1 | 5,4 | 10,8 | 91,8 | 89,2 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 479 |
| Tertiaire | 14,0 | 6,7 | 21,4 | 85,8 | 78,4 | 93,1 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 161 |
| Revenu sup. à la moyenne | 8,7 | 2,5 | 14,9 | 91,0 | 84,8 | 97,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 140 |
| Revenu dans la moyenne | 10,7 | 4,4 | 17,0 | 89,1 | 82,8 | 95,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 138 |
| Revenu inf. à la moyenne | 8,5 | 5,6 | 11,5 | 91,2 | 88,2 | 94,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 502 |
| Né en Suisse | 9,4 | 6,6 | 12,2 | 90,5 | 87,7 | 93,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 641 |
| Né à l'étranger | 6,1 | 2,1 | 10,1 | 93,2 | 89,2 | 97,3 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 171 |
| Ville | 6,5 | 3,0 | 10,0 | 93,3 | 89,8 | 96,9 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 225 |
| Agglomération | 6,8 | 4,2 | 9,5 | 93,0 | 90,3 | 95,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 404 |
| Zone rurale | 15,9 | 8,8 | 23,0 | 83,7 | 76,6 | 90,9 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 184 |
| Medical Home | 12,8 | 7,9 | 17,7 | 87,0 | 82,1 | 92,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 337 |
| Sans Medical Home | 7,4 | 2,3 | 12,4 | 92,4 | 87,3 | 97,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 128 |
| Malade | 11,8 | 6,9 | 16,7 | 87,8 | 82,8 | 92,7 | 0,4 | 0,0 | 1 | 303 |
| Non-malade | 7,5 | 4,9 | 10,1 | 92,4 | 89,8 | 95,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 507 |
| Malade avec Medical Home | 16,7 | 7,1 | 26,2 | 82,9 | 73,3 | 92,4 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 11,7 | 2,9 | 20,6 | 88,3 | 79,4 | 97,1 | . | . | . | 52 |
| Suisse alémanique | 9,1 | 6,0 | 12,2 | 90,9 | 87,8 | 94,0 | . | . | . | 427 |
| Suisse romande | 8,6 | 4,8 | 12,4 | 91,0 | 87,2 | 94,8 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 255 |
| Suisse italienne | 8,3 | 3,7 | 12,8 | 89,2 | 84,0 | 94,3 | 2,6 | 0,0 | 5,1 | 131 |
| VD | 9,1 | 4,0 | 14,2 | 90,9 | 85,8 | 96,0 | . | . | . | 126 |
| CH sans VD | 8,9 | 6,4 | 11,5 | 90,8 | 88,2 | 93,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 687 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.201 Professionnel de la santé facilement joignable entre les visites du médecin, comparaison internationale (2017, en%)

| | Oui | | | Non | | | N'a jamais dû contacter entre les visites | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 73,3 | 70,0 | 76,5 | 18,2 | 15,3 | 21,1 | 1,8 | 0,9 | 2,7 | 5,5 | 3,8 | 7,1 | 1,3 | 0,6 | 2,0 | 1232 |
| NL | 73,0 | 69,0 | 76,9 | 17,9 | 14,5 | 21,3 | 3,2 | 1,8 | 4,7 | 3,4 | 1,7 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 557 |
| NZ | 67,9 | 62,1 | 73,6 | 18,7 | 13,7 | 23,6 | 2,2 | 0,5 | 4,0 | 10,5 | 7,0 | 13,9 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 347 |
| AU | 59,8 | 55,5 | 64,2 | 25,8 | 21,6 | 30,0 | 2,9 | 2,0 | 3,8 | 9,5 | 7,2 | 11,7 | 2,0 | 1,2 | 2,8 | 1842 |
| UK | 57,7 | 53,4 | 62,0 | 28,8 | 24,8 | 32,7 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 7,2 | 5,0 | 9,4 | 4,8 | 2,8 | 6,8 | 635 |
| SE | 56,9 | 55,3 | 58,5 | 17,2 | 15,9 | 18,4 | 8,0 | 7,1 | 8,9 | 15,8 | 14,7 | 17,0 | 2,1 | 1,7 | 2,6 | 5871 |
| FR | 56,6 | 52,3 | 61,0 | 37,1 | 32,8 | 41,3 | 3,4 | 1,9 | 4,9 | 2,7 | 1,3 | 4,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 570 |
| CA | 56,5 | 54,3 | 58,6 | 30,9 | 28,9 | 32,9 | 3,0 | 2,3 | 3,7 | 8,0 | 6,9 | 9,2 | 1,6 | 1,1 | 2,1 | 3867 |
| DE | 49,3 | 44,9 | 53,7 | 42,6 | 38,3 | 47,0 | 3,6 | 1,9 | 5,4 | 3,7 | 1,9 | 5,4 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 616 |
| NO | 45,9 | 41,1 | 50,8 | 40,1 | 35,3 | 44,9 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 11,7 | 8,6 | 14,8 | 1,8 | 0,5 | 3,1 | 570 |
| CH | 33,8 | 31,2 | 36,4 | 25,5 | 23,1 | 27,9 | 23,5 | 21,1 | 25,8 | 16,9 | 14,8 | 19,0 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2591 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.202 Professionnel de la santé facilement joignable entre les visites du médecin, comparaison internationale (2014, en%)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 82,9 | 79,9 | 85,9 | 16,3 | 13,2 | 19,3 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 984 |
| NL | 78,4 | 73,7 | 83,0 | 15,5 | 11,3 | 19,8 | 6,1 | 3,8 | 8,4 | 454 |
| SE | 71,6 | 69,6 | 73,7 | 24,3 | 22,4 | 26,3 | 4,0 | 3,2 | 4,9 | 3653 |
| NZ | 70,3 | 61,8 | 78,9 | 24,0 | 16,2 | 31,9 | 5,6 | 0,3 | 11,0 | 250 |
| UK | 69,8 | 64,1 | 75,4 | 28,5 | 22,9 | 34,1 | 1,8 | 0,4 | 3,1 | 385 |
| CA | 64,5 | 62,1 | 67,0 | 31,7 | 29,3 | 34,1 | 3,8 | 2,7 | 4,8 | 2645 |
| AU | 63,2 | 56,9 | 69,5 | 33,6 | 27,3 | 39,9 | 3,3 | 1,6 | 5,0 | 1298 |
| CH | 57,5 | 53,1 | 61,8 | 41,4 | 37,1 | 45,7 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | 813 |
| NO | 54,6 | 49,0 | 60,2 | 44,1 | 38,5 | 49,7 | 1,3 | 0,3 | 2,4 | 457 |
| FR | 53,3 | 48,8 | 57,8 | 46,4 | 41,9 | 50,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 687 |
| DE | 41,5 | 35,8 | 47,3 | 55,9 | 50,1 | 61,7 | 2,5 | 0,8 | 4,3 | 447 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.203 Professionnel de la santé facilement joignable entre les visites du médecin, Suisse (2017, en%)

| | Oui | | | Non | | | N'a jamais dû contacter entre les visites | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échan- tillon n |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 33,8 | 31,2 | 36,4 | 25,5 | 23,1 | 27,9 | 23,5 | 21,1 | 25,8 | 16,9 | 14,8 | 19,0 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2591 |
| Homme | 32,0 | 28,2 | 35,7 | 25,5 | 22,0 | 29,1 | 23,7 | 20,2 | 27,1 | 18,6 | 15,4 | 21,9 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1220 |
| Femme | 35,3 | 31,7 | 38,9 | 25,5 | 22,2 | 28,8 | 23,3 | 20,0 | 26,5 | 15,5 | 12,8 | 18,2 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1371 |
| 65-69 ans | 31,6 | 26,4 | 36,8 | 24,2 | 19,5 | 28,9 | 25,8 | 20,9 | 30,8 | 18,2 | 13,8 | 22,5 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 612 |
| 70-74 ans | 34,3 | 29,3 | 39,4 | 21,8 | 17,4 | 26,2 | 27,2 | 22,5 | 31,9 | 16,5 | 12,7 | 20,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 745 |
| 75-79 ans | 31,5 | 26,1 | 36,9 | 29,6 | 24,1 | 35,1 | 22,8 | 17,9 | 27,7 | 15,7 | 11,3 | 20,1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 567 |
| 80+ ans | 37,3 | 32,1 | 42,4 | 26,7 | 21,9 | 31,4 | 18,5 | 14,1 | 22,8 | 16,9 | 12,8 | 21,1 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 667 |
| Scolarité obligatoire | 36,9 | 31,6 | 42,3 | 31,2 | 25,9 | 36,5 | 21,7 | 16,9 | 26,5 | 9,7 | 6,5 | 13,0 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 595 |
| Secondaire II | 32,6 | 29,2 | 35,9 | 24,2 | 21,2 | 27,3 | 23,4 | 20,4 | 26,5 | 19,5 | 16,6 | 22,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1403 |
| Tertiaire | 33,6 | 27,7 | 39,4 | 20,3 | 15,2 | 25,3 | 27,7 | 21,9 | 33,6 | 18,5 | 13,3 | 23,6 | . | . | . | 572 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 32,8 | 29,8 | 35,8 | 24,6 | 21,8 | 27,4 | 25,3 | 22,5 | 28,2 | 16,9 | 14,5 | 19,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1928 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 36,6 | 31,5 | 41,8 | 28,0 | 23,1 | 32,8 | 18,2 | 14,0 | 22,5 | 16,9 | 12,7 | 21,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 663 |
| Né en Suisse | 32,6 | 29,6 | 35,6 | 25,9 | 23,1 | 28,7 | 23,6 | 20,9 | 26,3 | 17,6 | 15,1 | 20,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1760 |
| Né à l'étranger | 38,1 | 32,8 | 43,4 | 24,3 | 19,5 | 29,0 | 23,1 | 18,4 | 27,8 | 14,2 | 10,5 | 17,9 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 828 |
| Medical Home | 39,2 | 35,0 | 43,4 | 24,7 | 21,0 | 28,5 | 22,9 | 19,2 | 26,6 | 13,0 | 10,3 | 15,7 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1077 |
| Sans Medical Home | 28,5 | 22,9 | 34,1 | 35,7 | 29,6 | 41,8 | 18,8 | 14,0 | 23,6 | 16,8 | 12,0 | 21,7 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 581 |
| Malade | 44,5 | 39,9 | 49,1 | 25,7 | 21,6 | 29,7 | 21,0 | 17,3 | 24,8 | 8,7 | 6,1 | 11,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 942 |
| Non-malade | 27,3 | 24,1 | 30,5 | 25,6 | 22,5 | 28,8 | 24,5 | 21,4 | 27,6 | 22,1 | 19,1 | 25,0 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1548 |
| Malade avec Medical Home | 49,4 | 42,8 | 56,0 | 24,4 | 18,9 | 30,0 | 18,4 | 13,3 | 23,6 | 7,6 | 4,2 | 11,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 460 |
| Malade sans Medical Home | 37,8 | 27,7 | 48,0 | 36,3 | 25,6 | 47,1 | 13,5 | 6,9 | 20,1 | 12,3 | 4,5 | 20,1 | . | . | . | 209 |
| Ville | 29,7 | 25,2 | 34,3 | 27,0 | 22,4 | 31,5 | 26,7 | 22,1 | 31,4 | 16,2 | 12,4 | 20,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 826 |
| Agglomération | 33,1 | 29,3 | 36,8 | 25,2 | 21,6 | 28,7 | 23,1 | 19,7 | 26,6 | 18,3 | 15,1 | 21,5 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1309 |
| Zone rurale | 37,5 | 31,3 | 43,8 | 25,4 | 19,9 | 30,9 | 21,5 | 16,3 | 26,8 | 15,4 | 10,8 | 19,9 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 361 |
| Suisse alémanique | 31,1 | 27,7 | 34,6 | 24,9 | 21,7 | 28,2 | 26,1 | 22,9 | 29,3 | 17,7 | 14,9 | 20,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 805 |
| Suisse romande | 40,4 | 36,8 | 44,1 | 27,2 | 23,9 | 30,4 | 15,9 | 13,1 | 18,8 | 15,6 | 13,2 | 18,0 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 1529 |
| Suisse italienne | 38,2 | 32,1 | 44,3 | 25,7 | 20,1 | 31,2 | 23,6 | 18,1 | 29,0 | 11,8 | 7,8 | 15,7 | 0,8 | 0,0 | 1,9 | 257 |
| ZH | 28,4 | 22,7 | 34,1 | 19,5 | 14,4 | 24,6 | 35,8 | 29,7 | 41,9 | 15,8 | 11,2 | 20,4 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 252 |
| CH sans ZH | 34,9 | 32,0 | 37,8 | 26,7 | 24,0 | 29,4 | 21,0 | 18,5 | 23,6 | 17,1 | 14,8 | 19,4 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2339 |
| VD | 40,5 | 34,3 | 46,8 | 27,4 | 21,7 | 33,1 | 15,9 | 11,3 | 20,5 | 15,1 | 10,6 | 19,6 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 259 |
| CH sans VD | 33,2 | 30,4 | 36,0 | 25,3 | 22,7 | 27,9 | 24,2 | 21,6 | 26,7 | 17,1 | 14,8 | 19,3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 2332 |
| VS | 39,8 | 33,3 | 46,2 | 28,8 | 22,7 | 34,9 | 11,2 | 7,3 | 15,2 | 19,8 | 14,7 | 25,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 255 |
| CH sans VS | 33,5 | 30,8 | 36,2 | 25,4 | 22,8 | 27,9 | 24,0 | 21,6 | 26,5 | 16,7 | 14,6 | 18,9 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2336 |
| GE | 37,3 | 34,1 | 40,6 | 26,1 | 23,1 | 29,1 | 16,3 | 13,8 | 18,8 | 20,0 | 17,2 | 22,8 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 957 |
| CH sans GE | 33,6 | 30,8 | 36,4 | 25,5 | 22,9 | 28,0 | 23,9 | 21,4 | 26,4 | 16,7 | 14,5 | 18,9 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 1634 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.204 Professionnel de la santé facilement joignable entre les visites du médecin, Suisse (2014, en%)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 57,5 | 53,1 | 61,8 | 41,4 | 37,1 | 45,7 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | 813 |
| Homme | 55,3 | 48,7 | 61,8 | 44,0 | 37,4 | 50,5 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 379 |
| Femme | 59,2 | 53,5 | 64,9 | 39,3 | 33,6 | 45,0 | 1,5 | 0,3 | 2,8 | 434 |
| 65-69 ans | 58,6 | 50,6 | 66,6 | 39,9 | 31,9 | 47,9 | 1,5 | 0,0 | 3,2 | 258 |
| 70-74 ans | 65,4 | 58,1 | 72,8 | 32,6 | 25,4 | 39,9 | 1,9 | 0,0 | 3,9 | 221 |
| 75-79 ans | 54,3 | 44,9 | 63,8 | 45,5 | 36,0 | 54,9 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 161 |
| 80+ ans | 51,7 | 42,5 | 60,9 | 47,3 | 38,1 | 56,4 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 173 |
| Scolarité obligatoire | 55,8 | 46,1 | 65,4 | 43,7 | 34,0 | 53,3 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 164 |
| Secondaire II | 56,1 | 50,6 | 61,5 | 42,6 | 37,2 | 48,0 | 1,4 | 0,2 | 2,5 | 479 |
| Tertiaire | 68,5 | 58,4 | 78,5 | 30,2 | 20,2 | 40,2 | 1,4 | 0,0 | 3,1 | 161 |
| Revenu sup. à la moyenne | 65,0 | 55,5 | 74,6 | 34,7 | 25,1 | 44,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 140 |
| Revenu dans la moyenne | 55,1 | 44,2 | 66,1 | 43,7 | 32,8 | 54,7 | 1,1 | 0,0 | 3,4 | 138 |
| Revenu inf. à la moyenne | 57,4 | 51,9 | 62,9 | 41,2 | 35,8 | 46,7 | 1,4 | 0,3 | 2,5 | 502 |
| Né en Suisse | 58,7 | 54,0 | 63,4 | 40,5 | 35,7 | 45,2 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 641 |
| Né à l'étranger | 51,7 | 41,2 | 62,2 | 45,7 | 35,2 | 56,2 | 2,7 | 0,0 | 5,5 | 171 |
| Ville | 53,9 | 45,4 | 62,4 | 45,8 | 37,2 | 54,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 225 |
| Agglomération | 55,2 | 49,1 | 61,3 | 43,7 | 37,6 | 49,8 | 1,1 | 0,0 | 2,2 | 404 |
| Zone rurale | 65,8 | 57,6 | 74,0 | 32,0 | 23,9 | 40,0 | 2,2 | 0,0 | 4,6 | 184 |
| Medical Home | 67,3 | 61,0 | 73,7 | 32,2 | 25,9 | 38,6 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 337 |
| Sans Medical Home | 46,2 | 34,8 | 57,7 | 50,1 | 38,5 | 61,7 | 3,7 | 0,0 | 7,3 | 128 |
| Malade | 60,8 | 53,7 | 67,9 | 38,6 | 31,5 | 45,7 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 303 |
| Non-malade | 55,9 | 50,5 | 61,4 | 42,6 | 37,1 | 48,0 | 1,5 | 0,3 | 2,7 | 507 |
| Malade avec Medical Home | 69,7 | 60,5 | 79,0 | 30,3 | 21,0 | 39,5 | . | . | . | 146 |
| Malade sans Medical Home | 43,7 | 27,0 | 60,4 | 54,6 | 37,6 | 71,6 | 1,7 | 0,0 | 4,1 | 52 |
| Suisse alémanique | 59,0 | 53,5 | 64,5 | 39,8 | 34,3 | 45,2 | 1,2 | 0,2 | 2,3 | 427 |
| Suisse romande | 52,5 | 45,1 | 59,8 | 46,7 | 39,4 | 54,1 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 255 |
| Suisse italienne | 56,9 | 47,2 | 66,6 | 41,0 | 31,3 | 50,7 | 2,1 | 0,0 | 4,5 | 131 |
| VD | 56,8 | 47,1 | 66,5 | 42,5 | 32,8 | 52,2 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 126 |
| CH sans VD | 57,5 | 52,9 | 62,1 | 41,3 | 36,7 | 45,9 | 1,2 | 0,4 | 2,1 | 687 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1427 : Avez-vous un plan de traitement pour votre problème de santé, que vous pouvez gérer dans votre vie quotidienne ?

Base : Répondants ayant au moins une maladie chronique diagnostiquée.

Tableau 6.205 Dispose d'un plan de traitement, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | Échantillon n | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | | IC limite sup. |
| FR | 79,2 | 75,7 | 82,7 | 17,7 | 14,4 | 21,0 | 3,1 | 1,6 | 4,6 | . | . | . | 570 |
| US | 77,5 | 74,5 | 80,6 | 14,6 | 12,0 | 17,2 | 6,7 | 4,9 | 8,4 | 1,2 | 0,4 | 2,1 | 1232 |
| AU | 77,0 | 73,3 | 80,7 | 11,0 | 8,1 | 13,9 | 10,4 | 8,0 | 12,8 | 1,5 | 0,2 | 2,9 | 1842 |
| NZ | 72,5 | 67,1 | 77,9 | 15,7 | 11,2 | 20,3 | 11,3 | 7,6 | 14,9 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 347 |
| CA | 71,3 | 69,3 | 73,3 | 18,1 | 16,3 | 19,8 | 9,3 | 8,1 | 10,5 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 3867 |
| UK | 57,7 | 53,4 | 62,0 | 30,2 | 26,2 | 34,2 | 8,8 | 6,4 | 11,2 | 3,4 | 1,9 | 4,9 | 635 |
| NO | 52,3 | 47,4 | 57,1 | 34,0 | 29,4 | 38,6 | 12,9 | 9,7 | 16,1 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 570 |
| DE | 48,7 | 44,3 | 53,1 | 46,0 | 41,6 | 50,4 | 4,0 | 2,2 | 5,9 | 1,2 | 0,4 | 2,1 | 616 |
| CH | 46,1 | 43,4 | 48,8 | 35,1 | 32,4 | 37,8 | 18,6 | 16,4 | 20,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2591 |
| NL | 45,1 | 40,6 | 49,6 | 49,7 | 45,2 | 54,2 | 4,7 | 2,8 | 6,6 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 557 |
| SE | 32,6 | 31,1 | 34,1 | 49,0 | 47,4 | 50,6 | 16,6 | 15,4 | 17,7 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 5871 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.206 Dispose d'un plan de traitement, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n | | | |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | | | |
| US | 81,7 | 78,7 | 84,7 | 16,3 | 13,4 | 19,1 | 2,0 | 0,9 | 3,1 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 984 |
| AU | 79,3 | 74,5 | 84,0 | 19,9 | 15,2 | 24,6 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1298 |
| CA | 75,6 | 73,4 | 77,8 | 23,5 | 21,2 | 25,7 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2645 |
| UK | 72,9 | 67,4 | 78,4 | 26,9 | 21,4 | 32,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 385 |
| NZ | 63,2 | 55,0 | 71,4 | 36,1 | 27,9 | 44,3 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 250 |
| FR | 61,9 | 57,5 | 66,4 | 37,7 | 33,3 | 42,2 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 687 |
| NO | 52,2 | 46,6 | 57,8 | 46,1 | 40,5 | 51,6 | 1,7 | 0,4 | 3,0 | 1,7 | 0,4 | 3,0 | 457 |
| CH | 46,4 | 42,1 | 50,6 | 51,9 | 47,7 | 56,2 | 1,7 | 0,8 | 2,7 | 1,7 | 0,8 | 2,7 | 813 |
| NL | 40,3 | 34,6 | 46,1 | 58,0 | 52,2 | 63,8 | 1,6 | 0,2 | 3,1 | 1,6 | 0,2 | 3,1 | 454 |
| SE | 40,1 | 37,9 | 42,3 | 58,0 | 55,8 | 60,2 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 2,6 | 3653 |
| DE | 29,5 | 24,3 | 34,8 | 69,4 | 64,1 | 74,8 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 447 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.207 Dispose d'un plan de traitement, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'est plus en traitement pour cette maladie | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 46,1 | 43,4 | 48,8 | 35,1 | 32,4 | 37,8 | 18,6 | 16,4 | 20,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2591 |
| Homme | 45,0 | 41,0 | 48,9 | 34,4 | 30,5 | 38,4 | 20,6 | 17,2 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1220 |
| Femme | 47,0 | 43,3 | 50,8 | 35,7 | 32,0 | 39,4 | 17,1 | 14,3 | 19,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1371 |
| 65–69 ans | 49,5 | 43,9 | 55,1 | 30,1 | 24,9 | 35,3 | 20,4 | 15,9 | 24,9 | . | . | . | 612 |
| 70–74 ans | 45,7 | 40,5 | 50,9 | 36,9 | 31,6 | 42,1 | 17,3 | 13,5 | 21,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 745 |
| 75–79 ans | 44,9 | 39,1 | 50,6 | 38,4 | 32,5 | 44,3 | 16,6 | 12,1 | 21,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 567 |
| 80+ ans | 44,4 | 39,1 | 49,6 | 35,7 | 30,4 | 40,9 | 19,7 | 15,3 | 24,1 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 667 |
| Scolarité obligatoire | 51,5 | 45,8 | 57,1 | 37,2 | 31,6 | 42,8 | 10,9 | 7,5 | 14,3 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 595 |
| Secondaire II | 43,0 | 39,6 | 46,5 | 35,4 | 31,9 | 38,9 | 21,5 | 18,5 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1403 |
| Tertiaire | 52,1 | 45,7 | 58,5 | 28,1 | 22,3 | 33,9 | 19,8 | 14,6 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 572 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 45,7 | 42,5 | 48,9 | 35,3 | 32,2 | 38,5 | 18,8 | 16,3 | 21,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1928 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 47,3 | 42,0 | 52,6 | 34,5 | 29,3 | 39,7 | 18,1 | 13,8 | 22,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 663 |
| Né en Suisse | 44,7 | 41,6 | 47,8 | 36,0 | 32,9 | 39,1 | 19,1 | 16,6 | 21,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1760 |
| Né à l'étranger | 51,7 | 46,2 | 57,2 | 31,7 | 26,2 | 37,1 | 16,6 | 12,6 | 20,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 828 |
| Medical Home | 52,0 | 47,7 | 56,3 | 32,8 | 28,7 | 37,0 | 15,1 | 12,1 | 18,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1077 |
| Sans Medical Home | 41,6 | 35,6 | 47,5 | 40,1 | 33,8 | 46,5 | 18,2 | 13,2 | 23,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 581 |
| Malade | 57,7 | 53,1 | 62,3 | 33,4 | 28,9 | 37,9 | 8,9 | 6,2 | 11,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 942 |
| Non-malade | 39,2 | 35,8 | 42,6 | 36,2 | 32,8 | 39,7 | 24,4 | 21,3 | 27,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1548 |
| Malade avec Medical Home | 62,2 | 55,6 | 68,7 | 29,9 | 23,5 | 36,3 | 7,9 | 4,5 | 11,3 | . | . | . | 460 |
| Malade sans Medical Home | 53,3 | 42,5 | 64,2 | 33,9 | 23,3 | 44,6 | 12,4 | 4,6 | 20,2 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 209 |
| Ville | 46,8 | 41,8 | 51,9 | 35,8 | 30,7 | 40,8 | 17,4 | 13,5 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 826 |
| Agglomération | 44,8 | 40,8 | 48,7 | 35,3 | 31,3 | 39,2 | 19,9 | 16,6 | 23,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1309 |
| Zone rurale | 46,8 | 40,4 | 53,1 | 35,2 | 29,1 | 41,4 | 17,9 | 12,9 | 22,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 361 |
| Suisse alémanique | 38,8 | 35,1 | 42,4 | 41,9 | 38,2 | 45,6 | 19,3 | 16,4 | 22,3 | . | . | . | 805 |
| Suisse romande | 63,0 | 59,5 | 66,5 | 19,0 | 16,1 | 21,9 | 17,6 | 15,0 | 20,3 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1529 |
| Suisse italienne | 64,2 | 58,1 | 70,3 | 21,2 | 15,9 | 26,5 | 14,3 | 9,9 | 18,6 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 257 |
| ZH | 39,3 | 33,1 | 45,6 | 44,0 | 37,6 | 50,3 | 16,7 | 12,0 | 21,4 | . | . | . | 252 |
| CH sans ZH | 47,5 | 44,5 | 50,5 | 33,4 | 30,4 | 36,3 | 19,0 | 16,6 | 21,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2339 |
| VD | 62,8 | 56,6 | 68,9 | 20,6 | 15,4 | 25,7 | 16,3 | 11,6 | 20,9 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 259 |
| CH sans VD | 44,6 | 41,7 | 47,5 | 36,5 | 33,6 | 39,4 | 18,8 | 16,5 | 21,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2332 |
| VS | 51,7 | 45,2 | 58,3 | 26,6 | 20,7 | 32,5 | 20,5 | 15,3 | 25,8 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 255 |
| CH sans VS | 45,9 | 43,1 | 48,7 | 35,5 | 32,7 | 38,3 | 18,5 | 16,3 | 20,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2336 |
| GE | 60,2 | 56,9 | 63,5 | 18,0 | 15,4 | 20,6 | 21,6 | 18,7 | 24,5 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 957 |
| CH sans GE | 45,3 | 42,4 | 48,1 | 36,2 | 33,3 | 39,0 | 18,4 | 16,1 | 20,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1634 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.208 Dispose d'un plan de traitement, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 46,4 | 42,1 | 50,6 | 51,9 | 47,7 | 56,2 | 1,7 | 0,8 | 2,7 | 813 |
| Homme | 42,2 | 35,9 | 48,5 | 55,9 | 49,6 | 62,2 | 1,9 | 0,4 | 3,4 | 379 |
| Femme | 49,7 | 43,9 | 55,5 | 48,7 | 42,9 | 54,5 | 1,6 | 0,3 | 2,8 | 434 |
| 65–69 ans | 46,5 | 38,7 | 54,2 | 52,0 | 44,2 | 59,8 | 1,5 | 0,0 | 3,1 | 258 |
| 70–74 ans | 47,6 | 39,5 | 55,7 | 49,8 | 41,7 | 58,0 | 2,6 | 0,0 | 5,2 | 221 |
| 75–79 ans | 48,5 | 39,2 | 57,9 | 50,3 | 41,0 | 59,7 | 1,1 | 0,0 | 2,7 | 161 |
| 80+ ans | 43,2 | 34,1 | 52,4 | 55,1 | 45,9 | 64,2 | 1,7 | 0,0 | 3,7 | 173 |
| Scolarité obligatoire | 43,5 | 34,0 | 53,0 | 54,9 | 45,4 | 64,4 | 1,6 | 0,0 | 3,4 | 164 |
| Secondaire II | 47,5 | 42,1 | 52,8 | 50,6 | 45,2 | 56,0 | 1,9 | 0,6 | 3,2 | 479 |
| Tertiaire | 46,3 | 36,6 | 56,0 | 52,6 | 42,9 | 62,4 | 1,0 | 0,0 | 2,7 | 161 |
| Revenu sup. à la moyenne | 38,1 | 28,9 | 47,2 | 61,3 | 52,1 | 70,5 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 140 |
| Revenu dans la moyenne | 44,8 | 34,1 | 55,6 | 50,8 | 39,9 | 61,6 | 4,4 | 0,1 | 8,7 | 138 |
| Revenu inf. à la moyenne | 50,1 | 44,7 | 55,6 | 48,4 | 43,0 | 53,9 | 1,4 | 0,4 | 2,4 | 502 |
| Né en Suisse | 45,8 | 41,2 | 50,5 | 52,3 | 47,6 | 57,0 | 1,9 | 0,7 | 3,0 | 641 |
| Né à l'étranger | 49,2 | 38,7 | 59,6 | 49,7 | 39,2 | 60,2 | 1,1 | 0,0 | 2,8 | 171 |
| Ville | 47,4 | 39,0 | 55,8 | 51,1 | 42,7 | 59,6 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 225 |
| Agglomération | 47,3 | 41,3 | 53,3 | 51,4 | 45,3 | 57,4 | 1,4 | 0,2 | 2,5 | 404 |
| Zone rurale | 43,4 | 34,6 | 52,2 | 53,9 | 45,0 | 62,7 | 2,7 | 0,0 | 5,5 | 184 |
| Medical Home | 53,8 | 47,0 | 60,6 | 44,2 | 37,4 | 50,9 | 2,0 | 0,3 | 3,8 | 337 |
| Sans Medical Home | 41,9 | 30,4 | 53,3 | 56,1 | 44,6 | 67,5 | 2,1 | 0,0 | 4,4 | 128 |
| Malade | 56,6 | 49,4 | 63,8 | 40,6 | 33,5 | 47,7 | 2,8 | 0,5 | 5,0 | 303 |
| Non-malade | 41,0 | 35,8 | 46,2 | 57,8 | 52,6 | 63,0 | 1,2 | 0,3 | 2,1 | 507 |
| Malade avec Medical Home | 63,6 | 53,4 | 73,8 | 34,1 | 24,0 | 44,1 | 2,3 | 0,0 | 5,5 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 54,3 | 36,9 | 71,8 | 44,7 | 27,3 | 62,1 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 52 |
| Suisse alémanique | 41,1 | 35,8 | 46,5 | 58,1 | 52,7 | 63,4 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 427 |
| Suisse romande | 59,1 | 52,0 | 66,2 | 36,6 | 29,7 | 43,5 | 4,3 | 1,1 | 7,5 | 255 |
| Suisse italienne | 66,1 | 57,1 | 75,2 | 29,8 | 21,6 | 38,0 | 4,0 | 0,0 | 9,8 | 131 |
| VD | 55,0 | 45,4 | 64,7 | 38,7 | 29,3 | 48,2 | 6,2 | 1,0 | 11,4 | 126 |
| CH sans VD | 45,7 | 41,2 | 50,2 | 53,0 | 48,4 | 57,5 | 1,4 | 0,4 | 2,3 | 687 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1429 : Dans quelle mesure êtes-vous confiant/e quant au fait de pouvoir gérer vos problèmes de santé ?

Base : Répondants ayant au moins une maladie chronique diagnostiquée, non concernés exclus.

Tableau 6.209 Confiance quant à la gestion des problèmes de santé, comparaison internationale (2017, en %)

| | Très confiant/e | | | Confiant/e | | | Pas très confiant/e | | | Pas du tout confiant/e | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 49,8 | 46,0 | 53,5 | 43,2 | 39,5 | 46,9 | 4,8 | 3,0 | 6,6 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | 1169 |
| NZ | 45,9 | 39,4 | 52,4 | 46,6 | 40,2 | 53,1 | 4,4 | 1,9 | 6,9 | 1,1 | 0,0 | 2,9 | 2,0 | 0,0 | 4,1 | 306 |
| UK | 42,8 | 38,3 | 47,3 | 49,6 | 45,0 | 54,1 | 5,3 | 3,3 | 7,2 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | 2,9 | 589 |
| CA | 40,1 | 37,9 | 42,2 | 52,6 | 50,4 | 54,8 | 5,2 | 4,3 | 6,2 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,5 | 3578 |
| AU | 38,0 | 33,2 | 42,7 | 44,8 | 40,2 | 49,5 | 10,8 | 8,1 | 13,5 | 3,2 | 2,1 | 4,4 | 3,2 | 2,1 | 4,2 | 1605 |
| CH | 35,6 | 32,7 | 38,6 | 57,5 | 54,5 | 60,6 | 5,4 | 4,0 | 6,8 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 2145 |
| DE | 30,2 | 26,1 | 34,3 | 58,7 | 54,3 | 63,1 | 6,9 | 4,7 | 9,1 | 3,3 | 1,7 | 5,0 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 596 |
| NO | 29,7 | 25,0 | 34,3 | 59,6 | 54,5 | 64,7 | 9,3 | 6,0 | 12,5 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 495 |
| SE | 25,7 | 24,1 | 27,2 | 59,9 | 58,2 | 61,7 | 8,9 | 7,9 | 9,9 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 3,0 | 2,4 | 3,6 | 4882 |
| NL | 22,9 | 19,0 | 26,7 | 65,6 | 61,3 | 69,9 | 8,7 | 6,2 | 11,2 | 1,3 | 0,4 | 2,3 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 539 |
| FR | 17,0 | 13,8 | 20,3 | 73,7 | 69,7 | 77,6 | 6,6 | 4,3 | 8,9 | 1,8 | 0,6 | 3,1 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 553 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.210 Confiance quant à la gestion des problèmes de santé, Suisse (2017, en %)

| | Très confiant/e | | | Confiant/e | | | Pas très confiant/e | | | Pas du tout confiant/e | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 35,6 | 32,7 | 38,6 | 57,5 | 54,5 | 60,6 | 5,4 | 4,0 | 6,8 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 2145 |
| Homme | 35,7 | 31,4 | 40,0 | 60,2 | 55,8 | 64,6 | 3,4 | 1,7 | 5,1 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1013 |
| Femme | 35,6 | 31,6 | 39,6 | 55,5 | 51,4 | 59,7 | 6,9 | 4,8 | 9,0 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 0,9 | 0,2 | 1,6 | 1132 |
| 65–69 ans | 35,6 | 29,6 | 41,6 | 57,9 | 51,8 | 64,1 | 6,0 | 2,9 | 9,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 489 |
| 70–74 ans | 36,2 | 30,5 | 41,8 | 58,8 | 53,0 | 64,6 | 4,3 | 1,8 | 6,8 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 607 |
| 75–79 ans | 36,3 | 30,1 | 42,5 | 55,9 | 49,5 | 62,3 | 6,1 | 2,9 | 9,4 | 1,6 | 0 | 3,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 489 |
| 80+ ans | 34,7 | 29,1 | 40,3 | 57,4 | 51,6 | 63,3 | 5,2 | 2,7 | 7,6 | 1,4 | 0,1 | 2,8 | 1,3 | 0,0 | 2,5 | 560 |
| Scolarité obligatoire | 28,0 | 22,6 | 33,5 | 61,1 | 55,2 | 66,9 | 9,2 | 5,8 | 12,7 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 524 |
| Secondaire II | 38,4 | 34,5 | 42,3 | 56,6 | 52,6 | 60,6 | 3,9 | 2,3 | 5,5 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 1133 |
| Tertiaire | 39,8 | 32,9 | 46,7 | 53,7 | 46,7 | 60,7 | 4,7 | 1,9 | 7,6 | 1,7 | 0,0 | 3,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 470 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 37,3 | 33,8 | 40,7 | 56,8 | 53,3 | 60,4 | 4,6 | 3,1 | 6,1 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 1593 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 31,2 | 25,7 | 36,7 | 59,5 | 53,7 | 65,3 | 7,7 | 4,4 | 11,0 | 1,2 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 552 |
| Né en Suisse | 38,6 | 35,2 | 42,1 | 55,9 | 52,4 | 59,4 | 4,0 | 2,6 | 5,4 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1455 |
| Né à l'étranger | 25,3 | 20,2 | 30,4 | 63,0 | 57,2 | 68,8 | 10,2 | 6,5 | 14,0 | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 688 |
| Medical Home | 37,7 | 33,1 | 42,3 | 55,8 | 51,2 | 60,5 | 5,0 | 3,0 | 7,1 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 903 |
| Sans Medical Home | 18,6 | 13,4 | 23,9 | 65,6 | 59,1 | 72,2 | 13,8 | 8,9 | 18,8 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 489 |
| Malade | 33,5 | 28,9 | 38,1 | 59,0 | 54,2 | 63,8 | 5,8 | 3,5 | 8,1 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 861 |
| Non-malade | 38,7 | 34,7 | 42,7 | 56,2 | 52,2 | 60,3 | 4,2 | 2,6 | 5,8 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1197 |
| Malade avec Medical Home | 32,4 | 25,9 | 38,9 | 59,8 | 53,1 | 66,6 | 6,0 | 2,9 | 9,2 | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 421 |
| Malade sans Medical Home | 24,9 | 15,3 | 34,6 | 60,4 | 49,2 | 71,6 | 13,6 | 5,0 | 22,1 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 189 |
| Ville | 33,8 | 28,5 | 39,1 | 59,7 | 54,3 | 65,2 | 4,7 | 2,3 | 7,0 | 1,0 | 0,2 | 1,9 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 693 |
| Agglomération | 36,2 | 31,9 | 40,6 | 55,8 | 51,3 | 60,2 | 6,9 | 4,5 | 9,3 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 1070 |
| Zone rurale | 36,0 | 29,3 | 42,7 | 59,8 | 52,9 | 66,6 | 3,1 | 0,8 | 5,4 | 0,7 | 0,0 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 300 |
| Suisse alémanique | 38,7 | 34,7 | 42,7 | 54,9 | 50,9 | 59,0 | 5,0 | 3,2 | 6,9 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 663 |
| Suisse romande | 30,4 | 26,6 | 34,2 | 62,4 | 58,4 | 66,4 | 5,8 | 3,7 | 7,8 | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 1257 |
| Suisse italienne | 22,1 | 16,5 | 27,7 | 67,3 | 60,9 | 73,6 | 8,2 | 4,6 | 11,9 | 2,0 | 0,0 | 3,9 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 225 |
| ZH | 38,5 | 31,7 | 45,2 | 55,1 | 48,2 | 62,0 | 4,2 | 1,3 | 7,1 | 1,0 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | 212 |
| CH sans ZH | 35,1 | 31,8 | 38,3 | 58,0 | 54,7 | 61,4 | 5,6 | 4,1 | 7,2 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1933 |
| VD | 30,7 | 24,4 | 37,0 | 62,4 | 55,7 | 69,1 | 5,8 | 2,5 | 9,2 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | . | . | . | 219 |
| CH sans VD | 36,1 | 33,0 | 39,3 | 57,1 | 53,8 | 60,3 | 5,3 | 3,8 | 6,8 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 1926 |
| VS | 37,8 | 30,8 | 44,9 | 57,3 | 50,0 | 64,6 | 2,0 | 0,0 | 4,4 | 1,5 | 0,0 | 3,8 | 1,4 | 0,0 | 2,9 | 205 |
| CH sans VS | 35,6 | 32,5 | 38,6 | 57,5 | 54,4 | 60,7 | 5,5 | 4,1 | 7,0 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1940 |
| GE | 29,2 | 25,8 | 32,6 | 63,0 | 59,4 | 66,6 | 6,4 | 4,5 | 8,2 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 776 |
| CH sans GE | 36,0 | 32,9 | 39,1 | 57,2 | 54,0 | 60,4 | 5,3 | 3,9 | 6,8 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1369 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1480 : Au cours des deux dernières années, est-ce qu'un professionnel de la santé a parlé avec vous ... ?

- D'une alimentation saine et de nourriture saine. (A1)
- D'exercices ou d'activités physiques. (A2)
- De choses qui vous inquiètent ou vous stressent dans la vie. (A3)
- De la consommation d'alcool. (A4)

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.211 Discussion avec un professionnel de la santé, comparaison internationale (2017, en %)

| Alimentation et nourriture saines | | | Exercices ou activités physiques | | | Choses qui vous inquiètent ou vous stressent dans la vie | | | Consommation d'alcool | | | Échantillon | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------|------------------|--|----------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| FR | 64,2 | 60,5 | 67,9 | US | 68,9 | 65,7 | 72,1 | AU | 31,3 | 27,6 | 34,9 | FR | 27,9 | 24,4 | 31,4 | 750 |
| US | 59,0 | 55,7 | 62,4 | FR | 57,2 | 53,3 | 61,0 | FR | 29,4 | 25,8 | 33,0 | AU | 24,0 | 20,8 | 27,1 | 2500 |
| NZ | 50,1 | 45,0 | 55,2 | CA | 51,8 | 49,9 | 53,8 | US | 27,4 | 24,3 | 30,5 | NZ | 21,7 | 17,5 | 25,9 | 500 |
| AU | 46,7 | 42,9 | 50,5 | NZ | 51,5 | 46,3 | 56,6 | NZ | 25,9 | 21,6 | 30,2 | UK | 19,9 | 16,7 | 23,1 | 753 |
| CA | 44,7 | 42,7 | 46,6 | AU | 49,7 | 45,9 | 53,6 | CA | 20,3 | 18,8 | 21,9 | SE | 18,5 | 17,3 | 19,6 | 7000 |
| UK | 40,6 | 36,7 | 44,5 | CH | 47,0 | 44,5 | 49,4 | CH | 17,7 | 15,9 | 19,5 | US | 18,5 | 15,8 | 21,2 | 1392 |
| DE | 39,9 | 36,0 | 43,8 | DE | 46,7 | 42,8 | 50,7 | NL | 17,1 | 14,1 | 20,0 | CA | 16,8 | 15,3 | 18,3 | 4549 |
| CH | 31,8 | 29,6 | 34,1 | NO | 46,3 | 42,0 | 50,6 | DE | 14,5 | 11,6 | 17,3 | NL | 13,7 | 11,1 | 16,4 | 750 |
| NO | 29,6 | 25,6 | 33,5 | SE | 43,2 | 41,8 | 44,7 | UK | 13,8 | 11,0 | 16,5 | DE | 11,6 | 9,1 | 14,1 | 751 |
| SE | 27,9 | 26,6 | 29,2 | UK | 41,4 | 37,4 | 45,4 | NO | 11,3 | 8,6 | 14,0 | NO | 11,5 | 8,7 | 14,3 | 750 |
| NL | 23,9 | 20,5 | 27,2 | NL | 36,6 | 32,8 | 40,3 | SE | 9,0 | 8,2 | 9,9 | CH | 10,5 | 9,1 | 11,9 | 3238 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.212 Discussion avec un professionnel de la santé, comparaison internationale (2014, en %)

| Alimentation et nourriture saines | | | Exercices ou activités physiques | | | Choses qui vous inquiètent ou vous stressent dans la vie | | | Échantillon | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|-----------|------------------|--|----------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 62,2 | 58,7 | 65,8 | US | 68,6 | 65,2 | 71,9 | AU | 30,3 | 24,8 | 35,7 | 1670 |
| DE | 58,8 | 53,6 | 64,0 | DE | 55,9 | 50,6 | 61,1 | DE | 30,3 | 25,4 | 35,2 | 547 |
| FR | 50,8 | 46,7 | 54,8 | CA | 52,7 | 50,3 | 55,1 | US | 28,4 | 25,1 | 31,8 | 1116 |
| AU | 49,6 | 43,9 | 55,2 | AU | 51,7 | 46,1 | 57,3 | UK | 24,9 | 20,9 | 29,0 | 581 |
| UK | 49,5 | 44,7 | 54,3 | UK | 49,3 | 44,4 | 54,1 | NZ | 21,6 | 16,0 | 27,3 | 379 |
| CA | 47,9 | 45,5 | 50,3 | NO | 45,7 | 40,9 | 50,4 | CA | 20,4 | 18,5 | 22,3 | 3147 |
| NZ | 43,1 | 36,3 | 49,9 | CH | 43,8 | 40,1 | 47,5 | FR | 17,7 | 14,6 | 20,7 | 860 |
| CH | 29,4 | 26,2 | 32,6 | NZ | 41,9 | 35,1 | 48,7 | CH | 15,3 | 12,7 | 17,9 | 1084 |
| NO | 26,2 | 22,0 | 30,4 | SE | 39,0 | 37,1 | 40,9 | NO | 13,3 | 10,1 | 16,5 | 651 |
| SE | 25,8 | 24,1 | 27,5 | FR | 36,6 | 32,7 | 40,5 | NL | 11,3 | 7,9 | 14,6 | 582 |
| NL | 25,4 | 21,0 | 29,9 | NL | 32,2 | 27,4 | 37,0 | SE | 8,3 | 7,3 | 9,4 | 5000 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.213 Discussion avec un professionnel de la santé, Suisse (2017, en %)

| | Alimentation et nourriture saines | | | Exercices ou activités physiques | | | Choses qui vous inquiètent ou vous stressent dans la vie | | | Consommation d'alcool | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 31,8 | 29,6 | 34,1 | 47,0 | 44,5 | 49,4 | 17,7 | 15,9 | 19,5 | 10,5 | 9,1 | 11,9 | 3238 |
| Homme | 32,3 | 29,0 | 35,5 | 49,1 | 45,6 | 52,7 | 14,5 | 12,1 | 16,9 | 14,8 | 12,4 | 17,2 | 1526 |
| Femme | 31,5 | 28,4 | 34,6 | 45,2 | 41,9 | 48,6 | 20,3 | 17,7 | 22,9 | 7,1 | 5,4 | 8,7 | 1712 |
| 65-69 ans | 32,1 | 27,8 | 36,5 | 48,5 | 43,8 | 53,2 | 20,8 | 17,1 | 24,6 | 11,3 | 8,5 | 14,0 | 828 |
| 70-74 ans | 34,2 | 30,0 | 38,5 | 47,8 | 43,2 | 52,4 | 17,2 | 13,9 | 20,5 | 11,3 | 8,5 | 14,0 | 954 |
| 75-79 ans | 34,9 | 29,8 | 39,9 | 48,5 | 43,2 | 53,8 | 14,9 | 11,6 | 18,2 | 12,3 | 9,0 | 15,6 | 697 |
| 80+ ans | 26,5 | 22,1 | 30,8 | 43,1 | 38,1 | 48,0 | 18,4 | 14,7 | 22,2 | 7,3 | 4,9 | 9,7 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 35,2 | 30,4 | 40,0 | 41,0 | 36,0 | 46,0 | 18,4 | 14,7 | 22,2 | 9,5 | 6,8 | 12,2 | 706 |
| Secondaire II | 30,8 | 27,9 | 33,7 | 47,7 | 44,5 | 50,8 | 17,9 | 15,6 | 20,3 | 10,6 | 8,7 | 12,4 | 1765 |
| Tertiaire | 30,8 | 25,9 | 35,6 | 53,7 | 48,2 | 59,2 | 15,3 | 11,6 | 19,1 | 12,4 | 8,9 | 15,9 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 31,5 | 28,9 | 34,1 | 48,3 | 45,5 | 51,2 | 17,3 | 15,3 | 19,4 | 10,3 | 8,7 | 11,9 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 32,9 | 28,4 | 37,3 | 43,0 | 38,2 | 47,8 | 18,8 | 15,1 | 22,4 | 11,1 | 8,2 | 14,0 | 807 |
| Né en Suisse | 30,5 | 27,9 | 33,0 | 46,4 | 43,6 | 49,2 | 16,7 | 14,7 | 18,7 | 10,2 | 8,6 | 11,8 | 2217 |
| Né à l'étranger | 37,0 | 32,3 | 41,7 | 49,0 | 44,1 | 53,9 | 21,5 | 17,5 | 25,5 | 11,7 | 8,7 | 14,7 | 1015 |
| Medical Home | 40,6 | 36,8 | 44,5 | 56,9 | 52,9 | 60,8 | 24,5 | 21,2 | 27,8 | 15,1 | 12,5 | 17,8 | 1249 |
| Sans Medical Home | 29,9 | 25,0 | 34,8 | 41,8 | 36,4 | 47,2 | 15,7 | 12,0 | 19,4 | 9,1 | 6,2 | 12,0 | 726 |
| Malade | 43,7 | 39,2 | 48,3 | 62,6 | 58,1 | 67,1 | 23,9 | 20,1 | 27,6 | 16,3 | 13,1 | 19,6 | 948 |
| Non-malade | 26,5 | 24,0 | 29,1 | 40,6 | 37,7 | 43,5 | 14,9 | 12,9 | 17,0 | 7,7 | 6,3 | 9,2 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 49,8 | 43,3 | 56,4 | 66,6 | 60,3 | 72,9 | 28,9 | 23,1 | 34,7 | 21,4 | 16,2 | 26,6 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 44,7 | 33,9 | 55,5 | 60,1 | 49,7 | 70,6 | 20,2 | 13,1 | 27,4 | 16,2 | 8,5 | 24,0 | 210 |
| Ville | 31,3 | 27,3 | 35,4 | 47,5 | 42,9 | 52,0 | 17,7 | 14,4 | 20,9 | 10,9 | 8,3 | 13,6 | 1026 |
| Agglomération | 32,4 | 29,1 | 35,6 | 48,5 | 44,9 | 52,1 | 17,8 | 15,2 | 20,5 | 10,7 | 8,6 | 12,8 | 1643 |
| Zone rurale | 30,5 | 25,3 | 35,7 | 43,6 | 38,0 | 49,2 | 16,5 | 12,4 | 20,6 | 10,9 | 7,6 | 14,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 26,7 | 23,7 | 29,6 | 43,1 | 39,8 | 46,3 | 13,9 | 11,6 | 16,3 | 8,2 | 6,4 | 9,9 | 1040 |
| Suisse romande | 46,3 | 43,0 | 49,7 | 57,3 | 53,9 | 60,6 | 28,0 | 25,0 | 31,1 | 18,4 | 15,9 | 20,9 | 1869 |
| Suisse italienne | 34,8 | 29,5 | 40,0 | 51,6 | 46,0 | 57,1 | 20,6 | 16,1 | 25,2 | 6,1 | 3,5 | 8,7 | 329 |
| ZH | 22,7 | 18,0 | 27,3 | 43,5 | 38,0 | 49,0 | 15,2 | 11,2 | 19,2 | 7,3 | 4,4 | 10,1 | 332 |
| CH sans ZH | 33,7 | 31,2 | 36,2 | 47,7 | 45,0 | 50,4 | 18,2 | 16,2 | 20,2 | 11,2 | 9,6 | 12,7 | 2906 |
| VD | 47,4 | 41,7 | 53,1 | 58,6 | 53,1 | 64,2 | 26,9 | 21,8 | 32,0 | 19,6 | 15,0 | 24,2 | 324 |
| CH sans VD | 30,4 | 28,0 | 32,8 | 45,9 | 43,2 | 48,5 | 16,8 | 14,9 | 18,7 | 9,6 | 8,2 | 11,1 | 2914 |
| VS | 39,2 | 33,5 | 45,0 | 50,2 | 44,3 | 56,1 | 21,2 | 16,1 | 26,2 | 16,7 | 12,2 | 21,2 | 321 |
| CH sans VS | 31,5 | 29,2 | 33,8 | 46,8 | 44,3 | 49,4 | 17,6 | 15,7 | 19,4 | 10,2 | 8,8 | 11,7 | 2917 |
| GE | 47,1 | 44,1 | 50,2 | 61,3 | 58,3 | 64,3 | 27,6 | 24,8 | 30,3 | 21,2 | 18,7 | 23,7 | 1160 |
| CH sans GE | 30,9 | 28,6 | 33,3 | 46,1 | 43,5 | 48,7 | 17,1 | 15,2 | 19,0 | 9,9 | 8,4 | 11,3 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.214 Discussion avec un professionnel de la santé, Suisse (2014, en %)

| | Alimentation et nourriture saines | | | Exercices ou activités physiques | | | Choses qui vous inquiètent ou vous stressent dans la vie | | | Échantillon n |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 29,4 | 26,2 | 32,6 | 43,8 | 40,1 | 47,5 | 15,3 | 12,7 | 17,9 | 1084 |
| Homme | 34,2 | 28,9 | 39,4 | 47,2 | 41,4 | 52,9 | 11,4 | 7,8 | 14,9 | 493 |
| Femme | 25,9 | 21,8 | 29,9 | 41,4 | 36,5 | 46,2 | 18,2 | 14,5 | 21,9 | 591 |
| 65-69 ans | 34,2 | 28,1 | 40,2 | 43,0 | 36,3 | 49,8 | 20,9 | 15,4 | 26,3 | 349 |
| 70-74 ans | 31,1 | 24,9 | 37,2 | 51,2 | 44,1 | 58,2 | 13,9 | 9,6 | 18,3 | 300 |
| 75-79 ans | 29,2 | 22,1 | 36,2 | 46,0 | 37,9 | 54,1 | 17,1 | 10,7 | 23,4 | 209 |
| 80+ ans | 22,3 | 15,6 | 29,1 | 35,6 | 27,9 | 43,3 | 8,3 | 4,3 | 12,4 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 27,5 | 20,2 | 34,9 | 31,8 | 23,9 | 39,7 | 13,7 | 7,7 | 19,7 | 216 |
| Secondaire II | 29,4 | 25,3 | 33,5 | 47,4 | 42,7 | 52,1 | 15,1 | 11,8 | 18,4 | 628 |
| Tertiaire | 35,1 | 27,6 | 42,6 | 48,9 | 40,6 | 57,2 | 19,4 | 13,3 | 25,5 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 29,8 | 21,9 | 37,7 | 48,2 | 39,4 | 57,1 | 12,1 | 7,1 | 17,1 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 27,9 | 20,8 | 34,9 | 46,3 | 37,6 | 55,0 | 17,8 | 10,6 | 25,1 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 30,4 | 26,1 | 34,7 | 44,1 | 39,3 | 48,9 | 15,9 | 12,6 | 19,2 | 645 |
| Né en Suisse | 29,0 | 25,5 | 32,5 | 41,5 | 37,5 | 45,5 | 14,9 | 12,2 | 17,6 | 863 |
| Né à l'étranger | 31,6 | 23,3 | 40,0 | 54,6 | 45,8 | 63,4 | 17,1 | 9,5 | 24,6 | 220 |
| Ville | 29,2 | 22,5 | 35,9 | 49,7 | 42,3 | 57,2 | 19,3 | 13,0 | 25,7 | 293 |
| Agglomération | 31,0 | 26,5 | 35,6 | 45,2 | 40,0 | 50,4 | 13,6 | 10,4 | 16,9 | 540 |
| Zone rurale | 26,5 | 20,3 | 32,7 | 34,9 | 27,8 | 42,1 | 14,1 | 9,4 | 18,9 | 251 |
| Medical Home | 41,2 | 35,2 | 47,2 | 59,7 | 53,7 | 65,8 | 22,0 | 17,1 | 26,9 | 392 |
| Sans Medical Home | 23,1 | 15,5 | 30,8 | 34,8 | 25,6 | 43,9 | 12,9 | 4,9 | 20,8 | 177 |
| Malade | 42,1 | 35,1 | 49,0 | 53,9 | 46,7 | 61,1 | 19,6 | 14,3 | 24,8 | 305 |
| Non-malade | 25,0 | 21,4 | 28,6 | 40,5 | 36,2 | 44,9 | 13,8 | 10,7 | 16,8 | 765 |
| Malade avec Medical Home | 52,2 | 41,6 | 62,7 | 65,6 | 55,4 | 75,9 | 31,1 | 21,6 | 40,6 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 33,7 | 19,1 | 48,3 | 41,6 | 25,3 | 57,8 | 15,7 | 5,9 | 25,5 | 52 |
| Suisse alémanique | 25,1 | 21,1 | 29,1 | 41,8 | 37,0 | 46,5 | 14,1 | 10,7 | 17,4 | 551 |
| Suisse romande | 41,7 | 35,7 | 47,6 | 49,7 | 43,6 | 55,8 | 18,9 | 14,2 | 23,5 | 355 |
| Suisse italienne | 33,6 | 26,1 | 41,2 | 46,1 | 37,8 | 54,3 | 15,8 | 10,2 | 21,5 | 178 |
| VD | 40,4 | 32,4 | 48,3 | 45,4 | 37,3 | 53,5 | 13,8 | 8,7 | 19,0 | 178 |
| CH sans VD | 28,4 | 25,0 | 31,9 | 43,7 | 39,7 | 47,7 | 15,4 | 12,6 | 18,2 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1483 : Est-ce que vous fumez des cigarettes ou consommez du tabac ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.215 Consommation de cigarettes ou de tabac, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 11,2 | 9,6 | 12,7 | 88,8 | 87,3 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3238 |
| Homme | 13,2 | 10,7 | 15,7 | 86,8 | 84,3 | 89,3 | . | . | . | 1526 |
| Femme | 9,5 | 7,6 | 11,4 | 90,4 | 88,5 | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1712 |
| 65-69 ans | 17,9 | 14,3 | 21,6 | 82,1 | 78,4 | 85,7 | . | . | . | 828 |
| 70-74 ans | 12,0 | 9,1 | 15,0 | 88,0 | 85,0 | 90,9 | . | . | . | 954 |
| 75-79 ans | 8,2 | 5,3 | 11,0 | 91,8 | 89,0 | 94,7 | . | . | . | 697 |
| 80+ ans | 5,2 | 3,0 | 7,5 | 94,7 | 92,5 | 96,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 9,8 | 6,9 | 12,7 | 90,2 | 87,3 | 93,1 | . | . | . | 706 |
| Secondaire II | 11,6 | 9,5 | 13,6 | 88,4 | 86,4 | 90,5 | . | . | . | 1765 |
| Tertiaire | 12,5 | 8,8 | 16,1 | 87,5 | 83,9 | 91,2 | . | . | . | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 10,0 | 8,4 | 11,7 | 89,9 | 88,3 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 14,5 | 11,0 | 17,9 | 85,5 | 82,1 | 89,0 | . | . | . | 807 |
| Né en Suisse | 11,0 | 9,2 | 12,7 | 89,0 | 87,3 | 90,8 | . | . | . | 2217 |
| Né à l'étranger | 12,1 | 9,0 | 15,2 | 87,9 | 84,8 | 91,0 | . | . | . | 1015 |
| Medical Home | 10,1 | 7,7 | 12,5 | 89,9 | 87,5 | 92,3 | . | . | . | 1249 |
| Sans Medical Home | 11,6 | 8,2 | 15,0 | 88,4 | 85,0 | 91,8 | . | . | . | 726 |
| Malade | 13,0 | 9,9 | 16,1 | 87,0 | 83,9 | 90,1 | . | . | . | 948 |
| Non-malade | 10,7 | 8,8 | 12,5 | 89,3 | 87,5 | 91,2 | . | . | . | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 9,1 | 5,5 | 12,7 | 90,9 | 87,3 | 94,5 | . | . | . | 463 |
| Malade sans Medical Home | 16,8 | 8,7 | 24,8 | 83,2 | 75,2 | 91,3 | . | . | . | 210 |
| Ville | 13,8 | 10,7 | 17,0 | 86,2 | 83,0 | 89,3 | . | . | . | 1026 |
| Agglomération | 9,8 | 7,6 | 11,9 | 90,2 | 88,1 | 92,4 | . | . | . | 1643 |
| Zone rurale | 10,8 | 7,3 | 14,2 | 89,2 | 85,7 | 92,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 10,9 | 8,8 | 12,9 | 89,1 | 87,1 | 91,2 | . | . | . | 1040 |
| Suisse romande | 10,8 | 8,9 | 12,8 | 89,1 | 87,2 | 91,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1869 |
| Suisse italienne | 16,3 | 12,1 | 20,6 | 83,7 | 79,4 | 87,9 | . | . | . | 329 |
| ZH | 11,0 | 7,5 | 14,4 | 89,0 | 85,6 | 92,5 | . | . | . | 332 |
| CH sans ZH | 11,2 | 9,5 | 12,9 | 88,8 | 87,0 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2906 |
| VD | 10,7 | 7,3 | 14,0 | 89,2 | 85,8 | 92,6 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 11,2 | 9,6 | 12,9 | 88,8 | 87,1 | 90,4 | . | . | . | 2914 |
| VS | 7,7 | 4,5 | 10,8 | 92,3 | 89,2 | 95,5 | . | . | . | 321 |
| CH sans VS | 11,3 | 9,7 | 12,9 | 88,6 | 87,0 | 90,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2917 |
| GE | 13,8 | 11,6 | 16,0 | 86,2 | 84,0 | 88,4 | . | . | . | 1160 |
| CH sans GE | 11,0 | 9,4 | 12,7 | 89,0 | 87,3 | 90,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.216 Consommation de cigarettes ou de tabac, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 14,0 | 11,2 | 16,7 | 86,0 | 83,3 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1084 |
| Homme | 17,7 | 13,2 | 22,2 | 82,3 | 77,8 | 86,8 | . | . | . | 493 |
| Femme | 11,2 | 7,8 | 14,6 | 88,8 | 85,3 | 92,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 591 |
| 65-69 ans | 20,5 | 14,8 | 26,3 | 79,5 | 73,7 | 85,2 | . | . | . | 349 |
| 70-74 ans | 14,3 | 9,0 | 19,7 | 85,6 | 80,2 | 90,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 300 |
| 75-79 ans | 9,8 | 5,0 | 14,5 | 90,2 | 85,5 | 95,0 | . | . | . | 209 |
| 80+ ans | 9,6 | 4,2 | 15,1 | 90,4 | 84,9 | 95,8 | . | . | . | 226 |
| Scolarité obligatoire | 12,3 | 5,7 | 19,0 | 87,6 | 80,9 | 94,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 216 |
| Secondaire II | 14,6 | 11,2 | 18,1 | 85,4 | 81,9 | 88,8 | . | . | . | 628 |
| Tertiaire | 14,4 | 9,2 | 19,6 | 85,6 | 80,4 | 90,8 | . | . | . | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 15,7 | 9,6 | 21,8 | 84,3 | 78,2 | 90,4 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 10,9 | 5,3 | 16,4 | 89,1 | 83,6 | 94,7 | . | . | . | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 14,9 | 11,2 | 18,6 | 85,1 | 81,3 | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 645 |
| Né en Suisse | 14,0 | 11,0 | 17,1 | 85,9 | 82,9 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 863 |
| Né à l'étranger | 13,9 | 7,5 | 20,2 | 86,1 | 79,8 | 92,5 | . | . | . | 220 |
| Ville | 10,7 | 6,5 | 14,8 | 89,3 | 85,2 | 93,5 | . | . | . | 293 |
| Agglomération | 15,3 | 11,2 | 19,4 | 84,6 | 80,5 | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 540 |
| Zone rurale | 14,9 | 8,9 | 20,9 | 85,1 | 79,1 | 91,1 | . | . | . | 251 |
| Medical Home | 12,6 | 8,9 | 16,4 | 87,3 | 83,5 | 91,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 575 |
| Sans Medical Home | 17,0 | 10,5 | 23,5 | 83,0 | 76,5 | 89,5 | . | . | . | 222 |
| Malade | 13,1 | 7,6 | 18,5 | 86,9 | 81,5 | 92,4 | . | . | . | 305 |
| Non-malade | 14,4 | 11,2 | 17,6 | 85,6 | 82,4 | 88,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 14,1 | 6,6 | 21,6 | 85,9 | 78,4 | 93,4 | . | . | . | 195 |
| Malade sans Medical Home | 12,5 | 2,1 | 22,8 | 87,5 | 77,2 | 97,9 | . | . | . | 55 |
| Suisse alémanique | 14,2 | 10,6 | 17,7 | 85,8 | 82,3 | 89,4 | . | . | . | 551 |
| Suisse romande | 13,6 | 9,3 | 18,0 | 86,4 | 82,0 | 90,7 | . | . | . | 355 |
| Suisse italienne | 13,1 | 7,2 | 19,0 | 86,5 | 80,6 | 92,4 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 178 |
| VD | 11,3 | 5,9 | 16,7 | 88,7 | 83,3 | 94,1 | . | . | . | 178 |
| CH sans VD | 14,2 | 11,3 | 17,2 | 85,8 | 82,8 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1485 : Au cours des deux dernières années, est-ce qu'un professionnel de la santé a parlé avec vous des risques pour la santé de fumer ou de consommer du tabac et des modes pour arrêter ?

Base : Répondants fumant des cigarettes ou consommant du tabac.

Tableau 6.217 Discussion concernant la consommation de cigarettes ou de tabac, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'a pas consulté de médecin ces deux dernières années | | | NSP/NR | | | Échan- tillon n |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 53,7 | 46,4 | 61,1 | 43,1 | 35,8 | 50,4 | 3,1 | 0,9 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 384 |
| Homme | 57,3 | 47,1 | 67,4 | 41,1 | 31,0 | 51,2 | 1,7 | 0,0 | 3,4 | . | . | . | 198 |
| Femme | 49,8 | 39,3 | 60,3 | 45,4 | 34,8 | 55,9 | 4,7 | 0,4 | 9,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 186 |
| 65–69 ans | 58,1 | 46,9 | 69,3 | 39,3 | 28,1 | 50,5 | 2,6 | 0,1 | 5,1 | . | . | . | 155 |
| 70–74 ans | 51,5 | 38,3 | 64,7 | 43,2 | 30,0 | 56,4 | 5,3 | 0,0 | 12,1 | . | . | . | 119 |
| 75–79 ans | 44,0 | 26,2 | 61,9 | 52,8 | 34,9 | 70,8 | 3,1 | 0,0 | 6,4 | . | . | . | 63 |
| 80+ ans | 54,9 | 33,3 | 76,6 | 44,7 | 23,0 | 66,3 | . | . | . | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 47 |
| Scolarité obligatoire | 57,0 | 41,4 | 72,5 | 38,9 | 23,4 | 54,5 | 4,1 | 0,0 | 8,3 | . | . | . | 72 |
| Secondaire II | 54,6 | 45,1 | 64,1 | 43,4 | 33,9 | 52,8 | 2,0 | 0,0 | 4,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 221 |
| Tertiaire | 44,5 | 28,9 | 60,0 | 48,2 | 32,6 | 63,8 | 7,4 | 0,0 | 14,7 | . | . | . | 90 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 53,2 | 44,3 | 62,0 | 44,5 | 35,6 | 53,4 | 2,4 | 0,6 | 4,1 | . | . | . | 272 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 54,9 | 41,8 | 67,9 | 40,3 | 27,4 | 53,2 | 4,7 | 0,0 | 10,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 112 |
| Né en Suisse | 52,5 | 43,8 | 61,1 | 44,9 | 36,2 | 53,5 | 2,6 | 0,0 | 5,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 264 |
| Né à l'étranger | 58,0 | 44,6 | 71,5 | 37,2 | 23,9 | 50,5 | 4,8 | 0,8 | 8,7 | . | . | . | 120 |
| Medical Home | 59,9 | 47,4 | 72,4 | 40,1 | 27,6 | 52,6 | . | . | . | . | . | . | 130 |
| Sans Medical Home | 56,6 | 41,0 | 72,2 | 38,1 | 22,6 | 53,6 | 5,0 | 0,6 | 9,5 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 88 |
| Malade | 56,6 | 43,8 | 69,4 | 42,7 | 29,9 | 55,4 | 0,7 | 0,0 | 2,2 | . | . | . | 120 |
| Non-malade | 52,6 | 43,5 | 61,8 | 42,9 | 33,9 | 52,0 | 4,4 | 1,1 | 7,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 258 |
| Malade avec Medical Home | 69,1 | 50,0 | 88,3 | 30,9 | 11,7 | 50,0 | . | . | . | . | . | . | 49 |
| Malade sans Medical Home | 66,5 | 42,2 | 90,7 | 33,5 | 9,3 | 57,8 | . | . | . | . | . | . | 29 |
| Ville | 55,7 | 43,3 | 68,0 | 40,9 | 28,6 | 53,2 | 3,4 | 0,0 | 8,7 | . | . | . | 145 |
| Agglomération | 51,4 | 39,8 | 63,0 | 46,1 | 34,5 | 57,6 | 2,4 | 0,3 | 4,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 171 |
| Zone rurale | 56,9 | 40,2 | 73,7 | 38,2 | 21,7 | 54,7 | 4,9 | 0,0 | 10,1 | . | . | . | 49 |
| Suisse alémanique | 50,9 | 40,8 | 61,0 | 47,0 | 36,9 | 57,1 | 2,1 | 0,0 | 4,9 | . | . | . | 109 |
| Suisse romande | 62,3 | 53,1 | 71,4 | 33,8 | 24,9 | 42,7 | 3,7 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 224 |
| Suisse italienne | 53,0 | 38,7 | 67,3 | 36,8 | 22,8 | 50,8 | 10,2 | 1,4 | 18,9 | . | . | . | 51 |
| ZH | 55,4 | 38,7 | 72,0 | 44,6 | 28,0 | 61,3 | . | . | . | . | . | . | 38 |
| CH sans ZH | 53,4 | 45,2 | 61,6 | 42,8 | 34,7 | 50,9 | 3,7 | 1,1 | 6,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 346 |
| VD | 66,7 | 50,8 | 82,5 | 28,1 | 13,1 | 43,1 | 5,2 | 0,0 | 12,9 | . | . | . | 36 |
| CH sans VD | 52,6 | 44,7 | 60,5 | 44,4 | 36,6 | 52,3 | 2,9 | 0,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 348 |
| VS | 52,6 | 30,6 | 74,6 | 43,7 | 21,5 | 65,9 | 3,7 | 0,0 | 11,1 | . | . | . | 25 |
| CH sans VS | 53,8 | 46,2 | 61,3 | 43,1 | 35,6 | 50,6 | 3,1 | 0,8 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 359 |
| GE | 61,5 | 53,1 | 69,9 | 35,0 | 26,8 | 43,2 | 2,8 | 0,0 | 5,7 | 0,7 | 0,0 | 1,9 | 150 |
| CH sans GE | 53,2 | 45,3 | 61,0 | 43,7 | 35,8 | 51,5 | 3,1 | 0,7 | 5,5 | . | . | . | 234 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.218 Discussion concernant la consommation de cigarettes ou de tabac, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'a pas consulté de médecin ces deux dernières années | | | Échantillon | n |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|-------------|---|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | |
| Total | 53,1 | 42,5 | 63,7 | 43,3 | 32,8 | 53,7 | 3,6 | 0,4 | 6,8 | 145 | |
| Homme | 52,5 | 38,4 | 66,6 | 42,4 | 28,8 | 56,0 | 5,1 | 0,0 | 10,4 | 87 | |
| Femme | 53,9 | 37,5 | 70,3 | 44,3 | 27,9 | 60,6 | 1,8 | 0,0 | 4,9 | 58 | |
| 65-69 ans | 67,4 | 53,7 | 81,2 | 27,7 | 14,9 | 40,5 | 4,9 | 0,0 | 10,4 | 65 | |
| 70-74 ans | 43,2 | 22,2 | 64,1 | 54,1 | 33,3 | 74,9 | 2,7 | 0,0 | 8,1 | 42 | |
| 75-79 ans | 33,5 | 9,1 | 57,9 | 66,5 | 42,1 | 90,9 | . | . | . | 20 | |
| 80+ ans | 49,8 | 19,7 | 79,9 | 45,2 | 15,3 | 75,0 | 5,1 | 0,0 | 15,1 | 18 | |
| Scolarité obligatoire | 69,2 | 43,7 | 94,7 | 30,8 | 5,3 | 56,3 | . | . | . | 22 | |
| Secondaire II | 51,0 | 38,1 | 63,9 | 44,4 | 31,7 | 57,1 | 4,6 | 0,2 | 9,0 | 89 | |
| Tertiaire | 40,6 | 21,8 | 59,4 | 55,2 | 36,1 | 74,4 | 4,2 | 0,0 | 12,4 | 33 | |
| Revenu sup. à la moyenne | 55,5 | 34,5 | 76,5 | 41,1 | 20,4 | 61,9 | 3,3 | 0,0 | 9,9 | 30 | |
| Revenu dans la moyenne | 55,9 | 29,5 | 82,3 | 38,1 | 13,1 | 63,2 | 6,0 | 0,0 | 15,8 | 28 | |
| Revenu inf. à la moyenne | 52,9 | 39,1 | 66,8 | 44,4 | 30,7 | 58,1 | 2,7 | 0,0 | 6,5 | 81 | |
| Né en Suisse | 52,5 | 40,6 | 64,4 | 45,0 | 33,2 | 56,8 | 2,5 | 0,0 | 5,4 | 115 | |
| Né à l'étranger | 56,1 | 32,9 | 79,4 | 35,3 | 14,4 | 56,2 | 8,5 | 0,0 | 20,2 | 30 | |
| Ville | 39,1 | 19,4 | 58,9 | 55,2 | 35,0 | 75,4 | 5,7 | 0,0 | 15,2 | 37 | |
| Agglomération | 53,9 | 39,1 | 68,8 | 42,3 | 27,5 | 57,0 | 3,8 | 0,0 | 8,2 | 75 | |
| Zone rurale | 62,2 | 42,1 | 82,3 | 36,1 | 16,4 | 55,9 | 1,7 | 0,0 | 5,0 | 33 | |
| Medical Home | 65,4 | 47,8 | 82,9 | 34,6 | 17,1 | 52,2 | . | . | . | 45 | |
| Sans Medical Home | 36,5 | 8,0 | 64,9 | 51,9 | 24,4 | 79,4 | 11,6 | 0,0 | 26,7 | 26 | |
| Malade | 70,5 | 52,2 | 88,9 | 27,5 | 9,5 | 45,5 | 2,0 | 0,0 | 5,9 | 37 | |
| Non-malade | 47,2 | 34,8 | 59,6 | 48,7 | 36,4 | 60,9 | 4,2 | 0,1 | 8,2 | 108 | |
| Malade avec Medical Home | 71,3 | 44,6 | 98,0 | 28,7 | 2,0 | 55,4 | . | . | . | 14 | |
| Malade sans Medical Home | 40,1 | 0,1 | 80,0 | 59,9 | 20,0 | 99,9 | . | . | . | 7 | |
| Suisse alémanique | 53,6 | 40,0 | 67,1 | 43,8 | 30,4 | 57,1 | 2,7 | 0,0 | 5,9 | 79 | |
| Suisse romande | 50,2 | 32,4 | 67,9 | 43,1 | 24,9 | 61,4 | 6,7 | 0,0 | 15,9 | 46 | |
| Suisse italienne | 60,3 | 35,3 | 85,2 | 36,4 | 11,5 | 61,3 | 3,3 | 0,0 | 10,0 | 20 | |
| VD | 63,6 | 37,9 | 89,4 | 36,4 | 10,6 | 62,1 | . | . | . | 20 | |
| CH sans VD | 52,4 | 41,0 | 63,7 | 43,8 | 32,6 | 54,9 | 3,9 | 0,4 | 7,3 | 125 | |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1488 : Au cours des deux dernières années, avez-vous fait l'objet d'une détresse émotionnelle comme l'anxiété ou une grande tristesse que vous avez trouvée difficile à gérer par vous-même ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.219 Sentiment de détresse émotionnelle, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| AU | 26,6 | 23,6 | 29,6 | 72,2 | 69,0 | 75,3 | 1,2 | 0,3 | 2,2 | 2500 |
| NL | 20,3 | 17,2 | 23,3 | 79,4 | 76,4 | 82,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 750 |
| DE | 19,5 | 16,3 | 22,7 | 80,2 | 77,0 | 83,4 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 751 |
| CA | 19,0 | 17,6 | 20,5 | 80,2 | 78,7 | 81,6 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 4549 |
| UK | 19,0 | 16,0 | 22,1 | 80,1 | 76,9 | 83,2 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 753 |
| US | 19,0 | 16,3 | 21,8 | 79,4 | 76,6 | 82,2 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 1392 |
| CH | 15,7 | 13,9 | 17,5 | 84,1 | 82,3 | 85,9 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| NZ | 15,6 | 11,9 | 19,3 | 83,8 | 80,1 | 87,6 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 500 |
| NO | 14,8 | 11,6 | 17,9 | 85,0 | 81,9 | 88,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 750 |
| FR | 12,0 | 9,4 | 14,6 | 87,7 | 85,1 | 90,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 750 |
| SE | 10,5 | 9,6 | 11,4 | 88,8 | 87,9 | 89,7 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 7000 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.220 Sentiment de détresse émotionnelle, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 15,7 | 13,9 | 17,5 | 84,1 | 82,3 | 85,9 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| Homme | 9,1 | 7,0 | 11,2 | 90,9 | 88,8 | 93,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1526 |
| Femme | 21,0 | 18,3 | 23,8 | 78,7 | 75,9 | 81,4 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1712 |
| 65–69 ans | 16,3 | 12,7 | 19,9 | 83,7 | 80,1 | 87,3 | . | . | . | 828 |
| 70–74 ans | 13,5 | 10,5 | 16,5 | 86,3 | 83,3 | 89,3 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 954 |
| 75–79 ans | 15,3 | 11,3 | 19,2 | 84,6 | 80,7 | 88,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 697 |
| 80+ ans | 17,7 | 13,8 | 21,6 | 81,9 | 78 | 85,8 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 20,5 | 16,4 | 24,7 | 79,3 | 75,1 | 83,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 706 |
| Secondaire II | 14,8 | 12,5 | 17,1 | 85,1 | 82,8 | 87,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1765 |
| Tertiaire | 11,8 | 8,4 | 15,2 | 88,1 | 84,7 | 91,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 13,9 | 11,9 | 15,9 | 86,0 | 84,0 | 88,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 21,1 | 17,1 | 25,1 | 78,5 | 74,6 | 82,5 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 807 |
| Né en Suisse | 15,1 | 13,0 | 17,1 | 84,7 | 82,7 | 86,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2217 |
| Né à l'étranger | 18,2 | 14,4 | 22,0 | 81,8 | 78,0 | 85,6 | . | . | . | 1015 |
| Medical Home | 17,4 | 14,4 | 20,4 | 82,6 | 79,5 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1249 |
| Sans Medical Home | 16,0 | 12,0 | 20,0 | 83,8 | 79,8 | 87,8 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 726 |
| Malade | 22,7 | 18,8 | 26,6 | 77,1 | 73,2 | 81,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 948 |
| Non-malade | 12,6 | 10,6 | 14,6 | 87,2 | 85,2 | 89,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 26,0 | 20,1 | 31,8 | 74,0 | 68,2 | 79,9 | . | . | . | 463 |
| Malade sans Medical Home | 18,9 | 11,5 | 26,4 | 80,2 | 72,6 | 87,8 | 0,9 | 0,0 | 2,5 | 210 |
| Ville | 15,7 | 12,4 | 19,0 | 84,0 | 80,7 | 87,3 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1026 |
| Agglomération | 15,9 | 13,3 | 18,6 | 84,0 | 81,3 | 86,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1643 |
| Zone rurale | 15,5 | 11,3 | 19,7 | 84,4 | 80,2 | 88,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 454 |
| Suisse alémanique | 14,8 | 12,4 | 17,1 | 85,1 | 82,7 | 87,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1040 |
| Suisse romande | 19,7 | 17,0 | 22,3 | 80,0 | 77,4 | 82,6 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1869 |
| Suisse italienne | 11,0 | 7,5 | 14,4 | 88,7 | 85,2 | 92,2 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 329 |
| ZH | 12,3 | 8,6 | 16,0 | 87,2 | 83,5 | 90,9 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 332 |
| CH sans ZH | 16,4 | 14,4 | 18,5 | 83,5 | 81,4 | 85,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2906 |
| VD | 20,0 | 15,3 | 24,6 | 79,9 | 75,2 | 84,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 15,3 | 13,4 | 17,2 | 84,5 | 82,6 | 86,4 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2914 |
| VS | 18,9 | 14,1 | 23,8 | 80,6 | 75,8 | 85,5 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 321 |
| CH sans VS | 15,6 | 13,7 | 17,5 | 84,3 | 82,4 | 86,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2917 |
| GE | 19,9 | 17,4 | 22,4 | 79,9 | 77,4 | 82,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1160 |
| CH sans GE | 15,5 | 13,6 | 17,4 | 84,3 | 82,4 | 86,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1490 : Quand vous vous sentiez ainsi, aviez-vous la possibilité d'obtenir une aide professionnelle ?

Base : Répondants ayant fait l'objet d'une détresse émotionnelle.
Tableau 6.221 Aide professionnelle reçue en cas de sentiment de détresse émotionnelle, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non, je ne voulais pas d'aide professionnelle | | | Non, ce n'était pas possible ou je n'en n'avais pas les moyens financiers | | | Pas de professionnel disponible à proximité de la maison ou du travail | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|-------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| NO | 57,7 | 46,4 | 69,1 | 24,9 | 15,0 | 34,9 | 13,1 | 5,6 | 20,6 | 1,4 | 0,0 | 3,6 | 2,9 | 0,0 | 6,4 | 96 |
| NL | 54,0 | 45,7 | 62,3 | 43,9 | 35,7 | 52,2 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 161 |
| US | 52,6 | 44,7 | 60,6 | 34,6 | 27,1 | 42,0 | 10,6 | 5,0 | 16,2 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 247 |
| CA | 46,8 | 42,5 | 51,0 | 40,5 | 36,4 | 44,6 | 9,0 | 6,5 | 11,4 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 2,9 | 1,7 | 4,0 | 939 |
| DE | 46,3 | 37,1 | 55,4 | 42,9 | 33,9 | 51,9 | 4,4 | 1,0 | 7,9 | 2,2 | 0,0 | 4,6 | 4,2 | 0,6 | 7,8 | 145 |
| SE | 43,8 | 39,3 | 48,3 | 38,3 | 33,9 | 42,6 | 11,8 | 8,8 | 14,8 | 1,9 | 0,7 | 3,1 | 4,2 | 2,3 | 6,1 | 725 |
| UK | 43,8 | 34,9 | 52,6 | 43,4 | 34,6 | 52,1 | 8,9 | 3,0 | 14,8 | 0,6 | 0,0 | 1,8 | 3,3 | 0,0 | 6,8 | 152 |
| FR | 43,6 | 32,1 | 55,1 | 49,2 | 37,6 | 60,7 | 5,6 | 1,0 | 10,1 | 0,8 | 0,0 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 85 |
| NZ | 37,5 | 25,3 | 49,8 | 56,6 | 44,0 | 69,2 | 2,9 | 0,0 | 7,1 | . | . | . | 3,0 | 0,0 | 6,3 | 77 |
| CH | 36,8 | 31,0 | 42,6 | 55,9 | 49,8 | 62,0 | 4,1 | 1,9 | 6,4 | 2,7 | 0,5 | 4,9 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 537 |
| AU | 28,4 | 23,3 | 33,4 | 57,5 | 51,6 | 63,4 | 10,3 | 7,0 | 13,6 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 1,6 | 5,5 | 683 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.222 Aide professionnelle reçue en cas de sentiment de détresse émotionnelle, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | Non, je ne voulais pas d'aide professionnelle | | Non, ce n'était pas possible ou je n'en n'avais pas les moyens financiers | | Pas de professionnel disponible à proximité de la maison ou du travail | | NSP/NR | | Échantillon n | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------|---|-------------|---|----------------|--|----------------|----------------|------------|------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | | IC limite inf. | | | | |
| Total | 36,8 | 31,0 | 42,6 | 55,9 | 49,8 | 62,0 | 4,1 | 1,9 | 6,4 | 2,7 | 0,5 | 4,9 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 537 |
| Homme | 33,2 | 21,9 | 44,5 | 58,0 | 46,0 | 70,0 | 3,3 | 0,3 | 6,3 | 5,5 | 0,0 | 12,1 | . | . | . | 151 |
| Femme | 38,1 | 31,3 | 44,8 | 55,2 | 48,2 | 62,2 | 4,4 | 1,5 | 7,2 | 1,7 | 0,0 | 3,6 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 386 |
| 65–69 ans | 40,7 | 29,0 | 52,4 | 47,8 | 35,6 | 59,9 | 4,0 | 0,7 | 7,4 | 7,2 | 0,2 | 14,3 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 139 |
| 70–74 ans | 40,9 | 29,6 | 52,2 | 54,8 | 43,2 | 66,4 | 3,6 | 0,0 | 8,3 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | . | . | . | 157 |
| 75–79 ans | 33,7 | 20,7 | 46,6 | 57,9 | 44,1 | 71,6 | 4,8 | 0,0 | 10,6 | 1,8 | 0,0 | 4,5 | 1,9 | 0,0 | 5,5 | 109 |
| 80+ ans | 31,9 | 21,1 | 42,7 | 63,9 | 52,7 | 75,1 | 4,1 | 0,0 | 8,6 | . | . | . | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 132 |
| Scolarité obligatoire | 35,3 | 24,8 | 45,7 | 55,7 | 44,5 | 66,8 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 5,1 | 0,0 | 10,8 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 151 |
| Secondaire II | 37,7 | 29,8 | 45,5 | 57,6 | 49,6 | 65,6 | 4,3 | 1,3 | 7,2 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 271 |
| Tertiaire | 35,9 | 21,7 | 50,2 | 45,9 | 30,7 | 61,1 | 8,6 | 0,0 | 18,6 | 9,5 | 0,0 | 22,8 | . | . | . | 113 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 36,3 | 29,0 | 43,6 | 59,3 | 51,8 | 66,8 | 2,6 | 0,7 | 4,5 | 1,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 366 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 37,8 | 28,0 | 47,5 | 49,6 | 39,0 | 60,1 | 7,0 | 1,6 | 12,4 | 4,3 | 0,0 | 9,4 | 1,3 | 0,0 | 3,6 | 171 |
| Né en Suisse | 36,9 | 30,0 | 43,7 | 57,1 | 50,0 | 64,3 | 4,0 | 1,2 | 6,8 | 1,5 | 0,0 | 3,3 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 330 |
| Né à l'étranger | 36,4 | 25,4 | 47,4 | 52,4 | 40,8 | 64,0 | 4,5 | 1,3 | 7,7 | 6,2 | 0,0 | 13,2 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 206 |
| Medical Home | 48,5 | 38,9 | 58,1 | 48,9 | 39,3 | 58,6 | 2,0 | 0,0 | 4,6 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | . | . | . | 223 |
| Sans Medical Home | 25,8 | 15,4 | 36,2 | 60,6 | 48,1 | 73,1 | 12,8 | 4,4 | 21,3 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | . | . | . | 140 |
| Malade | 42,8 | 33,1 | 52,4 | 50,4 | 40,6 | 60,3 | 3,6 | 0,3 | 6,8 | 3,2 | 0,0 | 6,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 211 |
| Non-malade | 31,5 | 23,9 | 39,0 | 61,9 | 53,8 | 69,9 | 3,4 | 0,7 | 6,2 | 2,4 | 0,0 | 5,5 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 303 |
| Malade avec Medical Home | 50,8 | 37,5 | 64,1 | 45,5 | 32,2 | 58,9 | 2,9 | 0,0 | 7,7 | 0,7 | 0,0 | 2,1 | . | . | . | 108 |
| Malade sans Medical Home | 34,9 | 16,5 | 53,4 | 55,2 | 34,9 | 75,5 | 8,1 | 0,0 | 17,9 | 1,8 | 0,0 | 4,5 | . | . | . | 56 |
| Ville | 36,2 | 25,5 | 47,0 | 55,6 | 44,4 | 66,9 | 5,1 | 1,2 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 7,7 | . | . | . | 176 |
| Agglomération | 36,5 | 28,1 | 44,8 | 58,1 | 49,3 | 66,8 | 3,4 | 0,3 | 6,5 | 1,8 | 0,0 | 4,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 278 |
| Zone rurale | 34,3 | 20,3 | 48,2 | 53,4 | 38,5 | 68,2 | 5,6 | 0,0 | 12,2 | 4,9 | 0,0 | 11,5 | 1,9 | 0,0 | 5,7 | 64 |
| Suisse alémanique | 33,7 | 25,7 | 41,7 | 60,0 | 51,6 | 68,5 | 3,4 | 0,4 | 6,5 | 2,9 | 0,0 | 6,1 | . | . | . | 142 |
| Suisse romande | 42,3 | 34,9 | 49,7 | 48,5 | 41,0 | 56,0 | 5,0 | 1,8 | 8,1 | 2,6 | 0,4 | 4,8 | 1,7 | 0,0 | 4,2 | 358 |
| Suisse italienne | 47,4 | 30,6 | 64,2 | 43,5 | 26,7 | 60,3 | 9,1 | 0,2 | 18,0 | . | . | . | . | . | . | 37 |
| ZH | 59,3 | 43,3 | 75,2 | 40,7 | 24,8 | 56,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 |
| CH sans ZH | 33,4 | 27,1 | 39,6 | 58,2 | 51,7 | 64,8 | 4,7 | 2,1 | 7,3 | 3,1 | 0,5 | 5,6 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 497 |
| VD | 49,1 | 36,0 | 62,2 | 46,7 | 33,6 | 59,8 | 1,9 | 0,0 | 5,6 | 2,3 | 0,0 | 5,6 | . | . | . | 61 |
| CH sans VD | 35,3 | 29,0 | 41,6 | 57,0 | 50,4 | 63,7 | 4,4 | 1,9 | 6,9 | 2,7 | 0,3 | 5,2 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 476 |
| VS | 38,4 | 24,4 | 52,5 | 58,0 | 43,8 | 72,2 | 1,9 | 0,0 | 5,6 | 1,7 | 0,0 | 4,9 | . | . | . | 54 |
| CH sans VS | 36,7 | 30,7 | 42,8 | 55,8 | 49,4 | 62,2 | 4,2 | 1,9 | 6,6 | 2,7 | 0,4 | 5,1 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 483 |
| GE | 37,4 | 30,5 | 44,3 | 49,5 | 42,4 | 56,6 | 8,9 | 5,0 | 12,9 | 2,6 | 0,0 | 5,3 | 1,5 | 0,0 | 3,3 | 224 |
| CH sans GE | 36,8 | 30,6 | 43,0 | 56,4 | 49,9 | 62,9 | 3,8 | 1,3 | 6,2 | 2,7 | 0,3 | 5,1 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 313 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1495 : Si vous deviez tomber très malade ou être grièvement blessé/e et que vous ne puissiez plus prendre de décisions pour vous, avez-vous parlé avec votre famille, un ami proche ou un professionnel de la santé des traitements que vous voulez ou ne voulez pas recevoir ?

Question Q1496 : Avez-vous un document écrit décrivant les soins médicaux que vous voulez ou ne voulez pas à la fin de votre vie ?

Question Q1497 : Avez-vous un document écrit qui désigne quelqu'un pour prendre des décisions concernant vos soins dans le cas où vous ne pourriez pas les prendre vous-même ?

Base (q1495-q1497) : Tous les répondants.

Question Q1499 : Êtes-vous membre d'une organisation pour l'autodétermination de fin de vie comme Exit ou Dignitas ?

Base : Tous les répondants pour la Suisse.

Tableau 6.223 Désirs en matière de soins de fin de vie, comparaison internationale (2017, en %)

| Informé la famille, des amis proches ou un professionnel de la santé sur les choix de fin de vie | | | | Document écrit décrivant les choix de fin de vie | | | | Représentant légal désigné par un document écrit | | | | Échantillon |
|--|------------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 75,9 | 72,8 | 78,9 | DE | 62,1 | 58,2 | 65,9 | DE | 67,5 | 63,8 | 71,3 | 751 |
| DE | 68,9 | 65,2 | 72,6 | US | 53,1 | 49,7 | 56,6 | US | 64,5 | 61,1 | 67,8 | 1392 |
| CA | 65,6 | 63,6 | 67,5 | CA | 43,0 | 41,1 | 44,9 | CA | 62,6 | 60,6 | 64,6 | 4549 |
| AU | 62,0 | 58,4 | 65,7 | CH | 35,7 | 33,3 | 38,0 | AU | 49,0 | 45,1 | 52,8 | 2500 |
| CH | 60,4 | 58,0 | 62,7 | AU | 33,3 | 29,6 | 37,0 | CH | 36,7 | 34,3 | 39,1 | 3238 |
| NL | 47,1 | 43,3 | 51,0 | NZ | 18,2 | 14,2 | 22,2 | NZ | 32,9 | 28,0 | 37,8 | 500 |
| NZ | 39,0 | 33,9 | 44,1 | NL | 16,1 | 13,2 | 18,9 | UK | 32,0 | 28,3 | 35,7 | 753 |
| UK | 39,0 | 35,1 | 42,9 | UK | 15,0 | 12,1 | 17,8 | FR | 18,1 | 15,0 | 21,1 | 750 |
| FR | 30,0 | 26,4 | 33,6 | FR | 13,2 | 10,4 | 15,9 | NL | 18,1 | 15,1 | 21,0 | 750 |
| SE | 28,7 | 27,4 | 30,0 | SE | 5,5 | 4,8 | 6,2 | SE | 6,7 | 6,0 | 7,5 | 7000 |
| NO | 22,3 | 18,8 | 25,9 | NO | 4,1 | 2,3 | 5,8 | NO | 6,5 | 4,4 | 8,7 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.224 Désirs en matière de soins de fin de vie, comparaison internationale (2014, en %)

| Informé la famille, des amis proches ou un professionnel de la santé sur les choix de fin de vie | | | | Document écrit décrivant les choix de fin de vie | | | | Représentant légal désigné par un document écrit | | | | Échantillon |
|--|------------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Pays | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 77,4 | 74,2 | 80,6 | DE | 57,5 | 52,2 | 62,7 | US | 67,1 | 63,5 | 70,8 | 1116 |
| DE | 71,6 | 66,9 | 76,4 | US | 55,0 | 51,3 | 58,8 | CA | 60,9 | 58,5 | 63,2 | 3147 |
| CA | 65,3 | 63,0 | 67,6 | CA | 45,7 | 43,3 | 48,1 | DE | 57,2 | 51,9 | 62,4 | 547 |
| AU | 58,3 | 52,9 | 63,8 | AU | 30,0 | 24,5 | 35,5 | AU | 51,1 | 45,5 | 56,8 | 1670 |
| CH | 54,2 | 50,6 | 57,9 | CH | 24,9 | 21,6 | 28,3 | UK | 44,2 | 39,3 | 49,0 | 581 |
| NZ | 43,4 | 36,5 | 50,3 | NZ | 22,8 | 16,9 | 28,7 | NZ | 37,8 | 31,2 | 44,4 | 379 |
| NL | 42,3 | 37,2 | 47,4 | UK | 19,0 | 15,3 | 22,6 | CH | 27,5 | 24,1 | 30,9 | 1084 |
| UK | 38,2 | 33,5 | 42,9 | NL | 15,4 | 11,6 | 19,2 | FR | 16,2 | 13,2 | 19,2 | 860 |
| SE | 29,8 | 28,0 | 31,5 | SE | 5,2 | 4,4 | 6,1 | NL | 15,9 | 12,0 | 19,8 | 582 |
| NO | 20,3 | 16,6 | 23,9 | FR | 5,1 | 3,3 | 6,9 | SE | 7,8 | 6,8 | 8,8 | 5000 |
| FR | 12,4 | 9,8 | 15,1 | NO | 3,9 | 2,2 | 5,6 | NO | 6,1 | 3,9 | 8,3 | 651 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.225 Désirs en matière de soins de fin de vie, Suisse (2017, en %)

| | Informé la famille, des amis proches ou un professionnel de la santé sur les choix de fin de vie | | | Document écrit décrivant les choix de fin de vie | | | Représentant légal désigné par un document écrit | | | Membre d'une organisation pour l'autodétermination de fin de vie | | | Échantillon n |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 60,4 | 58,0 | 62,7 | 35,7 | 33,3 | 38,0 | 36,7 | 34,3 | 39,1 | 6,6 | 5,4 | 7,9 | 3238 |
| Homme | 55,3 | 51,7 | 58,8 | 30,0 | 26,6 | 33,4 | 31,9 | 28,5 | 35,3 | 6,4 | 4,7 | 8,2 | 1526 |
| Femme | 64,5 | 61,3 | 67,6 | 40,1 | 36,8 | 43,5 | 40,5 | 37,2 | 43,9 | 6,8 | 5,1 | 8,5 | 1712 |
| 65–69 ans | 54,1 | 49,4 | 58,9 | 25,7 | 21,4 | 30,0 | 24,6 | 20,4 | 28,9 | 4,6 | 2,5 | 6,6 | 828 |
| 70–74 ans | 56,5 | 52,0 | 61,1 | 34,8 | 30,2 | 39,4 | 35,2 | 30,6 | 39,8 | 6,9 | 4,5 | 9,4 | 954 |
| 75–79 ans | 60,5 | 55,3 | 65,7 | 35,6 | 30,4 | 40,8 | 38,5 | 33,2 | 43,8 | 7,9 | 5,1 | 10,7 | 697 |
| 80+ ans | 71,3 | 67,0 | 75,6 | 47,9 | 42,8 | 53,0 | 50,4 | 45,4 | 55,4 | 7,6 | 4,9 | 10,3 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 51,6 | 46,5 | 56,7 | 26,7 | 21,9 | 31,5 | 27,7 | 22,9 | 32,5 | 3,1 | 1,4 | 4,8 | 706 |
| Secondaire II | 64,2 | 61,2 | 67,2 | 38,3 | 35,1 | 41,4 | 39,6 | 36,4 | 42,7 | 7,7 | 6,0 | 9,4 | 1765 |
| Tertiaire | 59,1 | 53,7 | 64,5 | 39,3 | 33,8 | 44,8 | 39,8 | 34,3 | 45,3 | 7,9 | 4,8 | 10,9 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 61,1 | 58,3 | 63,8 | 36,4 | 33,6 | 39,2 | 38,3 | 35,5 | 41,2 | 7,3 | 5,8 | 8,8 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 58,4 | 53,7 | 63,1 | 33,4 | 28,7 | 38,2 | 31,9 | 27,3 | 36,5 | 4,8 | 2,7 | 6,8 | 807 |
| Né en Suisse | 63,6 | 60,9 | 66,3 | 39,1 | 36,3 | 41,9 | 40,4 | 37,6 | 43,2 | 6,5 | 5,1 | 7,9 | 2217 |
| Né à l'étranger | 49,1 | 44,2 | 54,0 | 23,0 | 18,6 | 27,4 | 23,2 | 18,9 | 27,6 | 7,2 | 4,3 | 10,1 | 1015 |
| Medical Home | 65,3 | 61,6 | 69,0 | 39,5 | 35,6 | 43,5 | 40,2 | 36,3 | 44,1 | 7,2 | 5,1 | 9,3 | 1249 |
| Sans Medical Home | 49,2 | 43,6 | 54,7 | 25,0 | 19,9 | 30,0 | 28,5 | 23,2 | 33,8 | 6,8 | 4,1 | 9,5 | 726 |
| Malade | 60,1 | 55,6 | 64,5 | 34,9 | 30,4 | 39,4 | 35,0 | 30,5 | 39,5 | 6,7 | 4,4 | 9,0 | 948 |
| Non-malade | 60,8 | 57,9 | 63,6 | 36,3 | 33,4 | 39,3 | 37,6 | 34,7 | 40,6 | 6,7 | 5,2 | 8,3 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 65,1 | 59,0 | 71,2 | 37,6 | 31,1 | 44,1 | 38,3 | 31,8 | 44,8 | 8,1 | 4,4 | 11,9 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 48,2 | 37,4 | 59,1 | 22,7 | 13,3 | 32,0 | 21,7 | 12,3 | 31,0 | 3,8 | 0,6 | 7,1 | 210 |
| Ville | 59,1 | 54,7 | 63,5 | 35,1 | 30,6 | 39,6 | 37,5 | 33,0 | 42,1 | 8,2 | 5,5 | 11,0 | 1026 |
| Agglomération | 61,6 | 58,2 | 65,0 | 36,0 | 32,5 | 39,5 | 37,3 | 33,8 | 40,8 | 7,2 | 5,3 | 9,0 | 1643 |
| Zone rurale | 60,2 | 54,7 | 65,7 | 36,0 | 30,4 | 41,6 | 33,0 | 27,6 | 38,5 | 4,5 | 2,2 | 6,8 | 454 |
| Suisse alémanique | 64,4 | 61,2 | 67,5 | 43,6 | 40,4 | 46,9 | 44,6 | 41,4 | 47,9 | 7,1 | 5,5 | 8,8 | 1040 |
| Suisse romande | 52,1 | 48,8 | 55,4 | 16,2 | 13,7 | 18,6 | 18,2 | 15,6 | 20,8 | 6,2 | 4,7 | 7,7 | 1869 |
| Suisse italienne | 46,1 | 40,6 | 51,7 | 19,1 | 14,7 | 23,4 | 16,5 | 12,4 | 20,5 | 2,3 | 0,7 | 3,8 | 329 |
| ZH | 63,1 | 57,7 | 68,5 | 41,2 | 35,8 | 46,7 | 43,1 | 37,6 | 48,6 | 9,8 | 6,6 | 13,0 | 332 |
| CH sans ZH | 59,8 | 57,2 | 62,4 | 34,5 | 31,9 | 37,2 | 35,4 | 32,7 | 38,0 | 6,0 | 4,6 | 7,3 | 2906 |
| VD | 51,6 | 45,9 | 57,3 | 15,9 | 11,8 | 20,0 | 17,8 | 13,5 | 22,2 | 7,0 | 4,2 | 9,7 | 324 |
| CH sans VD | 61,2 | 58,7 | 63,7 | 37,5 | 34,9 | 40,1 | 38,5 | 35,9 | 41,1 | 6,6 | 5,3 | 7,9 | 2914 |
| VS | 48,0 | 42,1 | 53,8 | 16,3 | 12,0 | 20,7 | 21,3 | 16,5 | 26,2 | 4,2 | 1,6 | 6,7 | 321 |
| CH sans VS | 60,9 | 58,5 | 63,4 | 36,5 | 34,0 | 39,0 | 37,4 | 34,9 | 39,9 | 6,8 | 5,5 | 8,0 | 2917 |
| GE | 49,4 | 46,3 | 52,5 | 14,1 | 12,0 | 16,3 | 15,9 | 13,7 | 18,1 | 7,6 | 6,0 | 9,2 | 1160 |
| CH sans GE | 61,0 | 58,5 | 63,5 | 36,9 | 34,4 | 39,4 | 37,9 | 35,4 | 40,4 | 6,6 | 5,3 | 7,9 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.226 Désirs en matière de soins de fin de vie, Suisse (2014, en %)

| | Informé la famille, des amis proches ou un professionnel de la santé sur les choix de fin de vie | | | Document écrit décrivant les choix de fin de vie | | | Représentant légal désigné par un document écrit | | | Membre d'une organisation pour l'autodétermination de fin de vie | | | Échantillon |
|--------------------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|-------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 54,2 | 50,6 | 57,9 | 24,9 | 21,6 | 28,3 | 27,5 | 24,0 | 30,9 | 5,0 | 3,3 | 6,7 | 1084 |
| Homme | 52,8 | 47,2 | 58,5 | 22,2 | 17,3 | 27,1 | 25,4 | 20,3 | 30,5 | 6,5 | 3,5 | 9,5 | 493 |
| Femme | 55,3 | 50,4 | 60,1 | 27,0 | 22,4 | 31,5 | 29,1 | 24,4 | 33,7 | 3,9 | 2,0 | 5,8 | 591 |
| 65-69 ans | 57,4 | 50,9 | 64,0 | 19,9 | 14,2 | 25,6 | 20,1 | 14,4 | 25,8 | 4,4 | 0,9 | 7,9 | 349 |
| 70-74 ans | 52,1 | 45,1 | 59,1 | 26,3 | 19,7 | 32,8 | 28,9 | 22,2 | 35,5 | 7,6 | 4,1 | 11,1 | 300 |
| 75-79 ans | 58,9 | 51,0 | 66,8 | 27,2 | 19,6 | 34,8 | 27,8 | 20,2 | 35,4 | 4,6 | 0,9 | 8,3 | 209 |
| 80+ ans | 48,3 | 40,3 | 56,4 | 27,5 | 20,3 | 34,8 | 34,7 | 26,9 | 42,4 | 3,6 | 1,0 | 6,2 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 50,1 | 41,6 | 58,5 | 20,3 | 13,2 | 27,4 | 23,3 | 15,8 | 30,7 | 1,1 | 0,0 | 2,6 | 216 |
| Secondaire II | 56,0 | 51,4 | 60,6 | 25,9 | 21,6 | 30,2 | 28,6 | 24,2 | 33,1 | 5,5 | 3,1 | 7,8 | 628 |
| Tertiaire | 52,6 | 44,2 | 61,1 | 28,5 | 21,0 | 36,0 | 29,4 | 21,9 | 37,0 | 9,6 | 5,1 | 14,1 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 62,6 | 54,2 | 71,1 | 29,2 | 20,8 | 37,6 | 30,6 | 22,3 | 39,0 | 12,0 | 6,2 | 17,9 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 54,2 | 45,6 | 62,8 | 24,6 | 16,4 | 32,9 | 29,8 | 21,3 | 38,3 | 6,2 | 2,5 | 9,8 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 53,8 | 49,1 | 58,6 | 25,6 | 21,3 | 29,9 | 27,1 | 22,7 | 31,5 | 3,6 | 1,5 | 5,7 | 645 |
| Né en Suisse | 53,6 | 49,5 | 57,7 | 26,6 | 22,9 | 30,3 | 28,9 | 25,1 | 32,7 | 5,0 | 3,1 | 7,0 | 863 |
| Né à l'étranger | 56,8 | 48,0 | 65,5 | 17,7 | 9,6 | 25,8 | 21,3 | 12,9 | 29,6 | 5,1 | 1,7 | 8,4 | 220 |
| Ville | 53,1 | 45,7 | 60,5 | 27,2 | 20,5 | 33,8 | 26,0 | 19,5 | 32,6 | 6,2 | 2,9 | 9,5 | 293 |
| Agglomération | 55,7 | 50,5 | 60,8 | 23,8 | 19,1 | 28,5 | 27,5 | 22,6 | 32,4 | 5,9 | 3,1 | 8,6 | 540 |
| Zone rurale | 52,6 | 45,0 | 60,1 | 24,7 | 17,7 | 31,7 | 29,0 | 21,7 | 36,3 | 2,2 | 0,2 | 4,2 | 251 |
| Medical Home | 63,1 | 57,3 | 68,9 | 32,4 | 26,3 | 38,5 | 33,7 | 27,6 | 39,9 | 7,5 | 3,7 | 11,4 | 392 |
| Sans Medical Home | 41,5 | 32,1 | 51,0 | 17,8 | 10,0 | 25,5 | 24,5 | 15,9 | 33,1 | 3,5 | 0,9 | 6,0 | 180 |
| Malade | 51,4 | 44,2 | 58,5 | 25,9 | 19,2 | 32,6 | 30,0 | 23,1 | 36,9 | 5,4 | 2,4 | 8,3 | 305 |
| Non-malade | 55,4 | 51,0 | 59,7 | 24,4 | 20,6 | 28,3 | 26,4 | 22,4 | 30,4 | 4,9 | 2,9 | 7,0 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 59,6 | 49,5 | 69,6 | 36,7 | 26,0 | 47,5 | 40,9 | 30,2 | 51,6 | 6,9 | 2,4 | 11,3 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 31,9 | 17,1 | 46,8 | 4,1 | 0,0 | 8,4 | 17,8 | 3,7 | 31,9 | 1,4 | 0,0 | 3,4 | 52 |
| Suisse alémanique | 59,2 | 54,5 | 63,9 | 30,1 | 25,6 | 34,5 | 31,9 | 27,3 | 36,4 | 5,2 | 3,0 | 7,4 | 551 |
| Suisse romande | 42,0 | 36,1 | 47,9 | 11,5 | 8,0 | 15,0 | 16,7 | 12,1 | 21,2 | 5,4 | 2,9 | 7,9 | 355 |
| Suisse italienne | 41,8 | 33,7 | 49,9 | 14,9 | 8,9 | 20,9 | 16,0 | 9,6 | 22,3 | 1,4 | 0,0 | 3,0 | 178 |
| VD | 43,1 | 35,0 | 51,1 | 12,0 | 7,2 | 16,9 | 18,9 | 12,7 | 25,1 | 6,1 | 2,1 | 10,0 | 178 |
| CH sans VD | 55,2 | 51,3 | 59,2 | 26,1 | 22,5 | 29,7 | 28,3 | 24,6 | 32,0 | 4,9 | 3,1 | 6,8 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question QSWISS3 : Au cours des douze derniers mois, lorsque vous aviez besoin de soins médicaux, un médecin ou un professionnel de la santé a-t-il déjà parlé avec vous de vos volontés concernant votre manière de mourir ou votre mort ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.227 Discussion avec le médecin sur les choix de fin de vie, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | N'a pas eu besoin de soins médicaux au cours des douze derniers mois | | | NSP/NR | | | Échan- tillon n |
|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 5,9 | 4,7 | 7,1 | 75,7 | 73,6 | 77,9 | 18,3 | 16,3 | 20,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 3238 |
| Homme | 4,0 | 2,7 | 5,4 | 78,6 | 75,5 | 81,6 | 17,3 | 14,4 | 20,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1526 |
| Femme | 7,4 | 5,6 | 9,2 | 73,5 | 70,4 | 76,6 | 19,0 | 16,2 | 21,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1712 |
| 65-69 ans | 3,2 | 1,4 | 5,0 | 75,9 | 71,7 | 80,2 | 20,9 | 16,8 | 24,9 | . | . | . | 828 |
| 70-74 ans | 5,4 | 3,1 | 7,6 | 74,0 | 69,7 | 78,3 | 20,6 | 16,6 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 954 |
| 75-79 ans | 4,3 | 2,3 | 6,2 | 79 | 74,6 | 83,4 | 16,5 | 12,3 | 20,6 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 697 |
| 80+ ans | 10,9 | 7,8 | 14 | 74,5 | 69,9 | 79 | 14,5 | 10,6 | 18,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 6,4 | 3,9 | 8,9 | 79,3 | 74,9 | 83,6 | 14,2 | 10,4 | 18,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 706 |
| Secondaire II | 5,9 | 4,4 | 7,5 | 75,0 | 72,1 | 77,9 | 19,1 | 16,4 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1765 |
| Tertiaire | 5,0 | 2,7 | 7,2 | 72,1 | 66,9 | 77,4 | 22,8 | 17,8 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 5,7 | 4,3 | 7,1 | 74,7 | 72,1 | 77,3 | 19,5 | 17,1 | 21,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 6,5 | 4,2 | 8,7 | 78,8 | 74,7 | 82,9 | 14,7 | 10,9 | 18,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 807 |
| Né en Suisse | 6,4 | 4,9 | 7,8 | 74,7 | 72,1 | 77,2 | 18,9 | 16,6 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2217 |
| Né à l'étranger | 4,2 | 2,3 | 6,1 | 79,8 | 75,6 | 84,0 | 15,9 | 11,9 | 19,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1015 |
| Medical Home | 7,8 | 5,6 | 10,0 | 80,5 | 77,2 | 83,8 | 11,5 | 8,8 | 14,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1249 |
| Sans Medical Home | 5,3 | 2,7 | 7,9 | 77,9 | 73,1 | 82,7 | 16,8 | 12,5 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 726 |
| Malade | 8,5 | 5,8 | 11,1 | 81,4 | 77,7 | 85,2 | 9,9 | 7,0 | 12,9 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 948 |
| Non-malade | 4,7 | 3,5 | 6,0 | 72,9 | 70,1 | 75,6 | 22,3 | 19,7 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 8,7 | 4,9 | 12,5 | 84,0 | 79,0 | 89,0 | 6,9 | 3,3 | 10,5 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 6,2 | 0,7 | 11,8 | 86,1 | 77,9 | 94,4 | 7,5 | 0,9 | 14,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 210 |
| Ville | 4,3 | 2,6 | 5,9 | 72,4 | 68,1 | 76,6 | 23,1 | 19,0 | 27,3 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1026 |
| Agglomération | 6,8 | 4,9 | 8,6 | 76,4 | 73,2 | 79,5 | 16,9 | 14,1 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1643 |
| Zone rurale | 6,0 | 3,2 | 8,7 | 79,5 | 74,7 | 84,2 | 14,5 | 10,3 | 18,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 454 |
| Suisse alémanique | 5,9 | 4,3 | 7,4 | 70,9 | 67,9 | 73,9 | 23,2 | 20,4 | 25,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1040 |
| Suisse romande | 5,8 | 4,3 | 7,4 | 87,8 | 85,6 | 90,1 | 6,3 | 4,6 | 7,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1869 |
| Suisse italienne | 6,3 | 3,7 | 9,0 | 84,9 | 80,9 | 88,9 | 8,1 | 5,1 | 11,2 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 329 |
| ZH | 6,2 | 3,5 | 8,9 | 69,7 | 64,6 | 74,9 | 23,8 | 19,0 | 28,6 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 332 |
| CH sans ZH | 5,8 | 4,5 | 7,1 | 77,0 | 74,6 | 79,4 | 17,1 | 14,9 | 19,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2906 |
| VD | 5,7 | 3,1 | 8,2 | 88,5 | 84,9 | 92,0 | 5,7 | 3,1 | 8,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 324 |
| CH sans VD | 5,9 | 4,6 | 7,2 | 74,5 | 72,2 | 76,9 | 19,4 | 17,3 | 21,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2914 |
| VS | 4,8 | 2,5 | 7,1 | 84,3 | 80,0 | 88,6 | 10,9 | 7,1 | 14,7 | . | . | . | 321 |
| CH sans VS | 5,9 | 4,7 | 7,2 | 75,4 | 73,1 | 77,6 | 18,6 | 16,5 | 20,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2917 |
| GE | 5,7 | 4,3 | 7,0 | 88,3 | 86,4 | 90,3 | 5,9 | 4,5 | 7,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1160 |
| CH sans GE | 5,9 | 4,7 | 7,1 | 75,0 | 72,7 | 77,3 | 19,0 | 16,9 | 21,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1530 : Quel modèle d'assurance-maladie avez-vous personnellement pour l'assurance de base obligatoire ?

Base : Tous les répondants pour la Suisse.

Tableau 6.228 Modèle pour l'assurance-maladie de base, Suisse (2017, en %)

| | Assurance ordinaire avec franchise | | | Assurance avec bonus | | | Assurance en réseau de santé (HMO) | | | Modèle de médecin de famille | | | Modèle avec consultation par téléphone | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | | IC limite sup. |
| Total | 49,5 | 47,1 | 51,9 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 3,3 | 2,4 | 4,2 | 40,4 | 38,0 | 42,8 | 3,7 | 2,8 | 4,7 | 1,8 | 1,2 | 2,5 | 3238 |
| Homme | 49,6 | 46,0 | 53,2 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | 3,9 | 2,4 | 5,5 | 40,9 | 37,4 | 44,5 | 3,2 | 1,9 | 4,5 | 1,2 | 0,5 | 1,9 | 1526 |
| Femme | 49,3 | 46,0 | 52,6 | 1,4 | 0,7 | 2,1 | 2,8 | 1,7 | 3,9 | 39,9 | 36,6 | 43,2 | 4,2 | 2,8 | 5,6 | 2,4 | 1,3 | 3,4 | 1712 |
| 65-69 ans | 47,6 | 42,9 | 52,3 | 1,4 | 0,6 | 2,2 | 4,3 | 2,3 | 6,3 | 41,1 | 36,4 | 45,9 | 4,7 | 2,5 | 6,8 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 828 |
| 70-74 ans | 47,0 | 42,5 | 51,6 | 1,7 | 0,7 | 2,7 | 3,0 | 1,4 | 4,5 | 42,7 | 38,1 | 47,3 | 4,5 | 2,5 | 6,4 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 954 |
| 75-79 ans | 46,2 | 41 | 51,4 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 2,7 | 0,8 | 4,6 | 43,8 | 38,5 | 49,1 | 2,8 | 1,2 | 4,5 | 3,3 | 1,2 | 5,3 | 697 |
| 80+ ans | 56,8 | 51,7 | 61,8 | 0,9 | 0,0 | 1,7 | 3,1 | 1,2 | 4,9 | 34,2 | 29,3 | 39,1 | 2,7 | 1,0 | 4,4 | 2,4 | 1,0 | 3,9 | 759 |
| 75+ ans | 51,9 | 48,2 | 55,5 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 2,9 | 1,6 | 4,3 | 38,6 | 35,0 | 42,3 | 2,8 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | 1,6 | 4,0 | 1456 |
| Scolarité obligatoire | 57,9 | 52,8 | 63,1 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2,8 | 1,0 | 4,5 | 35,4 | 30,3 | 40,5 | 1,7 | 0,4 | 3,0 | 1,9 | 0,8 | 3,0 | 706 |
| Secondaire II | 45,6 | 42,5 | 48,7 | 1,6 | 0,9 | 2,2 | 3,7 | 2,4 | 4,9 | 42,9 | 39,8 | 46,1 | 4,5 | 3,1 | 5,8 | 1,7 | 0,9 | 2,6 | 1765 |
| Tertiaire | 52,1 | 46,6 | 57,6 | 1,8 | 0,8 | 2,9 | 2,7 | 1,2 | 4,1 | 37,7 | 32,3 | 43,2 | 4,0 | 1,7 | 6,2 | 1,7 | 0,2 | 3,3 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 47,8 | 45,0 | 50,6 | 1,4 | 0,9 | 1,9 | 3,6 | 2,5 | 4,7 | 41,7 | 38,9 | 44,5 | 4,0 | 2,8 | 5,1 | 1,6 | 0,9 | 2,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 54,3 | 49,5 | 59,1 | 1,1 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,9 | 4,0 | 36,6 | 31,7 | 41,4 | 3,1 | 1,3 | 4,8 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 807 |
| Né en Suisse | 46,9 | 44,2 | 49,7 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 3,4 | 2,3 | 4,5 | 42,9 | 40,1 | 45,7 | 4,0 | 2,8 | 5,1 | 1,7 | 0,9 | 2,4 | 2217 |
| Né à l'étranger | 58,8 | 53,9 | 63,8 | 1,8 | 0,6 | 2,9 | 3,1 | 1,5 | 4,7 | 31,2 | 26,3 | 36,0 | 2,9 | 1,3 | 4,6 | 2,2 | 0,8 | 3,7 | 1015 |
| Medical Home | 47,9 | 44,0 | 51,8 | 1,1 | 0,5 | 1,7 | 3,2 | 1,8 | 4,7 | 42,3 | 38,3 | 46,2 | 3,4 | 1,9 | 4,9 | 2,1 | 0,8 | 3,4 | 1249 |
| Sans Medical Home | 58,2 | 52,6 | 63,7 | 1,5 | 0,4 | 2,7 | 3,1 | 1,0 | 5,1 | 32,4 | 27,0 | 37,8 | 4,2 | 1,8 | 6,6 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 726 |
| Malade | 54,0 | 49,4 | 58,6 | 1,1 | 0,4 | 1,8 | 2,0 | 0,8 | 3,3 | 36,3 | 31,8 | 40,9 | 3,6 | 1,9 | 5,4 | 2,9 | 1,3 | 4,5 | 948 |
| Non-malade | 47,0 | 44,1 | 49,9 | 1,4 | 0,8 | 2,0 | 3,8 | 2,6 | 5,0 | 42,4 | 39,4 | 45,4 | 3,9 | 2,7 | 5,1 | 1,5 | 0,8 | 2,2 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 51,8 | 45,2 | 58,3 | 1,1 | 0,1 | 2,1 | 1,6 | 0,2 | 3,0 | 39,5 | 33,0 | 46,0 | 3,3 | 0,8 | 5,8 | 2,7 | 0,4 | 5,1 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 59,9 | 49,1 | 70,8 | 2,4 | 0,0 | 5,5 | 3,0 | 0,0 | 6,3 | 27,6 | 17,2 | 37,9 | 6,1 | 0,6 | 11,7 | 0,9 | 0,0 | 2,5 | 210 |
| Ville | 48,8 | 44,3 | 53,3 | 1,4 | 0,5 | 2,4 | 3,6 | 1,8 | 5,4 | 38,1 | 33,6 | 42,6 | 5,5 | 3,2 | 7,8 | 2,6 | 1,1 | 4,1 | 1026 |
| Agglomération | 50,1 | 46,5 | 53,6 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 3,5 | 2,2 | 4,9 | 41,2 | 37,6 | 44,7 | 2,8 | 1,7 | 3,9 | 1,3 | 0,5 | 2,1 | 1643 |
| Zone rurale | 47,6 | 42,0 | 53,2 | 1,5 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 0,6 | 4,8 | 42,9 | 37,3 | 48,6 | 3,9 | 1,6 | 6,2 | 1,4 | 0,3 | 2,5 | 454 |
| Suisse alémanique | 41,2 | 38,0 | 44,4 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 3,7 | 2,5 | 5,0 | 48,3 | 45,0 | 51,5 | 4,2 | 2,8 | 5,5 | 1,9 | 1,0 | 2,7 | 1040 |
| Suisse romande | 69,9 | 66,8 | 73,0 | 2,0 | 1,1 | 3,0 | 2,6 | 1,7 | 3,4 | 21,3 | 18,4 | 24,1 | 2,4 | 1,4 | 3,3 | 1,8 | 1,0 | 2,6 | 1869 |
| Suisse italienne | 64,9 | 59,6 | 70,2 | 4,7 | 2,5 | 6,9 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 23,3 | 18,5 | 28,1 | 4,2 | 2,0 | 6,5 | 1,7 | 0,3 | 3,1 | 329 |
| ZH | 49,4 | 43,8 | 54,9 | 1,5 | 0,1 | 2,8 | 3,6 | 1,4 | 5,8 | 38,3 | 32,9 | 43,7 | 5,8 | 3,2 | 8,5 | 1,4 | 0,0 | 2,8 | 332 |
| CH sans ZH | 49,5 | 46,8 | 52,1 | 1,3 | 0,8 | 1,7 | 3,2 | 2,2 | 4,3 | 40,8 | 38,1 | 43,5 | 3,3 | 2,3 | 4,3 | 1,9 | 1,2 | 2,7 | 2906 |
| VD | 67,6 | 62,3 | 73,0 | 1,9 | 0,2 | 3,7 | 2,4 | 0,8 | 4,0 | 23,9 | 19,0 | 28,7 | 3,1 | 1,1 | 5,2 | 1,1 | 0,0 | 2,2 | 324 |
| CH sans VD | 47,7 | 45,2 | 50,3 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 3,4 | 2,4 | 4,4 | 41,9 | 39,3 | 44,5 | 3,8 | 2,8 | 4,8 | 1,9 | 1,2 | 2,6 | 2914 |
| VS | 73,0 | 67,7 | 78,2 | 1,4 | 0,0 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 19,5 | 14,9 | 24,1 | 3,3 | 0,8 | 5,8 | 2,6 | 1,0 | 4,3 | 321 |
| CH sans VS | 48,4 | 45,9 | 50,9 | 1,3 | 0,8 | 1,8 | 3,5 | 2,5 | 4,4 | 41,3 | 38,8 | 43,8 | 3,7 | 2,8 | 4,7 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 2917 |
| GE | 70,8 | 68,0 | 73,6 | 2,3 | 1,4 | 3,2 | 6,2 | 4,7 | 7,7 | 17,8 | 15,4 | 20,2 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 2,1 | 1,3 | 3,0 | 1160 |
| CH sans GE | 48,2 | 45,7 | 50,7 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 3,1 | 2,2 | 4,1 | 41,7 | 39,1 | 44,2 | 3,9 | 2,9 | 4,9 | 1,8 | 1,1 | 2,5 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.229 Modèle pour l'assurance-maladie de base, Suisse (2014, en %)

| | Assurance ordinaire avec franchise | | | Assurance avec bonus | | | Assurance en réseau de santé (HMO) | | | Modèle de médecin de famille | | | Modèle avec consultation par téléphone | | | NSP/NR | | Échan- tillon n | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | | IC limite sup. |
| Total | 62,8 | 59,2 | 66,4 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 30,7 | 27,2 | 34,2 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 3,7 | 2,4 | 5,0 | 1084 |
| Homme | 65,7 | 60,2 | 71,2 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | 2,8 | 28,4 | 23,1 | 33,7 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 3,1 | 1,2 | 4,9 | 493 |
| Femme | 60,7 | 55,9 | 65,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 2,9 | 32,5 | 27,8 | 37,3 | 0,9 | 0,0 | 1,7 | 4,2 | 2,4 | 6,0 | 591 |
| 65-69 ans | 61,0 | 54,5 | 67,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 34,7 | 28,3 | 41,1 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | 2,2 | 0,7 | 3,7 | 349 |
| 70-74 ans | 57,4 | 50,3 | 64,6 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 4,6 | 36,9 | 29,8 | 44,1 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 2,5 | 0,6 | 4,5 | 300 |
| 75-79 ans | 62,0 | 53,8 | 70,1 | 1,1 | 0,0 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 3,7 | 28,4 | 20,5 | 36,2 | 1,6 | 0,0 | 3,5 | 5,4 | 2,0 | 8,8 | 209 |
| 80+ ans | 71,2 | 63,7 | 78,7 | . | . | . | 1,2 | 0,0 | 3,1 | 22,0 | 15,0 | 29,0 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 5,1 | 1,7 | 8,6 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 71,0 | 63,0 | 79,1 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 0,9 | 0,0 | 2,8 | 23,0 | 15,2 | 30,7 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 4,1 | 1,2 | 7,0 | 216 |
| Secondaire II | 59,2 | 54,6 | 63,8 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 35,2 | 30,7 | 39,7 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 3,4 | 1,7 | 5,1 | 628 |
| Tertiaire | 67,5 | 59,2 | 75,9 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 5,0 | 22,9 | 14,6 | 31,1 | 2,4 | 0,3 | 4,5 | 3,8 | 1,6 | 6,1 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 63,8 | 55,1 | 72,5 | 1,1 | 0,0 | 3,1 | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 27,1 | 18,9 | 35,2 | 0,8 | 0,0 | 1,9 | 6,2 | 1,7 | 10,7 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 61,2 | 52,5 | 69,9 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 0,0 | 3,2 | 32,9 | 24,2 | 41,5 | 2,3 | 0,0 | 4,8 | 1,8 | 0,0 | 3,6 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 62,9 | 58,2 | 67,5 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 0,5 | 3,1 | 31,8 | 27,3 | 36,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 3,1 | 1,6 | 4,6 | 645 |
| Né en Suisse | 61,1 | 57,2 | 65,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,7 | 0,7 | 2,6 | 32,7 | 28,8 | 36,6 | 0,9 | 0,2 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 4,9 | 863 |
| Né à l'étranger | 70,3 | 61,5 | 79,1 | 1,1 | 0,0 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 3,5 | 22,3 | 13,7 | 30,8 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 4,8 | 1,7 | 7,8 | 220 |
| Ville | 69,1 | 62,0 | 76,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 0,2 | 5,0 | 24,0 | 17,1 | 30,8 | 0,8 | 0,0 | 1,9 | 3,4 | 1,4 | 5,5 | 293 |
| Agglomération | 60,5 | 55,4 | 65,7 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1,5 | 0,2 | 2,7 | 32,8 | 27,8 | 37,8 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 4,0 | 1,9 | 6,1 | 540 |
| Zone rurale | 60,7 | 53,3 | 68,1 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 34,0 | 26,6 | 41,3 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 3,4 | 1,1 | 5,8 | 251 |
| Medical Home | 61,7 | 55,6 | 67,8 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 2,1 | 0,0 | 4,2 | 33 | 27,1 | 38,9 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 3,2 | 392 |
| Sans Medical Home | 65,3 | 55,8 | 74,7 | . | . | . | 1,6 | 0,0 | 3,5 | 26,5 | 17,2 | 35,9 | 1,9 | 0,0 | 3,8 | 4,7 | 1,2 | 8,3 | 180 |
| Malade | 68,8 | 62,1 | 75,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | . | . | . | 26,5 | 20 | 33 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 3,5 | 1,0 | 5,9 | 305 |
| Non-malade | 60,7 | 56,4 | 65,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 2,2 | 0,9 | 3,4 | 32,2 | 28 | 36,4 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 3,8 | 2,3 | 5,4 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 64,3 | 54,0 | 74,5 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | . | . | . | 32,2 | 22 | 42,4 | 1,8 | 0,0 | 4,4 | 1,5 | 0,3 | 2,8 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 70,1 | 53,7 | 86,5 | . | . | . | . | . | . | 23,9 | 7,9 | 39,9 | 2,5 | 0,0 | 6,2 | 3,5 | 0,0 | 7,7 | 52 |
| Suisse alémanique | 54,6 | 49,8 | 59,3 | . | . | . | 2,0 | 0,8 | 3,3 | 39,5 | 34,8 | 44,2 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 3,3 | 1,6 | 5,0 | 551 |
| Suisse romande | 84,5 | 80,5 | 88,6 | 1,4 | 0,0 | 2,9 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 8,6 | 5,4 | 11,8 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 5,8 | 355 |
| Suisse italienne | 78,9 | 71,8 | 85,9 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | . | . | . | 10,2 | 5,4 | 15,1 | 2,8 | 0,0 | 7,2 | 7,7 | 3,6 | 11,8 | 178 |
| VD | 80,2 | 73,9 | 86,4 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 11,1 | 6,5 | 15,7 | 1,5 | 0,0 | 4,3 | 6,8 | 2,9 | 10,6 | 178 |
| CH sans VD | 61,3 | 57,4 | 65,2 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 2,7 | 32,5 | 28,7 | 36,3 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 3,4 | 2,1 | 4,8 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1535 : Quelle est votre franchise annuelle, c'est-à-dire le montant que vous devez payer de toute façon vous-même ?

Base : Tous les répondants pour la Suisse.

Tableau 6.230 Niveau de franchise pour l'assurance-maladie, Suisse (2017, en %)

| | 300 CHF | | | 500 CHF | | | 1000 CHF | | | 1500 CHF | | | 2000/2500 CHF | | | NSP/NR | | | Échan- tillon n |
|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 56,5 | 54,0 | 58,9 | 20,9 | 19,0 | 22,9 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 5,7 | 4,5 | 6,8 | 7,7 | 6,4 | 9,0 | 4,7 | 3,6 | 5,7 | 3238 |
| Homme | 53,9 | 50,3 | 57,5 | 20,5 | 17,7 | 23,4 | 6,0 | 4,3 | 7,8 | 6,3 | 4,5 | 8,1 | 11,1 | 8,8 | 13,4 | 2,1 | 1,2 | 3,0 | 1526 |
| Femme | 58,5 | 55,2 | 61,8 | 21,3 | 18,5 | 24,0 | 3,3 | 2,2 | 4,5 | 5,2 | 3,7 | 6,7 | 5,0 | 3,6 | 6,5 | 6,7 | 5,0 | 8,4 | 1712 |
| 65-69 ans | 51,5 | 46,8 | 56,3 | 23,6 | 19,6 | 27,6 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 8,1 | 5,5 | 10,8 | 10,1 | 7,3 | 12,9 | 1,6 | 0,6 | 2,7 | 828 |
| 70-74 ans | 58,0 | 53,5 | 62,5 | 19,2 | 15,7 | 22,7 | 5,0 | 3,0 | 7,1 | 5,7 | 3,7 | 7,7 | 8,2 | 5,7 | 10,7 | 3,9 | 2,1 | 5,6 | 954 |
| 75-79 ans | 62,3 | 57,1 | 67,4 | 19,1 | 15 | 23,3 | 3,3 | 1,5 | 5,1 | 4,8 | 2,5 | 7,1 | 6,2 | 3,8 | 8,7 | 4,2 | 2,1 | 6,3 | 697 |
| 80+ ans | 55,5 | 50,5 | 60,5 | 21,2 | 17,2 | 25,2 | 4,6 | 2,4 | 6,7 | 3,6 | 1,8 | 5,5 | 5,9 | 3,4 | 8,3 | 9,3 | 6,3 | 12,3 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 59,2 | 54,1 | 64,2 | 23,6 | 19,2 | 27,9 | 3,0 | 1,3 | 4,7 | 3,6 | 1,6 | 5,6 | 3,6 | 1,8 | 5,4 | 7,1 | 4,4 | 9,8 | 706 |
| Secondaire II | 56,6 | 53,5 | 59,8 | 20,7 | 18,2 | 23,2 | 4,8 | 3,4 | 6,2 | 4,7 | 7,8 | 7,9 | 6,1 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 5,0 | 1765 | |
| Tertiaire | 50,1 | 44,6 | 55,6 | 17,7 | 13,6 | 21,8 | 6,3 | 3,7 | 8,9 | 7,1 | 4,4 | 9,8 | 15,8 | 11,4 | 20,1 | 3,0 | 1,2 | 4,8 | 740 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 54,2 | 51,4 | 57,1 | 21,6 | 19,2 | 23,9 | 4,9 | 3,7 | 6,1 | 6,7 | 5,3 | 8,2 | 8,7 | 7,2 | 10,3 | 3,8 | 2,7 | 4,8 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 62,8 | 58,2 | 67,5 | 19,1 | 15,5 | 22,7 | 3,4 | 1,6 | 5,2 | 2,6 | 1,1 | 4,2 | 4,8 | 2,7 | 7,0 | 7,2 | 4,6 | 9,8 | 807 |
| Né en Suisse | 56,8 | 54,0 | 59,6 | 20,2 | 17,9 | 22,4 | 4,4 | 3,3 | 5,6 | 6,2 | 4,8 | 7,6 | 7,8 | 6,3 | 9,3 | 4,5 | 3,3 | 5,7 | 2217 |
| Né à l'étranger | 55,3 | 50,4 | 60,1 | 23,9 | 19,8 | 28,0 | 4,9 | 2,7 | 7,2 | 3,7 | 2,2 | 5,2 | 7,2 | 4,6 | 9,8 | 5,0 | 2,9 | 7,1 | 1015 |
| Medical Home | 64,6 | 60,9 | 68,3 | 20,2 | 17,1 | 23,3 | 4,6 | 3,0 | 6,3 | 4,1 | 2,5 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 5,4 | 2,6 | 1,4 | 3,7 | 1249 |
| Sans Medical Home | 52,4 | 46,8 | 57,9 | 21,0 | 16,5 | 25,4 | 6,7 | 3,8 | 9,6 | 6,3 | 3,5 | 9,1 | 9,0 | 6,0 | 12,0 | 4,7 | 2,1 | 7,2 | 726 |
| Malade | 66,9 | 62,6 | 71,2 | 18,9 | 15,4 | 22,3 | 4,4 | 2,5 | 6,3 | 2,8 | 1,3 | 4,3 | 2,2 | 0,9 | 3,6 | 4,8 | 2,9 | 6,8 | 948 |
| Non-malade | 52,0 | 49,1 | 55,0 | 21,9 | 19,5 | 24,4 | 4,7 | 3,4 | 5,9 | 6,8 | 5,3 | 8,3 | 10,2 | 8,4 | 12,0 | 4,4 | 3,1 | 5,6 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 71,1 | 65,3 | 76,8 | 17,2 | 12,4 | 21,9 | 4,6 | 2,0 | 7,2 | 3,3 | 0,8 | 5,8 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,9 | 1,1 | 4,7 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 61,9 | 51,3 | 72,4 | 20,5 | 12,2 | 28,8 | 4,2 | 0,0 | 9,0 | 2,6 | 0,0 | 6,2 | 4,5 | 0,0 | 8,9 | 6,4 | 0,1 | 12,8 | 210 |
| Ville | 56,8 | 52,3 | 61,3 | 18,4 | 15,0 | 21,8 | 4,7 | 2,9 | 6,6 | 5,3 | 3,3 | 7,3 | 9,8 | 7,0 | 12,5 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 1026 |
| Agglomération | 57,2 | 53,7 | 60,7 | 22,1 | 19,1 | 25,0 | 4,2 | 2,8 | 5,6 | 6,3 | 4,5 | 8,1 | 6,4 | 4,8 | 8,1 | 3,8 | 2,5 | 5,2 | 1643 |
| Zone rurale | 55,5 | 49,9 | 61,1 | 20,8 | 16,3 | 25,4 | 4,6 | 2,4 | 6,9 | 4,7 | 2,3 | 7,1 | 9,3 | 6,0 | 12,7 | 4,9 | 2,5 | 7,4 | 454 |
| Suisse alémanique | 58,1 | 54,9 | 61,4 | 18,7 | 16,1 | 21,3 | 4,5 | 3,2 | 5,9 | 5,8 | 4,3 | 7,4 | 8,0 | 6,2 | 9,7 | 4,8 | 3,4 | 6,2 | 1040 |
| Suisse romande | 51,2 | 47,9 | 54,5 | 27,6 | 24,6 | 30,5 | 4,7 | 3,3 | 6,1 | 5,5 | 4,0 | 7,0 | 6,9 | 5,3 | 8,5 | 4,1 | 2,8 | 5,5 | 1869 |
| Suisse italienne | 57,9 | 52,4 | 63,4 | 20,4 | 15,8 | 24,9 | 3,8 | 1,6 | 5,9 | 4,8 | 2,4 | 7,1 | 8,4 | 5,3 | 11,5 | 4,8 | 2,6 | 7,1 | 329 |
| ZH | 59,8 | 54,4 | 65,3 | 18,1 | 13,7 | 22,4 | 6,4 | 3,7 | 9,1 | 5,8 | 3,2 | 8,3 | 6,3 | 3,6 | 8,9 | 3,7 | 1,7 | 5,7 | 332 |
| CH sans ZH | 55,8 | 53,0 | 58,5 | 21,5 | 19,3 | 23,7 | 4,2 | 3,1 | 5,2 | 5,7 | 4,4 | 6,9 | 8,0 | 6,6 | 9,5 | 4,9 | 3,7 | 6,0 | 2906 |
| VD | 49,9 | 44,2 | 55,5 | 29,3 | 24,1 | 34,4 | 4,5 | 2,2 | 6,8 | 5,9 | 3,1 | 8,6 | 7,9 | 4,9 | 10,8 | 2,7 | 0,9 | 4,4 | 324 |
| CH sans VD | 57,1 | 54,5 | 59,7 | 20,1 | 18,0 | 22,2 | 4,5 | 3,5 | 5,6 | 5,7 | 4,4 | 6,9 | 7,7 | 6,3 | 9,1 | 4,8 | 3,7 | 6,0 | 2914 |
| VS | 53,2 | 47,3 | 59,0 | 29,3 | 23,8 | 34,7 | 3,3 | 1,0 | 5,5 | 3,0 | 1,1 | 4,9 | 4,6 | 2,1 | 7,1 | 6,8 | 4,1 | 9,4 | 321 |
| CH sans VS | 56,6 | 54,1 | 59,1 | 20,6 | 18,5 | 22,6 | 4,6 | 3,5 | 5,6 | 5,8 | 4,6 | 7,0 | 7,9 | 6,5 | 9,2 | 4,6 | 3,5 | 5,6 | 2917 |
| GE | 48,6 | 45,5 | 51,7 | 29,2 | 26,4 | 32,0 | 5,5 | 4,1 | 6,9 | 6,3 | 4,8 | 7,8 | 6,9 | 5,4 | 8,4 | 3,5 | 2,5 | 4,6 | 1160 |
| CH sans GE | 56,9 | 54,3 | 59,5 | 20,4 | 18,4 | 22,5 | 4,5 | 3,4 | 5,6 | 5,7 | 4,4 | 6,9 | 7,8 | 6,4 | 9,2 | 4,7 | 3,6 | 5,8 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.231 Niveau de franchise pour l'assurance-maladie, Suisse (2014, en %)

| | 300 CHF | | 500 CHF | | 1000 CHF | | 1500 CHF | | 2000/2500 CHF | | | NSP/NR | | Échan- tillon n | | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | | IC limite inf. | IC limite sup. | | | |
| Total | 54,6 | 50,9 | 58,3 | 18,1 | 15,3 | 21,0 | 3,9 | 2,5 | 5,4 | 4,9 | 3,3 | 6,5 | 6,8 | 5,0 | 8,7 | 11,6 | 9,2 | 13,9 | 1084 |
| Homme | 53,8 | 48,1 | 59,5 | 18,5 | 14,1 | 22,9 | 5,5 | 2,9 | 8,2 | 6,0 | 2,9 | 9,0 | 8,1 | 5,0 | 11,3 | 8,1 | 5,2 | 11,0 | 493 |
| Femme | 55,3 | 50,4 | 60,1 | 17,9 | 14,2 | 21,6 | 2,7 | 1,1 | 4,4 | 4,1 | 2,4 | 5,9 | 5,8 | 3,7 | 8,0 | 14,1 | 10,8 | 17,5 | 591 |
| 65-69 ans | 49,3 | 42,6 | 56,1 | 21,3 | 15,5 | 27,0 | 1,8 | 0,5 | 3,0 | 8,5 | 4,8 | 12,2 | 10,1 | 5,9 | 14,3 | 9,0 | 5,5 | 12,6 | 349 |
| 70-74 ans | 52,3 | 45,2 | 59,3 | 21,0 | 15,0 | 27,0 | 6,3 | 2,5 | 10,1 | 4,1 | 1,8 | 6,4 | 8,7 | 4,8 | 12,5 | 7,7 | 4,0 | 11,4 | 300 |
| 75-79 ans | 65,1 | 57,5 | 72,7 | 15,7 | 10,1 | 21,2 | 4,2 | 0,9 | 7,6 | 2,4 | 0,6 | 4,1 | 4,1 | 0,6 | 7,6 | 8,5 | 4,0 | 13,1 | 209 |
| 80+ ans | 53,7 | 45,8 | 61,7 | 13,8 | 8,9 | 18,6 | 4,0 | 0,8 | 7,1 | 3,8 | 0,0 | 7,9 | 3,6 | 1,0 | 6,1 | 21,2 | 14,9 | 27,5 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 56,0 | 47,6 | 64,5 | 22,8 | 15,5 | 30,1 | 3,4 | 0,1 | 6,7 | 1,6 | 0,0 | 3,4 | 2,1 | 0,1 | 4,0 | 14,1 | 8,6 | 19,6 | 216 |
| Secondaire II | 56,1 | 51,4 | 60,7 | 16,8 | 13,5 | 20,2 | 4,2 | 2,3 | 6,1 | 5,6 | 3,3 | 7,9 | 7,0 | 4,7 | 9,4 | 10,3 | 7,4 | 13,2 | 628 |
| Tertiaire | 45,0 | 36,8 | 53,1 | 17,6 | 11,2 | 24,0 | 4,1 | 1,6 | 6,6 | 7,2 | 3,3 | 11,1 | 14,9 | 7,2 | 22,7 | 11,2 | 6,6 | 15,8 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 37,9 | 29,5 | 46,4 | 19,3 | 11,8 | 26,9 | 7,1 | 3,1 | 11,2 | 6,4 | 1,7 | 11,1 | 16,9 | 10,5 | 23,4 | 12,2 | 6,1 | 18,3 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 58,6 | 50,2 | 66,9 | 19,5 | 12,7 | 26,2 | 2,9 | 0,5 | 5,3 | 6,3 | 2,5 | 10,1 | 5,4 | 1,9 | 8,9 | 7,3 | 3,0 | 11,7 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 58,2 | 53,4 | 63,0 | 18,3 | 14,7 | 22,0 | 3,9 | 1,8 | 5,9 | 4,1 | 2,1 | 6,1 | 4,8 | 2,6 | 7,0 | 10,8 | 7,9 | 13,7 | 645 |
| Né en Suisse | 56,8 | 52,7 | 60,8 | 16,6 | 13,7 | 19,6 | 3,7 | 2,2 | 5,2 | 4,8 | 3,2 | 6,4 | 7,7 | 5,5 | 9,8 | 10,4 | 7,9 | 12,9 | 863 |
| Né à l'étranger | 45,5 | 36,5 | 54,4 | 25,0 | 16,9 | 33,1 | 4,9 | 0,4 | 9,4 | 5,5 | 0,2 | 10,9 | 3,1 | 0,5 | 5,7 | 16,0 | 10,1 | 22,0 | 220 |
| Ville | 52,8 | 45,4 | 60,2 | 19,4 | 13,5 | 25,3 | 6,5 | 2,9 | 10,2 | 4,1 | 0,2 | 8,0 | 6,2 | 2,7 | 9,6 | 11,0 | 6,9 | 15,1 | 293 |
| Agglomération | 53,8 | 48,6 | 59,0 | 17,7 | 13,9 | 21,6 | 3,6 | 1,5 | 5,8 | 4,2 | 2,4 | 6,0 | 7,6 | 4,7 | 10,4 | 13,1 | 9,4 | 16,7 | 540 |
| Zone rurale | 58,2 | 50,9 | 65,5 | 17,5 | 11,8 | 23,2 | 1,8 | 0,5 | 3,1 | 7,2 | 3,4 | 11,0 | 6,1 | 2,9 | 9,3 | 9,2 | 5,2 | 13,2 | 251 |
| Medical Home | 62,6 | 56,7 | 68,5 | 18,1 | 13,7 | 22,6 | 4,5 | 1,7 | 7,4 | 3,7 | 1,5 | 5,9 | 4,4 | 1,8 | 7,1 | 6,6 | 3,9 | 9,3 | 392 |
| Sans Medical Home | 54,4 | 45,0 | 63,8 | 14,5 | 7,6 | 21,4 | 3,2 | 0,0 | 6,6 | 4,7 | 1,1 | 8,3 | 7,1 | 2,7 | 11,5 | 16,0 | 9,4 | 22,7 | 180 |
| Malade | 56,5 | 49,3 | 63,7 | 20,9 | 15,0 | 26,7 | 5,1 | 1,4 | 8,7 | 2,6 | 0,0 | 6,0 | 2,2 | 0,1 | 4,2 | 12,8 | 8,3 | 17,2 | 305 |
| Non-malade | 53,8 | 49,5 | 58,1 | 17,2 | 14,0 | 20,4 | 3,5 | 2,1 | 5,0 | 5,8 | 4,0 | 7,7 | 8,6 | 6,2 | 11,0 | 11,0 | 8,3 | 13,7 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 62,1 | 52,3 | 71,9 | 18,2 | 11,6 | 24,9 | 6,3 | 0,1 | 12,6 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 3,1 | 0,0 | 6,9 | 9,7 | 4,6 | 14,9 | 146 |
| Malade sans Medical Home | 59,2 | 42,3 | 76,1 | 18,2 | 6,1 | 30,2 | 5,3 | 0,0 | 14,5 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | . | . | . | 15,8 | 4,4 | 27,2 | 52 |
| Suisse alémanique | 56,0 | 51,2 | 60,7 | 16,4 | 12,8 | 20,0 | 3,8 | 1,9 | 5,6 | 5,1 | 2,9 | 7,2 | 7,3 | 4,9 | 9,7 | 11,5 | 8,5 | 14,5 | 551 |
| Suisse romande | 51,6 | 45,5 | 57,7 | 22,7 | 17,7 | 27,6 | 4,1 | 1,5 | 6,8 | 4,4 | 2,1 | 6,7 | 5,7 | 2,9 | 8,5 | 11,5 | 7,8 | 15,3 | 355 |
| Suisse italienne | 49,8 | 41,5 | 58,1 | 21,8 | 14,6 | 29,1 | 5,2 | 2,0 | 8,5 | 5,4 | 1,6 | 9,3 | 5,3 | 1,8 | 8,9 | 12,4 | 6,7 | 18,1 | 178 |
| VD | 51,9 | 43,7 | 60,1 | 19,7 | 13,7 | 25,8 | 2,9 | 0,6 | 5,2 | 5,1 | 1,8 | 8,4 | 6,7 | 1,9 | 11,5 | 13,7 | 8,1 | 19,2 | 178 |
| CH sans VD | 54,9 | 50,9 | 58,9 | 18,0 | 14,9 | 21,0 | 4,0 | 2,4 | 5,6 | 4,9 | 3,1 | 6,7 | 6,8 | 4,9 | 8,8 | 11,4 | 8,9 | 13,8 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1565 : Au cours des douze derniers mois, avez-vous eu des problèmes à payer ou n'avez-vous pas pu payer des factures médicales ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.232 Difficultés à payer des factures médicales, comparaison internationale (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| AU | 13,0 | 10,7 | 15,3 | 86,4 | 84,0 | 88,8 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 2500 |
| US | 9,9 | 7,7 | 12,0 | 89,1 | 86,9 | 91,4 | 1,0 | 0,2 | 1,7 | 1392 |
| CH | 4,3 | 3,3 | 5,3 | 95,6 | 94,6 | 96,6 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| CA | 4,2 | 3,4 | 5,1 | 95,5 | 94,6 | 96,4 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 4549 |
| NL | 4,0 | 2,5 | 5,4 | 95,6 | 94,0 | 97,1 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 750 |
| DE | 3,9 | 2,4 | 5,5 | 95,0 | 93,2 | 96,7 | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 751 |
| FR | 3,7 | 2,2 | 5,3 | 95,1 | 93,4 | 96,9 | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 750 |
| NZ | 3,2 | 1,6 | 4,9 | 96,5 | 94,8 | 98,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 500 |
| NO | 2,1 | 0,8 | 3,3 | 97,4 | 96,0 | 98,9 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 750 |
| UK | 1,8 | 0,8 | 2,7 | 97,0 | 95,6 | 98,4 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 753 |
| SE | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 98,2 | 97,9 | 98,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 7000 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.233 Difficultés à payer des factures médicales, comparaison internationale (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | | Échantillon |
|-----------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| US | 10,4 | 7,9 | 13,0 | 88,9 | 86,3 | 91,5 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 1116 |
| AU | 7,1 | 4,1 | 10,1 | 92,1 | 89,0 | 95,2 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 1670 |
| UK | 5,3 | 3,1 | 7,5 | 92,6 | 89,8 | 95,3 | 2,2 | 0,5 | 3,9 | 581 |
| NL | 4,4 | 2,2 | 6,5 | 95,2 | 93,0 | 97,3 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 582 |
| NZ | 4,1 | 1,0 | 7,3 | 95,6 | 92,5 | 98,8 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 379 |
| CA | 3,8 | 2,9 | 4,6 | 96,0 | 95,2 | 96,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 3147 |
| DE | 3,2 | 1,4 | 4,9 | 96,0 | 93,9 | 98,2 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 547 |
| FR | 2,3 | 1,2 | 3,3 | 97,2 | 96,0 | 98,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 860 |
| CH | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 97,0 | 95,8 | 98,1 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 1084 |
| NO | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 98,4 | 97,0 | 99,7 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 651 |
| SE | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 98,6 | 98,1 | 99,0 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 5000 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.234 Difficultés à payer des factures médicales, Suisse (2017, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 4,3 | 3,3 | 5,3 | 95,6 | 94,6 | 96,6 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 3238 |
| Homme | 4,1 | 2,6 | 5,5 | 95,8 | 94,3 | 97,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 1526 |
| Femme | 4,4 | 3,1 | 5,8 | 95,4 | 94,1 | 96,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1712 |
| 65–69 ans | 5,5 | 3,4 | 7,7 | 94,5 | 92,3 | 96,6 | . | . | . | 828 |
| 70–74 ans | 4,9 | 2,9 | 6,9 | 94,9 | 92,9 | 96,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 954 |
| 75–79 ans | 3,6 | 1,6 | 5,6 | 95,9 | 93,8 | 98 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 697 |
| 80+ ans | 2,8 | 1,2 | 4,4 | 97,2 | 95,6 | 98,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 5,1 | 3,1 | 7,2 | 94,6 | 92,5 | 96,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 706 |
| Secondaire II | 4,3 | 3,0 | 5,6 | 95,7 | 94,4 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1765 |
| Tertiaire | 2,8 | 1,4 | 4,3 | 97,1 | 95,6 | 98,6 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 2,7 | 1,8 | 3,7 | 97,1 | 96,1 | 98,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 8,7 | 6,0 | 11,4 | 91,2 | 88,5 | 93,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 807 |
| Né en Suisse | 3,7 | 2,6 | 4,8 | 96,2 | 95,1 | 97,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2217 |
| Né à l'étranger | 6,4 | 4,0 | 8,8 | 93,6 | 91,2 | 96,0 | . | . | . | 1015 |
| Medical Home | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 95,8 | 94,2 | 97,3 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1249 |
| Sans Medical Home | 7,2 | 4,2 | 10,2 | 92,7 | 89,7 | 95,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 726 |
| Malade | 6,4 | 4,0 | 8,7 | 93,4 | 91,0 | 95,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 948 |
| Non-malade | 3,2 | 2,1 | 4,2 | 96,7 | 95,7 | 97,8 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 5,4 | 2,5 | 8,3 | 94,1 | 91,1 | 97,1 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 13,4 | 4,8 | 21,9 | 86,6 | 78,1 | 95,2 | . | . | . | 210 |
| Ville | 4,6 | 2,8 | 6,4 | 95,2 | 93,4 | 97,1 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1026 |
| Agglomération | 3,4 | 2,1 | 4,7 | 96,4 | 95,1 | 97,7 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1643 |
| Zone rurale | 6,0 | 3,3 | 8,7 | 93,9 | 91,2 | 96,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 454 |
| Suisse alémanique | 3,3 | 2,1 | 4,5 | 96,6 | 95,4 | 97,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1040 |
| Suisse romande | 7,1 | 5,2 | 9,1 | 92,5 | 90,5 | 94,4 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1869 |
| Suisse italienne | 4,5 | 2,3 | 6,8 | 95,5 | 93,2 | 97,7 | . | . | . | 329 |
| ZH | 3,2 | 1,2 | 5,3 | 96,5 | 94,3 | 98,6 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 332 |
| CH sans ZH | 4,5 | 3,4 | 5,6 | 95,4 | 94,3 | 96,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 2906 |
| VD | 6,6 | 3,8 | 9,4 | 92,9 | 90,1 | 95,8 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 324 |
| CH sans VD | 4,1 | 3,0 | 5,1 | 95,8 | 94,8 | 96,9 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2914 |
| VS | 3,3 | 1,1 | 5,5 | 96,0 | 93,7 | 98,4 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 321 |
| CH sans VS | 4,3 | 3,3 | 5,3 | 95,5 | 94,5 | 96,6 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2917 |
| GE | 7,5 | 5,7 | 9,2 | 92,5 | 90,8 | 94,3 | . | . | . | 1160 |
| CH sans GE | 4,1 | 3,1 | 5,1 | 95,7 | 94,7 | 96,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.235 Difficultés à payer des factures médicales, Suisse (2014, en %)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 97 | 95,8 | 98,1 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 1084 |
| Homme | 1,4 | 0,2 | 2,7 | 98,2 | 96,8 | 99,6 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 493 |
| Femme | 2,9 | 1,4 | 4,4 | 96,0 | 94,3 | 97,8 | 1,1 | 0,1 | 2,0 | 591 |
| 65–69 ans | 2,9 | 0,8 | 5,0 | 96,5 | 94,2 | 98,9 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 349 |
| 70–74 ans | 1,8 | 0,0 | 3,7 | 98,0 | 96,2 | 99,9 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 300 |
| 75–79 ans | 1,6 | 0,0 | 3,5 | 97,2 | 94,6 | 99,9 | 1,2 | 0,0 | 3,1 | 209 |
| 80+ ans | 2,5 | 0,6 | 4,5 | 96,2 | 93,8 | 98,6 | 1,3 | 0,0 | 2,7 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 2,8 | 0,6 | 5,1 | 96,3 | 93,8 | 98,9 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | 216 |
| Secondaire II | 1,8 | 0,7 | 2,9 | 97,7 | 96,4 | 99,0 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 628 |
| Tertiaire | 2,3 | 0,0 | 5,1 | 97,2 | 94,3 | 100,0 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 2,2 | 0,0 | 5,0 | 97,8 | 95,0 | 100,0 | . | . | . | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 2,1 | 0,0 | 4,4 | 96,8 | 93,6 | 99,9 | 1,1 | 0,0 | 3,4 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 2,5 | 1,2 | 3,8 | 97,3 | 96,0 | 98,7 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 645 |
| Né en Suisse | 1,4 | 0,6 | 2,3 | 97,9 | 96,8 | 99,0 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 863 |
| Né à l'étranger | 6,0 | 2,2 | 9,8 | 93,5 | 89,7 | 97,4 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 220 |
| Ville | 2,2 | 0,4 | 4,0 | 96,9 | 94,8 | 99,0 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | 293 |
| Agglomération | 2,5 | 0,9 | 4,1 | 96,9 | 95,1 | 98,7 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 540 |
| Zone rurale | 1,9 | 0,2 | 3,5 | 97,2 | 95,0 | 99,3 | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 251 |
| Medical Home | 3,0 | 1,1 | 5,0 | 96,9 | 94,9 | 98,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 392 |
| Sans Medical Home | 2,1 | 0,0 | 4,5 | 96,8 | 93,8 | 99,8 | 1,1 | 0,0 | 3,0 | 180 |
| Malade | 4,2 | 1,8 | 6,6 | 94,5 | 91,5 | 97,4 | 1,4 | 0,0 | 3,1 | 305 |
| Non-malade | 1,6 | 0,5 | 2,6 | 97,9 | 96,7 | 99,1 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 776 |
| Malade avec Medical Home | 4,3 | 0,7 | 7,9 | 95,7 | 92,1 | 99,3 | . | . | . | 146 |
| Malade sans Medical Home | 2,8 | 0,0 | 5,9 | 96,3 | 92,7 | 99,8 | 0,9 | 0,0 | 2,6 | 52 |
| Suisse alémanique | 1,6 | 0,5 | 2,7 | 97,7 | 96,4 | 99 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 551 |
| Suisse romande | 4,3 | 1,6 | 6,9 | 94,6 | 91,7 | 97,4 | 1,2 | 0,0 | 2,5 | 355 |
| Suisse italienne | 2,6 | 0,5 | 4,6 | 97,4 | 95,4 | 99,5 | . | . | . | 178 |
| VD | 1,0 | 0,0 | 2,4 | 97,2 | 94,7 | 99,7 | 1,8 | 0,0 | 3,9 | 178 |
| CH sans VD | 2,4 | 1,3 | 3,5 | 96,9 | 95,7 | 98,2 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 906 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question Q1590A1 : Au cours des deux dernières années, à quelle fréquence vous êtes-vous fait du souci concernant le fait d'avoir assez d'argent pour acheter des aliments sains ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.236 Soucis financiers pour l'achat d'aliments sains, comparaison internationale (2017, en %)

| | Toujours/généralement | | | Parfois | | | Rarement/jamais | | | NC/NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 13,4 | 10,8 | 15,9 | 8,4 | 6,3 | 10,4 | 77,2 | 74,2 | 80,3 | 1,0 | 0,4 | 1,7 | 1392 |
| DE | 9,3 | 7,0 | 11,6 | 4,5 | 2,8 | 6,2 | 84,1 | 81,2 | 87,0 | 2,1 | 1,0 | 3,3 | 751 |
| FR | 5,6 | 3,8 | 7,4 | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 91,1 | 88,9 | 93,3 | 1,0 | 0,2 | 1,7 | 750 |
| CA | 5,0 | 4,1 | 5,9 | 7,6 | 6,2 | 8,9 | 86,3 | 84,7 | 87,9 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | 4549 |
| CH | 4,8 | 3,8 | 5,7 | 7,4 | 6,2 | 8,7 | 79,9 | 78,0 | 81,9 | 7,9 | 6,5 | 9,3 | 3238 |
| NL | 4,3 | 2,6 | 6,0 | 3,5 | 2,1 | 4,9 | 91,4 | 89,2 | 93,7 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 750 |
| NZ | 2,6 | 1,0 | 4,2 | 3,4 | 1,7 | 5,0 | 93,3 | 90,8 | 95,7 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 500 |
| UK | 2,2 | 1,0 | 3,3 | 6,0 | 4,1 | 7,9 | 90,5 | 88,2 | 92,8 | 1,4 | 0,5 | 2,2 | 753 |
| SE | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 95,5 | 94,9 | 96,1 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 7000 |
| NO | 1,4 | 0,4 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 5,2 | 94,0 | 91,9 | 96,1 | 1,0 | 0,1 | 1,9 | 750 |
| AU | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 4,0 | 2,7 | 5,2 | 94,5 | 93,1 | 95,9 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2500 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.237 Soucis financiers pour l'achat d'aliments sains, Suisse (2017, en %)

| | Toujours/généralement | | | Parfois | | | Rarement/jamais | | | NC/NSP/NR | | | Échantillon n | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | |
| Total | 4,8 | 3,8 | 5,7 | 7,4 | 6,2 | 8,7 | 79,9 | 78,0 | 81,9 | 7,9 | 6,5 | 9,3 | 3238 | |
| Homme | | 4,6 | 3,1 | 6,0 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 81,0 | 78,2 | 83,9 | 6,8 | 4,9 | 8,7 | 1526 |
| Femme | | 4,9 | 3,6 | 6,3 | 7,2 | 5,6 | 8,9 | 79,1 | 76,3 | 81,8 | 8,8 | 6,7 | 10,8 | 1712 |
| 65–69 ans | | 5,3 | 3,5 | 7,1 | 10,2 | 7,4 | 13,0 | 75,0 | 70,9 | 79,1 | 9,5 | 6,4 | 12,6 | 828 |
| 70–74 ans | | 5,2 | 3,4 | 7,1 | 7,5 | 5,1 | 10,0 | 77,8 | 73,9 | 81,7 | 9,4 | 6,5 | 12,4 | 954 |
| 75–79 ans | | 5,6 | 3,1 | 8,1 | 7,4 | 4,6 | 10,2 | 80,9 | 76,6 | 85,1 | 6,1 | 3,4 | 8,8 | 697 |
| 80+ ans | | 3,0 | 1,4 | 4,5 | 4,1 | 2,4 | 5,8 | 86,9 | 83,7 | 90,2 | 6,0 | 3,5 | 8,4 | 759 |
| Scolarité obligatoire | | 7,0 | 4,5 | 9,4 | 10,1 | 7,3 | 13,0 | 76,5 | 72,2 | 80,7 | 6,4 | 3,7 | 9,1 | 706 |
| Secondaire II | | 3,9 | 2,8 | 5,1 | 6,9 | 5,3 | 8,4 | 80,5 | 78,0 | 83,0 | 8,7 | 6,8 | 10,6 | 1765 |
| Tertiaire | | 4,1 | 1,8 | 6,4 | 4,6 | 2,1 | 7,0 | 85,5 | 81,5 | 89,4 | 5,9 | 3,4 | 8,4 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | | 3,2 | 2,3 | 4,1 | 5,6 | 4,3 | 6,8 | 82,1 | 79,8 | 84,3 | 9,2 | 7,4 | 11,0 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | | 9,4 | 6,7 | 12,0 | 12,8 | 9,6 | 15,9 | 73,8 | 69,7 | 78,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 807 |
| Né en Suisse | | 3,7 | 2,7 | 4,7 | 6,4 | 5,1 | 7,8 | 81,8 | 79,6 | 84,0 | 8,1 | 6,4 | 9,7 | 2217 |
| Né à l'étranger | | 8,8 | 6,1 | 11,4 | 10,8 | 7,9 | 13,6 | 73,4 | 69,1 | 77,7 | 7,0 | 4,3 | 9,7 | 1015 |
| Medical Home | | 5,3 | 3,6 | 7,0 | 8,7 | 6,5 | 10,9 | 79,8 | 76,6 | 83,0 | 6,2 | 4,1 | 8,2 | 1249 |
| Sans Medical Home | | 8,9 | 5,8 | 12,0 | 13,1 | 9,3 | 16,9 | 70,1 | 64,9 | 75,2 | 7,9 | 4,6 | 11,2 | 726 |
| Malade | | 7,6 | 5,3 | 9,9 | 10,6 | 7,9 | 13,4 | 76,3 | 72,4 | 80,1 | 5,5 | 3,3 | 7,7 | 948 |
| Non-malade | | 3,4 | 2,4 | 4,4 | 6,0 | 4,6 | 7,3 | 81,8 | 79,4 | 84,1 | 8,9 | 7,0 | 10,7 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | | 6,6 | 3,7 | 9,6 | 9,5 | 5,9 | 13,1 | 80,2 | 75,2 | 85,2 | 3,7 | 1,0 | 6,3 | 463 |
| Malade sans Medical Home | | 16,9 | 8,5 | 25,4 | 20,2 | 11,2 | 29,1 | 59,7 | 49,0 | 70,4 | 3,2 | 0,2 | 6,1 | 210 |
| Ville | | 4,7 | 3,0 | 6,5 | 7,9 | 5,5 | 10,2 | 81,3 | 77,8 | 84,8 | 6,1 | 3,8 | 8,5 | 1026 |
| Agglomération | | 4,2 | 2,9 | 5,4 | 8,0 | 6,1 | 9,9 | 80,1 | 77,3 | 82,9 | 7,7 | 5,7 | 9,8 | 1643 |
| Zone rurale | | 6,0 | 3,5 | 8,6 | 6,2 | 3,4 | 9,0 | 78,8 | 74,1 | 83,6 | 8,9 | 5,4 | 12,5 | 454 |
| Suisse alémanique | | 3,3 | 2,1 | 4,5 | 6,0 | 4,4 | 7,6 | 81,2 | 78,6 | 83,8 | 9,5 | 7,6 | 11,5 | 1040 |
| Suisse romande | | 7,8 | 5,9 | 9,7 | 11,6 | 9,3 | 14,0 | 76,3 | 73,4 | 79,3 | 4,2 | 3,1 | 5,4 | 1869 |
| Suisse italienne | | 10,3 | 7,0 | 13,7 | 7,0 | 4,1 | 9,9 | 80,1 | 75,6 | 84,5 | 2,6 | 0,8 | 4,5 | 329 |
| ZH | | 2,5 | 0,7 | 4,3 | 7,4 | 4,3 | 10,5 | 79,3 | 74,7 | 84,0 | 10,7 | 7,1 | 14,3 | 332 |
| CH sans ZH | | 5,2 | 4,1 | 6,3 | 7,4 | 6,0 | 8,8 | 80,1 | 77,9 | 82,2 | 7,3 | 5,7 | 8,8 | 2906 |
| VD | | 7,5 | 4,4 | 10,6 | 14,5 | 10,3 | 18,7 | 73,8 | 68,7 | 79,0 | 4,2 | 1,9 | 6,5 | 324 |
| CH sans VD | | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6,7 | 5,4 | 8,0 | 80,5 | 78,4 | 82,6 | 8,2 | 6,7 | 9,8 | 2914 |
| VS | | 6,5 | 3,4 | 9,7 | 8,1 | 4,5 | 11,7 | 79,7 | 74,7 | 84,7 | 5,6 | 3,0 | 8,3 | 321 |
| CH sans VS | | 4,7 | 3,7 | 5,7 | 7,4 | 6,1 | 8,7 | 80,0 | 77,9 | 82,0 | 8,0 | 6,5 | 9,5 | 2917 |
| GE | | 7,7 | 5,9 | 9,5 | 9,4 | 7,5 | 11,3 | 77,4 | 74,7 | 80,2 | 5,4 | 4,0 | 6,9 | 1160 |
| CH sans GE | | 4,6 | 3,6 | 5,6 | 7,3 | 6,0 | 8,6 | 80,1 | 78,0 | 82,2 | 8,0 | 6,5 | 9,5 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1590A2 : Au cours des deux dernières années, à quelle fréquence vous êtes-vous fait du souci concernant le fait d'avoir assez d'argent pour payer votre loyer ou votre hypothèque ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.238 Soucis financiers pour le paiement du loyer ou de l'hypothèque, comparaison internationale (2017, en %)

| | Toujours/généralement | | | Parfois | | | Rarement/jamais | | | NC/NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 11,2 | 8,8 | 13,5 | 9,4 | 7,2 | 11,5 | 75,7 | 72,6 | 78,7 | 3,8 | 2,6 | 5,0 | 1392 |
| CH | 5,4 | 4,4 | 6,5 | 9,7 | 8,3 | 11,1 | 76,9 | 74,8 | 79,0 | 8,0 | 6,6 | 9,4 | 3238 |
| FR | 5,1 | 3,3 | 6,8 | 3,0 | 1,8 | 4,3 | 90,3 | 88,0 | 92,6 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 750 |
| DE | 4,6 | 2,8 | 6,4 | 4,8 | 3,1 | 6,6 | 87,0 | 84,3 | 89,8 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 751 |
| CA | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 6,7 | 9,4 | 85,4 | 83,9 | 87,0 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 4549 |
| NL | 4,1 | 2,4 | 5,8 | 5,4 | 3,7 | 7,1 | 89,3 | 86,9 | 91,8 | 1,1 | 0,3 | 2,0 | 750 |
| AU | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 9,4 | 6,9 | 11,9 | 86,0 | 83,1 | 88,8 | 2,5 | 1,1 | 3,9 | 2500 |
| NZ | 1,9 | 0,3 | 3,4 | 3,5 | 1,8 | 5,2 | 89,8 | 86,7 | 92,9 | 4,8 | 2,6 | 7,1 | 500 |
| UK | 1,9 | 0,9 | 3,0 | 5,5 | 3,7 | 7,4 | 86,4 | 83,7 | 89,1 | 6,1 | 4,3 | 8,0 | 753 |
| SE | 1,7 | 1,3 | 2,1 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 94,6 | 93,9 | 95,3 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 7000 |
| NO | 1,5 | 0,4 | 2,6 | 5,4 | 3,5 | 7,3 | 92,3 | 90,0 | 94,6 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.239 Soucis financiers pour le paiement du loyer ou de l'hypothèque, Suisse (2017, en %)

| | Toujours/généralement | | | Parfois | | | Rarement/jamais | | | NC/NSP/NR | | | Échantillon n | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | |
| Total | 5,4 | 4,4 | 6,5 | 9,7 | 8,3 | 11,1 | 76,9 | 74,8 | 79,0 | 8,0 | 6,6 | 9,4 | 3238 | |
| Homme | | 5,6 | 4,0 | 7,2 | 10,0 | 8,0 | 12,1 | 77,7 | 74,7 | 80,7 | 6,7 | 4,8 | 8,6 | 1526 |
| Femme | | 5,3 | 4,0 | 6,7 | 9,4 | 7,4 | 11,4 | 76,3 | 73,4 | 79,2 | 9,0 | 7,0 | 11,1 | 1712 |
| 65–69 ans | | 6,4 | 4,2 | 8,6 | 12,4 | 9,4 | 15,4 | 72,3 | 68,0 | 76,5 | 8,9 | 6,0 | 11,9 | 828 |
| 70–74 ans | | 6,5 | 4,3 | 8,6 | 10,4 | 7,5 | 13,2 | 76,5 | 72,5 | 80,4 | 6,7 | 4,3 | 9,2 | 954 |
| 75–79 ans | | 5,5 | 3,2 | 7,7 | 10,8 | 7,4 | 14,1 | 76,4 | 71,8 | 81,0 | 7,3 | 4,4 | 10,2 | 697 |
| 80+ ans | | 3,3 | 1,6 | 4,9 | 4,9 | 2,9 | 6,9 | 83,1 | 79,4 | 86,8 | 8,7 | 5,8 | 11,7 | 759 |
| Scolarité obligatoire | | 8,1 | 5,6 | 10,7 | 11,8 | 8,6 | 15,0 | 73,6 | 69,2 | 78,0 | 6,4 | 3,8 | 9,1 | 706 |
| Secondaire II | | 4,7 | 3,5 | 6,0 | 8,7 | 7,0 | 10,5 | 77,7 | 75,0 | 80,4 | 8,8 | 6,9 | 10,7 | 1765 |
| Tertiaire | | 4,1 | 1,8 | 6,4 | 10,9 | 7,5 | 14,4 | 78,8 | 74,2 | 83,4 | 6,2 | 3,4 | 8,9 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | | 3,4 | 2,4 | 4,3 | 8,2 | 6,6 | 9,7 | 80,4 | 78,1 | 82,6 | 8,1 | 6,5 | 9,7 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | | 11,4 | 8,5 | 14,4 | 14,1 | 10,7 | 17,5 | 66,9 | 62,3 | 71,5 | 7,6 | 4,8 | 10,4 | 807 |
| Né en Suisse | | 4,3 | 3,3 | 5,4 | 8,8 | 7,2 | 10,4 | 79,0 | 76,6 | 81,3 | 7,8 | 6,2 | 9,5 | 2217 |
| Né à l'étranger | | 9,5 | 6,7 | 12,3 | 12,9 | 9,7 | 16,2 | 69,3 | 64,8 | 73,8 | 8,2 | 5,4 | 11,0 | 1015 |
| Medical Home | | 6,1 | 4,3 | 7,9 | 10,9 | 8,5 | 13,4 | 76,5 | 73,1 | 79,9 | 6,5 | 4,4 | 8,6 | 1249 |
| Sans Medical Home | | 10,2 | 6,8 | 13,6 | 14,3 | 10,5 | 18,2 | 69,5 | 64,4 | 74,7 | 5,9 | 3,2 | 8,6 | 726 |
| Malade | | 7,4 | 5,0 | 9,8 | 11,7 | 8,8 | 14,6 | 74,1 | 70,1 | 78,2 | 6,8 | 4,3 | 9,3 | 948 |
| Non-malade | | 4,4 | 3,3 | 5,5 | 8,4 | 6,8 | 10,0 | 78,9 | 76,5 | 81,4 | 8,3 | 6,5 | 10,0 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | | 6,8 | 3,8 | 9,9 | 11,9 | 7,7 | 16,1 | 75,8 | 70,2 | 81,3 | 5,5 | 2,4 | 8,7 | 463 |
| Malade sans Medical Home | | 17,4 | 8,4 | 26,5 | 15,6 | 8,0 | 23,2 | 63,9 | 53,3 | 74,4 | 3,1 | 0,2 | 6,0 | 210 |
| Ville | | 5,6 | 3,7 | 7,5 | 11,4 | 8,5 | 14,2 | 76,4 | 72,5 | 80,2 | 6,7 | 4,2 | 9,2 | 1026 |
| Agglomération | | 4,8 | 3,4 | 6,2 | 8,4 | 6,4 | 10,3 | 78,5 | 75,6 | 81,4 | 8,3 | 6,3 | 10,4 | 1643 |
| Zone rurale | | 6,7 | 3,9 | 9,4 | 11,1 | 7,6 | 14,6 | 74,6 | 69,6 | 79,5 | 7,7 | 4,5 | 10,8 | 454 |
| Suisse alémanique | | 3,8 | 2,6 | 5,1 | 8,6 | 6,8 | 10,5 | 78,4 | 75,6 | 81,1 | 9,2 | 7,2 | 11,1 | 1040 |
| Suisse romande | | 9,3 | 7,2 | 11,3 | 12,8 | 10,4 | 15,1 | 72,8 | 69,7 | 75,8 | 5,2 | 3,9 | 6,5 | 1869 |
| Suisse italienne | | 9,3 | 6,1 | 12,5 | 9,7 | 6,3 | 13,1 | 76,3 | 71,5 | 81,0 | 4,7 | 2,4 | 7,1 | 329 |
| ZH | | 3,1 | 1,2 | 4,9 | 9,2 | 5,9 | 12,5 | 78,1 | 73,3 | 82,8 | 9,7 | 6,2 | 13,1 | 332 |
| CH sans ZH | | 5,9 | 4,7 | 7,1 | 9,8 | 8,2 | 11,4 | 76,7 | 74,4 | 79,0 | 7,6 | 6,1 | 9,2 | 2906 |
| VD | | 8,8 | 5,5 | 12,1 | 14,8 | 10,7 | 19,0 | 71,9 | 66,7 | 77,1 | 4,5 | 2,1 | 6,8 | 324 |
| CH sans VD | | 5,1 | 4,0 | 6,2 | 9,2 | 7,7 | 10,7 | 77,4 | 75,2 | 79,6 | 8,3 | 6,8 | 9,8 | 2914 |
| VS | | 7,5 | 4,1 | 11,0 | 10,0 | 6,3 | 13,6 | 75,6 | 70,4 | 80,7 | 7,0 | 4,1 | 9,8 | 321 |
| CH sans VS | | 5,3 | 4,3 | 6,4 | 9,7 | 8,2 | 11,1 | 77,0 | 74,8 | 79,1 | 8,0 | 6,5 | 9,5 | 2917 |
| GE | | 8,7 | 6,8 | 10,5 | 10,8 | 8,8 | 12,8 | 72,7 | 69,9 | 75,6 | 7,8 | 6,0 | 9,5 | 1160 |
| CH sans GE | | 5,2 | 4,1 | 6,3 | 9,6 | 8,1 | 11,1 | 77,2 | 75,0 | 79,3 | 8,0 | 6,5 | 9,5 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1590A3 : Au cours des deux dernières années, à quelle fréquence vous êtes-vous fait du souci concernant le fait d'avoir assez d'argent pour payer d'autres factures mensuelles comme l'électricité, le chauffage et votre téléphone.

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.240 Soucis financiers pour le paiement de factures non médicales, comparaison internationale (2017, en %)

| | Toujours/généralement | | | Parfois | | | Rarement/jamais | | | NC/NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 14,3 | 11,7 | 16,9 | 11,5 | 9,2 | 13,8 | 72,9 | 69,7 | 76,1 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | 1392 |
| DE | 5,7 | 3,9 | 7,5 | 4,8 | 3,0 | 6,5 | 87,1 | 84,5 | 89,8 | 2,4 | 1,2 | 3,5 | 751 |
| CA | 5,2 | 4,3 | 6,0 | 10,1 | 8,6 | 11,5 | 83,4 | 81,7 | 85,0 | 1,4 | 1,0 | 1,8 | 4549 |
| CH | 5,2 | 4,2 | 6,2 | 8,3 | 7,0 | 9,6 | 79,8 | 77,8 | 81,8 | 6,7 | 5,4 | 8,0 | 3238 |
| FR | 4,6 | 2,9 | 6,2 | 2,7 | 1,6 | 3,8 | 91,8 | 89,7 | 93,9 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 750 |
| NL | 3,7 | 2,1 | 5,3 | 3,8 | 2,4 | 5,2 | 91,6 | 89,4 | 93,8 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 750 |
| UK | 3,3 | 1,9 | 4,7 | 9,6 | 7,2 | 12,1 | 85,6 | 82,8 | 88,5 | 1,4 | 0,4 | 2,4 | 753 |
| NZ | 2,7 | 1,1 | 4,4 | 5,2 | 3,1 | 7,4 | 91,2 | 88,5 | 94,0 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 500 |
| AU | 2,7 | 1,4 | 4,0 | 14,2 | 11,0 | 17,3 | 83,0 | 79,7 | 86,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 2500 |
| SE | 2,1 | 1,7 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 3,1 | 94,5 | 93,9 | 95,2 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 7000 |
| NO | 1,3 | 0,3 | 2,3 | 4,9 | 3,0 | 6,7 | 93,7 | 91,7 | 95,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.241 Soucis financiers pour le paiement de factures non médicales, Suisse (2017, en %)

| | Toujours/généralement | | | Parfois | | | Rarement/jamais | | | NC/NSP/NR | | | Échantillon n | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | | |
| Total | 5,2 | 4,2 | 6,2 | 8,3 | 7,0 | 9,6 | 79,8 | 77,8 | 81,8 | 6,7 | 5,4 | 8,0 | 3238 | |
| Homme | | 4,9 | 3,4 | 6,4 | 7,6 | 5,7 | 9,4 | 82,6 | 79,9 | 85,3 | 4,9 | 3,3 | 6,5 | 1526 |
| Femme | | 5,4 | 4,0 | 6,8 | 8,9 | 7,0 | 10,8 | 77,5 | 74,7 | 80,3 | 8,2 | 6,2 | 10,2 | 1712 |
| 65–69 ans | | 6,4 | 4,3 | 8,6 | 11,1 | 8,2 | 14,1 | 75,2 | 71,1 | 79,3 | 7,3 | 4,6 | 10,0 | 828 |
| 70–74 ans | | 5,9 | 3,9 | 8,0 | 9,1 | 6,5 | 11,7 | 76,6 | 72,7 | 80,6 | 8,4 | 5,5 | 11,2 | 954 |
| 75–79 ans | | 4,9 | 2,7 | 7,1 | 8,9 | 5,7 | 12,0 | 80,7 | 76,4 | 85,0 | 5,5 | 2,9 | 8,1 | 697 |
| 80+ ans | | 3,2 | 1,6 | 4,8 | 3,8 | 2,1 | 5,5 | 87,5 | 84,3 | 90,6 | 5,5 | 3,2 | 7,8 | 759 |
| Scolarité obligatoire | | 7,7 | 5,2 | 10,1 | 10,3 | 7,3 | 13,3 | 76,5 | 72,2 | 80,8 | 5,5 | 3,0 | 8,0 | 706 |
| Secondaire II | | 4,5 | 3,3 | 5,8 | 7,9 | 6,2 | 9,6 | 80,1 | 77,5 | 82,6 | 7,5 | 5,7 | 9,3 | 1765 |
| Tertiaire | | 4,1 | 1,8 | 6,5 | 6,6 | 3,8 | 9,4 | 84,4 | 80,4 | 88,5 | 4,8 | 2,6 | 7,1 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | | 3,7 | 2,7 | 4,7 | 6,4 | 5,1 | 7,8 | 82,3 | 80,1 | 84,5 | 7,6 | 6,0 | 9,2 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | | 9,5 | 6,8 | 12,2 | 13,7 | 10,4 | 16,9 | 72,6 | 68,3 | 76,8 | 4,2 | 2,2 | 6,2 | 807 |
| Né en Suisse | | 3,7 | 2,7 | 4,7 | 7,6 | 6,1 | 9,2 | 82,0 | 79,8 | 84,2 | 6,7 | 5,2 | 8,2 | 2217 |
| Né à l'étranger | | 10,8 | 7,8 | 13,9 | 10,8 | 7,9 | 13,7 | 71,8 | 67,4 | 76,2 | 6,6 | 3,9 | 9,2 | 1015 |
| Medical Home | | 6,0 | 4,2 | 7,8 | 9,5 | 7,2 | 11,9 | 79,2 | 75,9 | 82,5 | 5,3 | 3,4 | 7,2 | 1249 |
| Sans Medical Home | | 8,0 | 5,1 | 11,0 | 13,9 | 10,0 | 17,8 | 71,9 | 66,8 | 76,9 | 6,2 | 3,3 | 9,0 | 726 |
| Malade | | 7,8 | 5,3 | 10,3 | 11,9 | 8,9 | 14,8 | 75,5 | 71,5 | 79,4 | 4,9 | 2,8 | 6,9 | 948 |
| Non-malade | | 4,0 | 3,0 | 5,1 | 6,4 | 4,9 | 7,8 | 82,2 | 79,9 | 84,5 | 7,4 | 5,7 | 9,1 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | | 6,7 | 3,7 | 9,8 | 13,3 | 8,8 | 17,8 | 75,7 | 70,1 | 81,3 | 4,3 | 1,5 | 7,1 | 463 |
| Malade sans Medical Home | | 18,5 | 9,1 | 27,8 | 13,0 | 6,3 | 19,8 | 63,9 | 53,3 | 74,4 | 4,7 | 0,5 | 8,8 | 210 |
| Ville | | 5,1 | 3,3 | 6,8 | 9,2 | 6,6 | 11,8 | 80,3 | 76,8 | 83,9 | 5,4 | 3,2 | 7,6 | 1026 |
| Agglomération | | 5,0 | 3,5 | 6,4 | 7,2 | 5,4 | 9,0 | 80,5 | 77,6 | 83,3 | 7,4 | 5,4 | 9,4 | 1643 |
| Zone rurale | | 6,1 | 3,4 | 8,7 | 9,8 | 6,5 | 13,2 | 78,0 | 73,3 | 82,8 | 6,0 | 3,1 | 8,9 | 454 |
| Suisse alémanique | | 3,5 | 2,3 | 4,7 | 7,1 | 5,4 | 8,8 | 81,3 | 78,7 | 83,9 | 8,1 | 6,3 | 9,9 | 1040 |
| Suisse romande | | 8,9 | 6,8 | 11,0 | 11,9 | 9,6 | 14,2 | 75,6 | 72,7 | 78,6 | 3,6 | 2,5 | 4,7 | 1869 |
| Suisse italienne | | 10,7 | 7,3 | 14,1 | 8,1 | 5,0 | 11,1 | 78,4 | 73,8 | 82,9 | 2,9 | 1,0 | 4,8 | 329 |
| ZH | | 3,5 | 1,4 | 5,7 | 7,5 | 4,4 | 10,5 | 79,2 | 74,5 | 83,9 | 9,8 | 6,3 | 13,3 | 332 |
| CH sans ZH | | 5,5 | 4,4 | 6,7 | 8,5 | 7,0 | 10,0 | 79,9 | 77,7 | 82,1 | 6,1 | 4,7 | 7,5 | 2906 |
| VD | | 8,7 | 5,4 | 12,0 | 13,4 | 9,4 | 17,4 | 75,1 | 70,1 | 80,1 | 2,8 | 0,9 | 4,6 | 324 |
| CH sans VD | | 4,9 | 3,8 | 5,9 | 7,8 | 6,4 | 9,2 | 80,2 | 78,1 | 82,3 | 7,1 | 5,7 | 8,5 | 2914 |
| VS | | 6,6 | 3,2 | 10,0 | 9,3 | 5,8 | 12,9 | 80,0 | 75,1 | 85,0 | 4,0 | 1,8 | 6,3 | 321 |
| CH sans VS | | 5,1 | 4,1 | 6,2 | 8,3 | 6,9 | 9,6 | 79,8 | 77,7 | 81,8 | 6,8 | 5,5 | 8,2 | 2917 |
| GE | | 7,4 | 5,7 | 9,2 | 10,5 | 8,5 | 12,5 | 76,7 | 73,9 | 79,4 | 5,4 | 3,9 | 6,9 | 1160 |
| CH sans GE | | 5,1 | 4,0 | 6,1 | 8,2 | 6,8 | 9,6 | 80,0 | 77,9 | 82,0 | 6,8 | 5,4 | 8,2 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1590A1 : Au cours des deux dernières années, à quelle fréquence vous êtes-vous fait du souci concernant le fait d'avoir assez d'argent pour acheter des aliments sains ? **OU**

Question Q1590A2 : Au cours des deux dernières années, à quelle fréquence vous êtes-vous fait du souci concernant le fait d'avoir assez d'argent pour payer votre loyer ou votre hypothèque ? **OU**

Question Q1590A3 : Au cours des deux dernières années, à quelle fréquence vous êtes-vous fait du souci concernant le fait d'avoir assez d'argent pour payer d'autres factures mensuelles comme l'électricité, le chauffage et votre téléphone.

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.242 Difficultés matérielles, comparaison internationale (2017, en%)

| | Rencontre toujours ou généralement au moins un type de difficulté matérielle | | | Aucune difficulté matérielle mentionnée | | | NC/NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 20,1 | 17,2 | 23,1 | 79,4 | 76,5 | 82,4 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 1392 |
| DE | 12,1 | 9,6 | 14,7 | 87,3 | 84,7 | 90,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 751 |
| CA | 8,7 | 7,6 | 9,8 | 91,0 | 89,9 | 92,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 4549 |
| CH | 8,0 | 6,7 | 9,2 | 87,1 | 85,5 | 88,7 | 4,9 | 3,8 | 6,1 | 3238 |
| FR | 7,2 | 5,1 | 9,2 | 92,5 | 90,5 | 94,6 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 750 |
| NL | 5,6 | 3,7 | 7,5 | 93,9 | 91,9 | 95,9 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 750 |
| UK | 4,9 | 3,2 | 6,6 | 94,5 | 92,7 | 96,3 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 753 |
| AU | 4,2 | 2,8 | 5,7 | 95,7 | 94,3 | 97,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2500 |
| NZ | 3,8 | 1,9 | 5,7 | 95,4 | 93,3 | 97,5 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 500 |
| SE | 2,9 | 2,4 | 3,4 | 96,5 | 95,9 | 97,0 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 7000 |
| NO | 2,4 | 1,0 | 3,8 | 97,6 | 96,2 | 99,0 | . | . | . | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.243 Difficultés matérielles, Suisse (2017, en%)

| | Rencontre toujours ou généralement au moins un type de difficulté matérielle | | | Aucune difficulté matérielle mentionnée | | | NC/NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 8,0 | 6,7 | 9,2 | 87,1 | 85,5 | 88,7 | 4,9 | 3,8 | 6,1 | 3238 |
| Homme | 8,0 | 6,0 | 9,9 | 88,3 | 86,0 | 90,6 | 3,7 | 2,3 | 5,1 | 1526 |
| Femme | 8,0 | 6,3 | 9,7 | 86,1 | 83,8 | 88,4 | 5,9 | 4,2 | 7,6 | 1712 |
| 65–69 ans | 8,6 | 6,2 | 11,1 | 86,2 | 83,0 | 89,4 | 5,2 | 2,9 | 7,5 | 828 |
| 70–74 ans | 8,7 | 6,1 | 11,2 | 85,6 | 82,3 | 88,9 | 5,7 | 3,4 | 8,1 | 954 |
| 75–79 ans | 9,6 | 6,5 | 12,7 | 85,5 | 81,7 | 89,4 | 4,9 | 2,4 | 7,3 | 697 |
| 80+ ans | 5,1 | 3,1 | 7,1 | 91,0 | 88,3 | 93,7 | 3,9 | 2,0 | 5,8 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 11,2 | 8,2 | 14,2 | 85,1 | 81,6 | 88,6 | 3,7 | 1,6 | 5,8 | 706 |
| Secondaire II | 7,0 | 5,5 | 8,5 | 87,6 | 85,5 | 89,6 | 5,4 | 3,9 | 7,0 | 1765 |
| Tertiaire | 6,2 | 3,5 | 9,0 | 89,4 | 86,0 | 92,9 | 4,4 | 2,2 | 6,6 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 5,6 | 4,3 | 6,8 | 88,5 | 86,6 | 90,3 | 6,0 | 4,5 | 7,4 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 15,0 | 11,6 | 18,3 | 83,2 | 79,7 | 86,6 | 1,9 | 0,6 | 3,1 | 807 |
| Né en Suisse | 6,5 | 5,2 | 7,8 | 88,7 | 86,9 | 90,5 | 4,7 | 3,5 | 6,0 | 2217 |
| Né à l'étranger | 13,5 | 10,3 | 16,7 | 81,1 | 77,3 | 85,0 | 5,4 | 2,9 | 7,8 | 1015 |
| Medical Home | 9,0 | 6,8 | 11,2 | 87,1 | 84,5 | 89,8 | 3,9 | 2,2 | 5,5 | 1249 |
| Sans Medical Home | 13,1 | 9,4 | 16,8 | 82,5 | 78,2 | 86,8 | 4,4 | 1,8 | 6,9 | 726 |
| Malade | 11,4 | 8,5 | 14,2 | 84,9 | 81,6 | 88,2 | 3,8 | 2,0 | 5,6 | 948 |
| Non-malade | 6,4 | 5,0 | 7,7 | 88,3 | 86,4 | 90,2 | 5,3 | 3,9 | 6,7 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 10,7 | 6,9 | 14,5 | 85,7 | 81,2 | 90,2 | 3,6 | 0,9 | 6,2 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 22,3 | 12,8 | 31,9 | 75,4 | 65,6 | 85,1 | 2,3 | 0,0 | 5,0 | 210 |
| Ville | 7,9 | 5,7 | 10,1 | 87,6 | 84,7 | 90,5 | 4,5 | 2,5 | 6,6 | 1026 |
| Agglomération | 7,6 | 5,8 | 9,5 | 87,3 | 85,0 | 89,7 | 5,0 | 3,4 | 6,6 | 1643 |
| Zone rurale | 9,1 | 5,9 | 12,3 | 86,5 | 82,6 | 90,4 | 4,4 | 2,0 | 6,9 | 454 |
| Suisse alémanique | 6,1 | 4,5 | 7,7 | 88,0 | 85,9 | 90,2 | 5,9 | 4,3 | 7,4 | 1040 |
| Suisse romande | 12,1 | 9,8 | 14,4 | 85,0 | 82,6 | 87,5 | 2,9 | 1,9 | 3,9 | 1869 |
| Suisse italienne | 13,7 | 9,9 | 17,5 | 84,4 | 80,4 | 88,4 | 1,9 | 0,4 | 3,4 | 329 |
| ZH | 5,4 | 2,8 | 7,9 | 86,5 | 82,6 | 90,5 | 8,1 | 4,9 | 11,3 | 332 |
| CH sans ZH | 8,5 | 7,1 | 9,9 | 87,2 | 85,4 | 89,0 | 4,3 | 3,1 | 5,5 | 2906 |
| VD | 12,5 | 8,6 | 16,4 | 85,0 | 80,9 | 89,2 | 2,5 | 0,7 | 4,3 | 324 |
| CH sans VD | 7,6 | 6,2 | 8,9 | 87,3 | 85,5 | 89,0 | 5,2 | 3,9 | 6,4 | 2914 |
| VS | 10,0 | 6,1 | 13,9 | 86,3 | 82,0 | 90,6 | 3,7 | 1,5 | 5,9 | 321 |
| CH sans VS | 7,9 | 6,6 | 9,2 | 87,1 | 85,4 | 88,8 | 5,0 | 3,8 | 6,2 | 2917 |
| GE | 11,2 | 9,1 | 13,2 | 85,2 | 82,8 | 87,5 | 3,7 | 2,4 | 4,9 | 1160 |
| CH sans GE | 7,8 | 6,5 | 9,1 | 87,2 | 85,5 | 88,9 | 5,0 | 3,8 | 6,2 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question Q1605 : Au cours des douze derniers mois, combien avez-vous ainsi que votre famille, dépensé pour des traitements ou des services médicaux qui ne sont pas couverts par votre assurance de base obligatoire ou une assurance complémentaire ?

Base : Tous les répondants.

Tableau 6.244 Montant des dépenses médicales (en USD) du ménage non couvertes par l'assurance maladie (base ou complémentaire) au cours des douze derniers mois, comparaison internationale (2017, en %)

| | 2000 ou plus | | | 1000 à moins de 2000 | | | 500 à moins de 1000 | | | 100 à moins de 500 | | | 0 à moins de 100 | | | Pas de dépenses | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| CH | 30,7 | 28,4 | 33,0 | 19,7 | 17,7 | 21,6 | 18,1 | 16,2 | 20,0 | 15,3 | 13,5 | 17,0 | 4,6 | 3,7 | 5,6 | 6,0 | 4,9 | 7,1 | 5,7 | 4,5 | 6,8 | 3238 |
| US | 22,2 | 19,4 | 25,1 | 10,8 | 8,7 | 13,0 | 12,9 | 10,7 | 15,1 | 19,4 | 16,8 | 22,0 | 7,5 | 5,7 | 9,3 | 16,9 | 14,3 | 19,6 | 10,2 | 8,1 | 12,3 | 1392 |
| CA | 9,4 | 8,2 | 10,6 | 11,2 | 9,9 | 12,5 | 15,1 | 13,5 | 16,7 | 27,2 | 25,5 | 28,9 | 10,2 | 9,1 | 11,3 | 20,3 | 18,8 | 21,8 | 6,7 | 5,7 | 7,6 | 4549 |
| AU | 9,0 | 6,7 | 11,2 | 9,0 | 7,1 | 10,9 | 15,3 | 12,5 | 18,1 | 35,4 | 31,7 | 39,1 | 10,2 | 8,1 | 12,2 | 15,9 | 12,9 | 19,0 | 5,2 | 3,4 | 7,0 | 2500 |
| DE | 7,1 | 5,1 | 9,2 | 9,3 | 7,0 | 11,6 | 10,9 | 8,5 | 13,3 | 35,9 | 32,1 | 39,7 | 13,4 | 10,7 | 16,2 | 17,2 | 14,2 | 20,2 | 6,2 | 4,3 | 8,0 | 751 |
| NO | 6,1 | 4,1 | 8,1 | 7,1 | 5,0 | 9,1 | 14,9 | 11,8 | 18,1 | 46,1 | 41,8 | 50,4 | 9,2 | 6,7 | 11,7 | 11,8 | 9,1 | 14,6 | 4,7 | 2,9 | 6,6 | 750 |
| SE | 5,1 | 4,5 | 5,8 | 10,5 | 9,6 | 11,4 | 25,9 | 24,6 | 27,2 | 41,1 | 39,6 | 42,5 | 7,5 | 6,7 | 8,2 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 7,2 | 6,4 | 8,0 | 7000 |
| NZ | 4,5 | 2,1 | 6,8 | 3,1 | 1,4 | 4,9 | 8,3 | 5,4 | 11,1 | 36,2 | 31,3 | 41,2 | 14,7 | 11,0 | 18,3 | 24,2 | 19,8 | 28,6 | 8,9 | 6,3 | 11,6 | 500 |
| UK | 3,4 | 1,9 | 4,8 | 2,6 | 1,4 | 3,9 | 4,7 | 3,1 | 6,3 | 18,8 | 15,6 | 21,9 | 14,1 | 11,3 | 16,9 | 51,4 | 47,4 | 55,4 | 5,1 | 3,3 | 6,9 | 753 |
| NL | 3,4 | 2,0 | 4,9 | 5,2 | 3,5 | 6,9 | 11,5 | 9,0 | 14,0 | 31,4 | 27,8 | 35,0 | 12,7 | 10,1 | 15,2 | 28,6 | 25,1 | 32,1 | 7,1 | 5,1 | 9,2 | 750 |
| FR | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 7,2 | 5,2 | 9,2 | 17,2 | 14,3 | 20,1 | 23,7 | 20,4 | 27,0 | 39,1 | 35,3 | 42,9 | 10,4 | 8,1 | 12,8 | 750 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.245 Montant des dépenses médicales (en USD) du ménage non couvertes par l'assurance maladie (base ou complémentaire) au cours des douze derniers mois, comparaison internationale (2014, en %)

| | 2000 ou plus | | | 1000 à moins de 2000 | | | 500 à moins de 1000 | | | 100 à moins de 500 | | | Moins de 100 | | | Pas de dépenses | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|-----------|--------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| US | 19,7 | 16,8 | 22,5 | 12,6 | 10,0 | 15,1 | 14,1 | 11,6 | 16,6 | 23,0 | 19,9 | 26,2 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 18,0 | 15,1 | 20,9 | 4,7 | 3,0 | 6,3 | 1116 |
| CH | 19,0 | 16,1 | 21,9 | 13,2 | 10,8 | 15,7 | 14,9 | 12,3 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 20,5 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 21,0 | 18,0 | 24,0 | 11,5 | 9,2 | 13,9 | 1084 |
| AU | 11,9 | 8,0 | 15,7 | 8,2 | 5,4 | 11,0 | 13,0 | 8,8 | 17,2 | 24,1 | 19,4 | 28,8 | 10,6 | 6,9 | 14,4 | 23,4 | 18,7 | 28,2 | 8,7 | 6,1 | 11,4 | 1670 |
| CA | 8,5 | 7,1 | 10,0 | 9,5 | 8,2 | 10,8 | 14,1 | 12,4 | 15,8 | 26,4 | 24,3 | 28,5 | 12,8 | 11,2 | 14,3 | 19,7 | 17,9 | 21,6 | 9,0 | 7,6 | 10,4 | 3147 |
| DE | 6,7 | 4,2 | 9,2 | 7,0 | 4,2 | 9,8 | 8,3 | 5,4 | 11,1 | 36,3 | 31,3 | 41,4 | 17,8 | 13,6 | 21,9 | 14,9 | 11,3 | 18,4 | 9,1 | 5,9 | 12,3 | 547 |
| SE | 5,7 | 4,7 | 6,6 | 9,7 | 8,5 | 10,9 | 23,2 | 21,6 | 24,8 | 40,1 | 38,2 | 42,0 | 6,2 | 5,3 | 7,1 | 4,7 | 4,0 | 5,5 | 10,4 | 9,1 | 11,6 | 5000 |
| NO | 5,2 | 3,2 | 7,2 | 7,8 | 5,2 | 10,4 | 14,2 | 11,0 | 17,4 | 41,3 | 36,7 | 46,0 | 9,8 | 6,9 | 12,7 | 12,7 | 9,6 | 15,8 | 8,9 | 6,1 | 11,8 | 651 |
| NL | 3,5 | 1,7 | 5,4 | 3,1 | 1,2 | 5,0 | 9,4 | 6,5 | 12,3 | 20,6 | 16,6 | 24,6 | 10,7 | 7,4 | 13,9 | 35,2 | 30,3 | 40,0 | 17,6 | 13,3 | 21,8 | 582 |
| NZ | 3,4 | 0,7 | 6,1 | 3,7 | 1,7 | 5,8 | 6,4 | 3,4 | 9,5 | 29,5 | 23,1 | 36,0 | 19,5 | 13,8 | 25,2 | 26,3 | 20,2 | 32,4 | 11,1 | 6,7 | 15,4 | 379 |
| UK | 1,8 | 0,7 | 3,0 | 1,7 | 0,4 | 3,1 | 4,7 | 2,7 | 6,8 | 9,1 | 6,3 | 12,0 | 6,9 | 4,7 | 9,2 | 61,6 | 56,9 | 66,3 | 14,0 | 10,6 | 17,5 | 581 |
| FR | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 2,3 | 26,6 | 23,0 | 30,2 | 28,3 | 24,7 | 32,0 | 23,7 | 20,2 | 27,3 | 19,3 | 16,1 | 22,5 | 860 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Tableau 6.246 Montant des dépenses médicales (en USD) du ménage non couvertes par l'assurance maladie (base ou complémentaire) au cours des douze derniers mois, Suisse (2017, en %)

| | 2000 ou plus | | | 1000 à moins de 2000 | | | 500 à moins de 1000 | | | 100 à moins de 500 | | | 0 à moins de 100 | | | Pas de dépenses | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| | Part | IC | IC | Part | IC | IC | Part | IC | IC | Part | IC | IC | Part | IC | IC | Part | IC | IC | Part | IC | IC | |
| | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | |
| Total | 30,7 | 28,4 | 33,0 | 19,7 | 17,7 | 21,6 | 18,1 | 16,2 | 20,0 | 15,3 | 13,5 | 17,0 | 4,6 | 3,7 | 5,6 | 6,0 | 4,9 | 7,1 | 5,7 | 4,5 | 6,8 | 3238 |
| Homme | 36,6 | 33,1 | 40,1 | 19,9 | 17,1 | 22,8 | 16,6 | 13,9 | 19,2 | 13,8 | 11,4 | 16,3 | 5,1 | 3,4 | 6,7 | 4,5 | 3,1 | 6,0 | 3,5 | 2,4 | 4,7 | 1526 |
| Femme | 26,0 | 23,0 | 29,0 | 19,4 | 16,7 | 22,2 | 19,4 | 16,6 | 22,1 | 16,4 | 13,9 | 18,9 | 4,3 | 3,1 | 5,5 | 7,1 | 5,5 | 8,7 | 7,3 | 5,6 | 9,1 | 1712 |
| 65-69 ans | 31,2 | 26,7 | 35,6 | 22,1 | 18,1 | 26,1 | 17,4 | 13,8 | 20,9 | 16,8 | 13,2 | 20,3 | 6,2 | 3,9 | 8,5 | 4,1 | 2,3 | 6,0 | 2,3 | 1,1 | 3,5 | 828 |
| 70-74 ans | 29,7 | 25,5 | 33,9 | 20,2 | 16,4 | 23,8 | 19,8 | 16,0 | 23,6 | 16,8 | 13,3 | 20,3 | 3,1 | 1,8 | 4,4 | 4,4 | 2,7 | 6,1 | 6,0 | 3,9 | 8,1 | 954 |
| 75-79 ans | 32,5 | 27,5 | 37,6 | 19,6 | 15,4 | 23,8 | 17,7 | 13,5 | 21,9 | 14,4 | 10,6 | 18,2 | 4,2 | 2,3 | 6,1 | 6,2 | 3,8 | 8,6 | 5,4 | 3,1 | 7,7 | 697 |
| 80+ ans | 29,6 | 24,9 | 34,3 | 16,5 | 12,7 | 20,3 | 17,6 | 13,7 | 21,5 | 12,7 | 9,4 | 16 | 4,8 | 2,7 | 6,8 | 9,5 | 6,6 | 12,3 | 9,4 | 6,4 | 12,4 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 23,6 | 19,1 | 28,0 | 19,3 | 15,2 | 23,4 | 18,0 | 14,0 | 22,0 | 17,6 | 13,7 | 21,5 | 5,2 | 3,1 | 7,4 | 8,4 | 5,7 | 11,1 | 7,9 | 5,3 | 10,5 | 706 |
| Secondaire II | 32,7 | 29,7 | 35,7 | 19,6 | 17,0 | 22,1 | 18,6 | 16,1 | 21,1 | 14,6 | 12,4 | 16,8 | 4,1 | 3,0 | 5,3 | 5,5 | 4,2 | 6,9 | 4,8 | 3,5 | 6,2 | 1765 |
| Tertiaire | 35,4 | 30,2 | 40,6 | 21,2 | 16,6 | 25,9 | 16,5 | 12,4 | 20,5 | 14,7 | 10,7 | 18,8 | 5,7 | 2,8 | 8,6 | 3,6 | 1,9 | 5,4 | 2,8 | 1,3 | 4,4 | 740 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 34,7 | 32,0 | 37,5 | 18,7 | 16,5 | 20,9 | 18,2 | 15,9 | 20,4 | 14,6 | 12,6 | 16,6 | 3,9 | 2,9 | 4,9 | 5,1 | 3,8 | 6,3 | 4,8 | 3,6 | 6,0 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 19,0 | 15,2 | 22,9 | 22,4 | 18,2 | 26,6 | 18,0 | 14,2 | 21,8 | 17,2 | 13,6 | 20,8 | 6,8 | 4,5 | 9,1 | 8,5 | 6,1 | 10,9 | 8,1 | 5,6 | 10,6 | 807 |
| Né en Suisse | 32,5 | 29,8 | 35,2 | 19,1 | 16,9 | 21,3 | 17,5 | 15,4 | 19,7 | 16,0 | 13,9 | 18,0 | 4,2 | 3,1 | 5,2 | 5,7 | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 3,8 | 6,2 | 2217 |
| Né à l'étranger | 24,3 | 20,2 | 28,3 | 22,0 | 17,7 | 26,3 | 20,4 | 16,4 | 24,5 | 12,6 | 9,4 | 15,8 | 6,4 | 4,0 | 8,8 | 6,9 | 4,6 | 9,3 | 7,4 | 4,9 | 9,9 | 1015 |
| Medical Home | 37,2 | 33,4 | 41,1 | 20,8 | 17,6 | 24,1 | 17,9 | 14,8 | 21,0 | 13,5 | 10,9 | 16,1 | 3,7 | 2,2 | 5,2 | 3,6 | 2,2 | 4,9 | 3,3 | 2,0 | 4,6 | 1249 |
| Sans Medical Home | 29,8 | 24,7 | 34,9 | 19,7 | 15,2 | 24,3 | 19,4 | 14,9 | 23,8 | 15,0 | 10,8 | 19,1 | 5,8 | 3,4 | 8,3 | 3,9 | 2,2 | 5,5 | 6,4 | 3,8 | 9,0 | 726 |
| Malade | 32,6 | 28,3 | 36,9 | 24,0 | 20,0 | 28,0 | 14,5 | 11,2 | 17,7 | 13,3 | 10,2 | 16,4 | 3,4 | 1,9 | 4,8 | 5,7 | 3,5 | 7,9 | 6,6 | 4,3 | 8,8 | 948 |
| Non-malade | 30,2 | 27,4 | 32,9 | 17,8 | 15,5 | 20,1 | 19,5 | 17,1 | 21,9 | 16,1 | 13,9 | 18,3 | 5,1 | 3,9 | 6,4 | 6,2 | 4,9 | 7,6 | 5,1 | 3,8 | 6,3 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 37,7 | 31,4 | 44,0 | 25,5 | 19,7 | 31,4 | 13,1 | 8,6 | 17,6 | 13,0 | 8,6 | 17,4 | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 4,5 | 1,7 | 7,3 | 4,9 | 2,4 | 7,4 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 26,8 | 17,8 | 35,9 | 25,6 | 15,6 | 35,6 | 18,5 | 10,0 | 27,1 | 11,8 | 4,9 | 18,7 | 4,2 | 0,7 | 7,6 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 10,6 | 3,5 | 17,8 | 210 |
| Ville | 28,4 | 24,2 | 32,5 | 22,4 | 18,5 | 26,2 | 19,2 | 15,5 | 22,9 | 14,8 | 11,6 | 18,0 | 4,9 | 3,1 | 6,8 | 4,7 | 3,0 | 6,3 | 5,7 | 3,7 | 7,6 | 1026 |
| Agglomération | 33,8 | 30,4 | 37,1 | 16,1 | 13,5 | 18,7 | 18,8 | 16,0 | 21,7 | 14,2 | 11,8 | 16,7 | 4,4 | 3,0 | 5,9 | 6,1 | 4,4 | 7,8 | 6,5 | 4,7 | 8,3 | 1643 |
| Zone rurale | 26,4 | 21,4 | 31,4 | 23,6 | 18,7 | 28,5 | 16,6 | 12,3 | 21,0 | 17,6 | 13,3 | 21,9 | 4,6 | 2,4 | 6,9 | 7,0 | 4,3 | 9,7 | 4,2 | 2,0 | 6,3 | 454 |
| Suisse alémanique | 32,4 | 29,4 | 35,5 | 20,5 | 17,9 | 23,2 | 18,3 | 15,8 | 20,9 | 14,3 | 12,0 | 16,7 | 3,4 | 2,2 | 4,6 | 5,4 | 3,9 | 6,8 | 5,6 | 4,1 | 7,1 | 1040 |
| Suisse romande | 28,3 | 25,4 | 31,3 | 17,7 | 15,1 | 20,2 | 17,5 | 14,9 | 20,2 | 16,9 | 14,3 | 19,4 | 7,3 | 5,5 | 9,1 | 7,3 | 5,6 | 8,9 | 5,0 | 3,6 | 6,3 | 1869 |
| Suisse italienne | 19,0 | 14,6 | 23,3 | 17,2 | 12,9 | 21,5 | 17,9 | 13,5 | 22,3 | 20,1 | 15,6 | 24,5 | 8,6 | 5,5 | 11,8 | 7,9 | 5,0 | 10,8 | 9,2 | 6,1 | 12,4 | 329 |
| ZH | 32,5 | 27,3 | 37,7 | 20,7 | 16,2 | 25,2 | 18,5 | 14,2 | 22,8 | 12,2 | 8,4 | 16,0 | 1,6 | 0,2 | 2,9 | 7,6 | 4,6 | 10,5 | 7,0 | 4,1 | 9,8 | 332 |
| CH sans ZH | 30,3 | 27,8 | 32,8 | 19,5 | 17,3 | 21,7 | 18,0 | 15,9 | 20,2 | 15,9 | 13,9 | 17,9 | 5,3 | 4,1 | 6,4 | 5,6 | 4,4 | 6,8 | 5,4 | 4,2 | 6,6 | 2906 |
| VD | 28,4 | 23,2 | 33,6 | 16,7 | 12,4 | 21,0 | 16,2 | 12,0 | 20,4 | 18,2 | 13,8 | 22,6 | 6,2 | 3,5 | 8,9 | 8,3 | 5,2 | 11,3 | 6,0 | 3,4 | 8,6 | 324 |
| CH sans VD | 30,9 | 28,5 | 33,4 | 19,9 | 17,8 | 22,1 | 18,3 | 16,2 | 20,4 | 15,0 | 13,1 | 16,9 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 5,8 | 4,6 | 6,9 | 5,6 | 4,4 | 6,8 | 2914 |
| VS | 24,6 | 19,4 | 29,8 | 14,5 | 10,3 | 18,7 | 11,4 | 7,8 | 15,0 | 21,2 | 16,4 | 26,0 | 9,8 | 6,0 | 13,7 | 9,8 | 6,6 | 13,1 | 8,7 | 5,7 | 11,7 | 321 |
| CH sans VS | 31,0 | 28,6 | 33,3 | 19,9 | 17,8 | 22,0 | 18,4 | 16,4 | 20,4 | 15,0 | 13,2 | 16,8 | 4,4 | 3,4 | 5,4 | 5,8 | 4,6 | 6,9 | 5,5 | 4,4 | 6,7 | 2917 |
| GE | 37,1 | 34,1 | 40,1 | 18,7 | 16,3 | 21,1 | 14,4 | 12,3 | 16,6 | 14,1 | 11,9 | 16,2 | 5,4 | 4,0 | 6,9 | 6,5 | 5,0 | 8,0 | 3,8 | 2,6 | 4,9 | 1160 |
| CH sans GE | 30,3 | 27,9 | 32,7 | 19,7 | 17,6 | 21,8 | 18,3 | 16,3 | 20,4 | 15,3 | 13,5 | 17,2 | 4,6 | 3,6 | 5,6 | 5,9 | 4,8 | 7,1 | 5,8 | 4,6 | 6,9 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.247 Montant des dépenses médicales (en USD) du ménage non couvertes par l'assurance maladie (base ou complémentaire) au cours des douze derniers mois, Suisse (2014, en %)

| | 2000 ou plus | | | 1000 à moins de 2000 | | | 500 à moins de 1000 | | | 100 à moins de 500 | | | Moins de 100 | | | Pas de dépenses | | | NSP/NR | | | Échantillon n |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | Part | IC | IC | Part | IC | IC | Part | IC | IC | Part | IC | IC | Part | IC | IC | Part | IC | IC | Part | IC | IC | |
| | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | en % | limite inf. | limite sup. | |
| Total | 19,0 | 16,1 | 21,9 | 13,2 | 10,8 | 15,7 | 14,9 | 12,3 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 20,5 | 2,9 | 1,8 | 4,0 | 21,0 | 18,0 | 24,0 | 11,5 | 9,2 | 13,9 | 1084 |
| Homme | 24,5 | 19,7 | 29,3 | 14,3 | 10,6 | 18,1 | 14,0 | 10,3 | 17,8 | 15,7 | 11,1 | 20,3 | 1,8 | 0,6 | 3,0 | 21,3 | 16,5 | 26,1 | 8,3 | 5,4 | 11,3 | 493 |
| Femme | 14,9 | 11,4 | 18,4 | 12,4 | 9,2 | 15,6 | 15,5 | 11,9 | 19,0 | 18,8 | 14,8 | 22,8 | 3,7 | 2,0 | 5,4 | 20,7 | 16,9 | 24,6 | 13,9 | 10,5 | 17,3 | 591 |
| 65-69 ans | 23,7 | 18,0 | 29,5 | 15,7 | 10,8 | 20,5 | 15,2 | 10,9 | 19,5 | 17,7 | 11,6 | 23,7 | 3,6 | 1,4 | 5,8 | 17,5 | 12,9 | 22,1 | 6,6 | 3,4 | 9,8 | 349 |
| 70-74 ans | 23,1 | 17,2 | 29,0 | 11,0 | 7,0 | 15,0 | 22,2 | 16,0 | 28,4 | 13,4 | 8,9 | 17,9 | 4,3 | 1,3 | 7,4 | 17,1 | 11,7 | 22,4 | 8,9 | 5,2 | 12,5 | 300 |
| 75-79 ans | 19,1 | 12,4 | 25,8 | 15,2 | 9,6 | 20,7 | 9,3 | 4,6 | 14,0 | 21,3 | 14,6 | 27,9 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 21,3 | 14,4 | 28,1 | 12,7 | 7,5 | 17,9 | 209 |
| 80+ ans | 9,3 | 5,0 | 13,5 | 10,8 | 5,9 | 15,8 | 12,2 | 7,0 | 17,4 | 17,9 | 11,2 | 24,5 | 2,2 | 0,4 | 3,9 | 28,7 | 21,4 | 36,1 | 19,0 | 12,7 | 25,2 | 226 |
| Scolarité obligatoire | 8,3 | 4,2 | 12,4 | 11,1 | 6,1 | 16,1 | 8,3 | 4,5 | 12,0 | 24,6 | 16,3 | 32,8 | 2,8 | 0,7 | 4,9 | 26,0 | 18,5 | 33,5 | 18,9 | 12,4 | 25,5 | 216 |
| Secondaire II | 21,5 | 17,6 | 25,5 | 14,4 | 11,1 | 17,6 | 17,1 | 13,5 | 20,6 | 14,7 | 11,4 | 18,0 | 2,9 | 1,5 | 4,4 | 20,6 | 16,9 | 24,4 | 8,8 | 6,2 | 11,3 | 628 |
| Tertiaire | 27,6 | 20,7 | 34,6 | 11,7 | 7,2 | 16,2 | 16,0 | 9,8 | 22,3 | 19,2 | 11,0 | 27,3 | 3,2 | 0,5 | 5,8 | 11,9 | 7,3 | 16,4 | 10,4 | 5,5 | 15,3 | 224 |
| Revenu sup. à la moyenne | 32,7 | 24,5 | 40,9 | 12,5 | 7,1 | 17,9 | 14,0 | 7,4 | 20,5 | 14,3 | 7,8 | 20,8 | 2,7 | 0,0 | 5,6 | 17,6 | 10,7 | 24,4 | 6,2 | 2,0 | 10,4 | 180 |
| Revenu dans la moyenne | 19,6 | 12,4 | 26,8 | 11,6 | 6,7 | 16,6 | 19,1 | 11,8 | 26,4 | 14,2 | 8,3 | 20,0 | 2,0 | 0,3 | 3,6 | 22,9 | 15,9 | 30,0 | 10,7 | 5,5 | 15,9 | 204 |
| Revenu inf. à la moyenne | 16,4 | 12,9 | 19,9 | 14,3 | 11,0 | 17,6 | 14,7 | 11,5 | 17,8 | 19,5 | 15,4 | 23,6 | 3,4 | 1,9 | 5,0 | 21,4 | 17,5 | 25,4 | 10,2 | 7,4 | 13,1 | 645 |
| Né en Suisse | 19,9 | 16,7 | 23,1 | 13,2 | 10,5 | 15,8 | 14,5 | 11,7 | 17,3 | 18,2 | 14, | | | | | | | | | | | |

Question QSWISS0 : Dans les deux dernières années, avez-vous...

- envoyé un email à un professionnel de la santé pour une question médicale ?
- visionné sur internet ou téléchargé des informations sur votre santé, comme des résultats de tests ou de laboratoires ?
- utilisé internet pour vous informer sur des sujets concernant la santé ?
- utilisé une application numérique pour recueillir des informations sur votre santé mais pas pour les partager avec un professionnel de la santé ?
- utilisé une application numérique pour recueillir des informations sur votre santé afin de les partager avec un professionnel de la santé ?

Base : Tous les répondants pour la Suisse.

Tableau 6.248 Recours aux instruments de cybersanté au cours des deux dernières années, Suisse (2017, en %)

| | A envoyé un email à un professionnel de la santé pour une question médicale | | | A visionné sur internet ou téléchargé des informations sur sa santé, comme des résultats de tests ou de laboratoires | | | A utilisé internet pour s'informer sur des sujets concernant la santé | | | A utilisé une application numérique pour recueillir des informations sur sa santé mais pas pour les partager avec un professionnel de la santé | | | A utilisé une application numérique pour recueillir des informations sur sa santé afin de les partager avec un professionnel de la santé | | | Échantillon n |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part de oui en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 5,6 | 4,6 | 6,6 | 13,0 | 11,4 | 14,6 | 43,3 | 40,9 | 45,8 | 10,9 | 9,4 | 12,3 | 6,0 | 4,9 | 7,2 | 3238 |
| Homme | 7,8 | 6,0 | 9,7 | 17,6 | 15,0 | 20,3 | 49,7 | 46,1 | 53,3 | 14,5 | 12,1 | 16,9 | 8,9 | 6,8 | 11,0 | 1526 |
| Femme | 3,8 | 2,7 | 4,9 | 9,4 | 7,5 | 11,3 | 38,2 | 35,0 | 41,5 | 7,9 | 6,2 | 9,7 | 3,7 | 2,5 | 4,9 | 1712 |
| 65–69 ans | 6,5 | 4,5 | 8,6 | 12,1 | 9,1 | 15,2 | 56,2 | 51,5 | 61,0 | 13,2 | 10,1 | 16,4 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 828 |
| 70–74 ans | 7,8 | 5,4 | 10,2 | 16,9 | 13,4 | 20,4 | 52,8 | 48,1 | 57,4 | 14,6 | 11,4 | 17,8 | 6,0 | 3,8 | 8,1 | 954 |
| 75–79 ans | 5,0 | 2,9 | 7,1 | 15,3 | 11,7 | 19,0 | 40,7 | 35,4 | 45,9 | 10,4 | 7,3 | 13,5 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 697 |
| 80+ ans | 2,7 | 1,2 | 4,1 | 8,1 | 5,6 | 10,7 | 21,3 | 17,3 | 25,2 | 4,7 | 2,9 | 6,6 | 2,4 | 1,0 | 3,8 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 1,5 | 0,7 | 2,4 | 7,6 | 4,9 | 10,3 | 22,4 | 18,1 | 26,7 | 4,2 | 2,3 | 6,1 | 1,8 | 0,5 | 3,2 | 706 |
| Secondaire II | 5,4 | 4,0 | 6,7 | 13,2 | 11,1 | 15,3 | 47,0 | 43,9 | 50,2 | 11,9 | 9,9 | 13,9 | 6,8 | 5,2 | 8,4 | 1765 |
| Tertiaire | 15,1 | 11,4 | 18,8 | 23,6 | 18,9 | 28,3 | 66,7 | 61,5 | 71,8 | 19,1 | 14,6 | 23,6 | 10,7 | 7,3 | 14,2 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 6,3 | 5,0 | 7,5 | 15,3 | 13,4 | 17,3 | 49,8 | 47,0 | 52,7 | 11,7 | 10,0 | 13,5 | 7,1 | 5,7 | 8,6 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 3,6 | 1,9 | 5,3 | 6,4 | 4,1 | 8,7 | 24,6 | 20,5 | 28,7 | 8,3 | 5,7 | 11,0 | 2,8 | 1,2 | 4,4 | 807 |
| Né en Suisse | 5,8 | 4,6 | 7,0 | 13,9 | 12,0 | 15,8 | 45,1 | 42,3 | 47,9 | 10,7 | 9,0 | 12,4 | 6,0 | 4,7 | 7,3 | 2217 |
| Né à l'étranger | 4,7 | 3,2 | 6,3 | 10,1 | 7,4 | 12,7 | 37,2 | 32,5 | 41,9 | 11,6 | 8,6 | 14,6 | 6,1 | 3,9 | 8,4 | 1015 |
| Medical Home | 7,0 | 5,2 | 8,8 | 16,8 | 13,9 | 19,7 | 52,4 | 48,4 | 56,4 | 13,4 | 10,8 | 16,0 | 7,2 | 5,2 | 9,2 | 1249 |
| Sans Medical Home | 7,2 | 4,6 | 9,9 | 14,8 | 10,9 | 18,8 | 45,7 | 40,1 | 51,2 | 15,1 | 11,0 | 19,2 | 8,4 | 5,2 | 11,7 | 726 |
| Malade | 6,0 | 4,0 | 7,9 | 13,0 | 10,1 | 15,9 | 41,3 | 36,8 | 45,8 | 10,5 | 7,9 | 13,0 | 5,9 | 3,9 | 8,0 | 948 |
| Non-malade | 5,3 | 4,1 | 6,5 | 13,3 | 11,3 | 15,3 | 45,1 | 42,2 | 48,1 | 11,1 | 9,3 | 12,9 | 6,2 | 4,8 | 7,6 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 5,4 | 2,8 | 8,0 | 12,4 | 8,5 | 16,4 | 47,4 | 40,9 | 54,0 | 10,3 | 6,9 | 13,7 | 5,3 | 2,9 | 7,6 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 9,4 | 4,4 | 14,4 | 21,0 | 12,5 | 29,6 | 49,4 | 38,5 | 60,2 | 24,1 | 14,3 | 33,9 | 14,3 | 6,1 | 22,6 | 210 |
| Ville | 6,8 | 4,7 | 8,8 | 13,3 | 10,4 | 16,2 | 42,6 | 38,2 | 47,1 | 10,9 | 8,2 | 13,6 | 6,3 | 4,2 | 8,4 | 1026 |
| Agglomération | 6,1 | 4,5 | 7,6 | 15,4 | 12,8 | 18,0 | 47,6 | 44,0 | 51,1 | 11,6 | 9,5 | 13,8 | 6,4 | 4,7 | 8,2 | 1643 |
| Zone rurale | 4,1 | 2,0 | 6,2 | 8,8 | 5,9 | 11,7 | 36,7 | 31,2 | 42,2 | 9,3 | 6,2 | 12,5 | 4,4 | 2,0 | 6,7 | 454 |
| Suisse alémanique | 4,9 | 3,6 | 6,2 | 12,7 | 10,6 | 14,8 | 43,6 | 40,4 | 46,9 | 9,5 | 7,6 | 11,4 | 5,4 | 3,9 | 6,9 | 1040 |
| Suisse romande | 7,4 | 6,0 | 8,9 | 14,8 | 12,4 | 17,2 | 44,2 | 40,9 | 47,5 | 14,9 | 12,5 | 17,3 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 1869 |
| Suisse italienne | 6,2 | 3,7 | 8,6 | 9,3 | 6,1 | 12,4 | 35,7 | 30,3 | 41,1 | 11,2 | 7,7 | 14,8 | 7,4 | 4,4 | 10,4 | 329 |
| ZH | 7,1 | 4,4 | 9,8 | 17,5 | 13,4 | 21,6 | 49,5 | 44,0 | 55,1 | 9,6 | 6,4 | 12,8 | 4,5 | 2,3 | 6,7 | 332 |
| CH sans ZH | 5,3 | 4,2 | 6,4 | 12,1 | 10,4 | 13,9 | 42,1 | 39,4 | 44,8 | 11,1 | 9,5 | 12,8 | 6,3 | 5,0 | 7,6 | 2906 |
| VD | 7,4 | 4,6 | 10,3 | 16,1 | 11,9 | 20,2 | 46,6 | 40,9 | 52,2 | 14,0 | 10,1 | 17,9 | 7,5 | 4,6 | 10,5 | 324 |
| CH sans VD | 5,4 | 4,3 | 6,5 | 12,8 | 11,0 | 14,5 | 43,0 | 40,4 | 45,6 | 10,6 | 9,0 | 12,1 | 5,9 | 4,6 | 7,1 | 2914 |
| VS | 5,7 | 2,6 | 8,7 | 12,7 | 8,5 | 16,9 | 37,8 | 32,0 | 43,6 | 13,1 | 9,0 | 17,3 | 5,6 | 2,7 | 8,6 | 321 |
| CH sans VS | 5,6 | 4,5 | 6,6 | 13,1 | 11,4 | 14,7 | 43,6 | 41,1 | 46,1 | 10,8 | 9,3 | 12,3 | 6,0 | 4,8 | 7,2 | 2917 |
| GE | 12,0 | 9,9 | 14,0 | 16,4 | 14,1 | 18,7 | 50,4 | 47,3 | 53,5 | 16,6 | 14,3 | 18,9 | 7,8 | 6,1 | 9,4 | 1160 |
| CH sans GE | 5,2 | 4,1 | 6,3 | 12,8 | 11,2 | 14,5 | 42,9 | 40,3 | 45,5 | 10,5 | 9,0 | 12,1 | 5,9 | 4,7 | 7,1 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Question QSWISS1 : En ce qui concerne des soins ou traitements médicaux de base : pourriez-vous imaginer recevoir la suite du traitement par un autre professionnel spécialisé de la santé (ex. infirmières et infirmiers spécialisés) au lieu d'un docteur ?

Base : Tous les répondants pour la Suisse.

Tableau 6.249 Pourrait imaginer recevoir les suites d'un traitement par des professionnels de la santé non médicaux, Suisse (2017, en%)

| | Oui | | | Non | | | NSP/NR | | Échantillon | |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | n |
| Total | 60,5 | 58,1 | 62,8 | 36,3 | 34,0 | 38,6 | 3,2 | 2,4 | 4,0 | 3238 |
| Homme | 66,4 | 63,1 | 69,6 | 31,5 | 28,3 | 34,7 | 2,1 | 1,2 | 3,0 | 1526 |
| Femme | 55,8 | 52,5 | 59,1 | 40,1 | 36,9 | 43,4 | 4,1 | 2,8 | 5,4 | 1712 |
| 65-69 ans | 61,7 | 57,2 | 66,2 | 36,2 | 31,8 | 40,7 | 2,1 | 0,7 | 3,4 | 828 |
| 70-74 ans | 65,1 | 60,8 | 69,3 | 32,2 | 28,0 | 36,3 | 2,8 | 1,4 | 4,2 | 954 |
| 75-79 ans | 59,8 | 54,7 | 65,0 | 36,3 | 31,3 | 41,4 | 3,9 | 2,0 | 5,7 | 697 |
| 80+ ans | 55,0 | 50,1 | 60,0 | 40,5 | 35,6 | 45,5 | 4,4 | 2,5 | 6,3 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 48,4 | 43,3 | 53,6 | 47,6 | 42,5 | 52,7 | 4,0 | 2,2 | 5,8 | 706 |
| Secondaire II | 62,3 | 59,3 | 65,4 | 34,8 | 31,9 | 37,8 | 2,8 | 1,8 | 3,8 | 1765 |
| Tertiaire | 76,5 | 72,4 | 80,6 | 21,4 | 17,5 | 25,3 | 2,1 | 0,7 | 3,5 | 740 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 63,5 | 60,8 | 66,2 | 34,0 | 31,4 | 36,6 | 2,5 | 1,7 | 3,3 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 51,9 | 47,0 | 56,7 | 43,0 | 38,2 | 47,7 | 5,2 | 3,0 | 7,3 | 807 |
| Né en Suisse | 63,7 | 61,0 | 66,4 | 33,6 | 30,9 | 36,2 | 2,8 | 1,9 | 3,6 | 2217 |
| Né à l'étranger | 49,3 | 44,4 | 54,2 | 46,8 | 41,9 | 51,7 | 3,9 | 2,1 | 5,7 | 1015 |
| Medical Home | 59,5 | 55,7 | 63,3 | 38,4 | 34,6 | 42,2 | 2,1 | 1,1 | 3,1 | 1249 |
| Sans Medical Home | 58,2 | 52,9 | 63,6 | 40,3 | 35,0 | 45,6 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 726 |
| Malade | 55,1 | 50,6 | 59,6 | 42,2 | 37,7 | 46,6 | 2,7 | 1,3 | 4,2 | 948 |
| Non-malade | 63,2 | 60,4 | 66,0 | 33,6 | 30,8 | 36,3 | 3,2 | 2,2 | 4,1 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 53,4 | 47,0 | 59,9 | 44,0 | 37,6 | 50,4 | 2,6 | 0,7 | 4,4 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 49,6 | 38,7 | 60,4 | 49,2 | 38,4 | 60,0 | 1,3 | 0,0 | 2,6 | 210 |
| Ville | 56,5 | 52,0 | 60,9 | 39,2 | 34,8 | 43,5 | 4,4 | 2,5 | 6,3 | 1026 |
| Agglomération | 60,7 | 57,3 | 64,1 | 36,3 | 32,9 | 39,7 | 3,0 | 1,9 | 4,1 | 1643 |
| Zone rurale | 64,0 | 58,7 | 69,4 | 33,4 | 28,1 | 38,7 | 2,6 | 1,0 | 4,1 | 454 |
| Suisse alémanique | 66,6 | 63,5 | 69,8 | 30,7 | 27,7 | 33,7 | 2,6 | 1,6 | 3,7 | 1040 |
| Suisse romande | 48,3 | 44,9 | 51,6 | 47,5 | 44,1 | 50,8 | 4,3 | 3,1 | 5,4 | 1869 |
| Suisse italienne | 35,8 | 30,5 | 41,2 | 58,3 | 52,8 | 63,8 | 5,8 | 3,3 | 8,3 | 329 |
| ZH | 64,2 | 58,8 | 69,6 | 33,7 | 28,4 | 39,0 | 2,1 | 0,5 | 3,6 | 332 |
| CH sans ZH | 59,7 | 57,1 | 62,3 | 36,8 | 34,3 | 39,4 | 3,5 | 2,5 | 4,4 | 2906 |
| VD | 47,3 | 41,7 | 53,0 | 48,0 | 42,4 | 53,7 | 4,6 | 2,4 | 6,8 | 324 |
| CH sans VD | 61,7 | 59,2 | 64,2 | 35,2 | 32,7 | 37,7 | 3,1 | 2,2 | 3,9 | 2914 |
| VS | 51,3 | 45,5 | 57,2 | 42,4 | 36,6 | 48,2 | 6,3 | 3,6 | 9,0 | 321 |
| CH sans VS | 60,9 | 58,5 | 63,3 | 36,0 | 33,6 | 38,4 | 3,1 | 2,2 | 3,9 | 2917 |
| GE | 44,6 | 41,5 | 47,6 | 52,3 | 49,3 | 55,4 | 3,1 | 2,1 | 4,1 | 1160 |
| CH sans GE | 61,4 | 58,9 | 63,9 | 35,4 | 32,9 | 37,8 | 3,2 | 2,4 | 4,1 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Tableau 6.250 Pourrait imaginer recevoir les suites d'un traitement par des professionnels de la santé non médicaux, Suisse
(2014, en%)

| | Oui | | | Non | | | Échantillon n |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | |
| Total | 59,9 | 56,2 | 63,6 | 40,1 | 36,4 | 43,8 | 1001 |
| Homme | 63,7 | 58,2 | 69,2 | 36,3 | 30,8 | 41,8 | 462 |
| Femme | 57,0 | 51,9 | 62,0 | 43,0 | 38,0 | 48,1 | 539 |
| 65–69 ans | 64,6 | 58,0 | 71,2 | 35,4 | 28,8 | 42,0 | 325 |
| 70–74 ans | 63,6 | 56,9 | 70,3 | 36,4 | 29,7 | 43,1 | 282 |
| 75–79 ans | 59,1 | 50,8 | 67,4 | 40,9 | 32,6 | 49,2 | 190 |
| 80+ ans | 50,8 | 42,3 | 59,3 | 49,2 | 40,7 | 57,7 | 204 |
| Scolarité obligatoire | 51,3 | 42,3 | 60,2 | 48,7 | 39,8 | 57,7 | 191 |
| Secondaire II | 64,1 | 59,5 | 68,7 | 35,9 | 31,3 | 40,5 | 592 |
| Tertiaire | 54,1 | 45,3 | 62,9 | 45,9 | 37,1 | 54,7 | 207 |
| Revenu sup. à la moyenne | 64,6 | 56,2 | 72,9 | 35,4 | 27,1 | 43,8 | 171 |
| Revenu dans la moyenne | 65,5 | 57,1 | 73,9 | 34,5 | 26,1 | 42,9 | 192 |
| Revenu inf. à la moyenne | 57,6 | 52,7 | 62,5 | 42,4 | 37,5 | 47,3 | 595 |
| Né en Suisse | 61,9 | 57,8 | 65,9 | 38,1 | 34,1 | 42,2 | 805 |
| Né à l'étranger | 50,5 | 41,1 | 59,9 | 49,5 | 40,1 | 58,9 | 196 |
| Ville | 54,6 | 47,1 | 62,1 | 45,4 | 37,9 | 52,9 | 272 |
| Agglomération | 59,7 | 54,4 | 65,0 | 40,3 | 35,0 | 45,6 | 494 |
| Zone rurale | 65,8 | 58,1 | 73,5 | 34,2 | 26,5 | 41,9 | 235 |
| Medical Home | 59,4 | 53,1 | 65,6 | 40,6 | 34,4 | 46,9 | 363 |
| Sans Medical Home | 62,7 | 53,5 | 71,9 | 37,3 | 28,1 | 46,5 | 170 |
| Malade | 48,9 | 41,5 | 56,2 | 51,1 | 43,8 | 58,5 | 287 |
| Non-malade | 64,4 | 60,1 | 68,7 | 35,6 | 31,3 | 39,9 | 711 |
| Malade avec Medical Home | 52,0 | 41,3 | 62,7 | 48,0 | 37,3 | 58,7 | 138 |
| Malade sans Medical Home | 43,4 | 25,6 | 61,2 | 56,6 | 38,8 | 74,4 | 50 |
| Suisse alémanique | 67,5 | 62,7 | 72,2 | 32,5 | 27,8 | 37,3 | 517 |
| Suisse romande | 40,4 | 34,2 | 46,5 | 59,6 | 53,5 | 65,8 | 321 |
| Suisse italienne | 40,3 | 31,9 | 48,8 | 59,7 | 51,2 | 68,1 | 163 |
| VD | 38,1 | 29,8 | 46,5 | 61,9 | 53,5 | 70,2 | 159 |
| CH sans VD | 61,8 | 57,8 | 65,8 | 38,2 | 34,2 | 42,2 | 842 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2014

© Obsan 2017

Question QSWISS2 : En pensant à l'ensemble des soins médicaux que vous avez reçus au cours des douze derniers mois, diriez-vous que vous avez reçu...

Base : Tous les répondants pour la Suisse.

Tableau 6.251 Opinion concernant la quantité de soins reçus au cours des douze derniers mois, Suisse (2017, en%)

| | Trop peu de soins médicaux | | | La quantité de soins appropriée | | | Trop de soins médicaux | | | Non concerné | | | NSP/NR | | Échantillon n | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|
| | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | IC limite sup. | Part en % | IC limite inf. | | IC limite sup. |
| Total | 2,2 | 1,4 | 2,9 | 86,5 | 84,8 | 88,2 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 9,4 | 8,0 | 10,8 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 3238 |
| Homme | 2,0 | 0,9 | 3,1 | 86,5 | 84,1 | 89,0 | 1,7 | 0,7 | 2,8 | 9,1 | 7,1 | 11,1 | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 1526 |
| Femme | 2,3 | 1,3 | 3,3 | 86,5 | 84,2 | 88,8 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 9,7 | 7,7 | 11,7 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 1712 |
| 65-69 ans | 3,0 | 1,3 | 4,7 | 84,9 | 81,6 | 88,2 | 1,4 | 0,2 | 2,6 | 10,1 | 7,5 | 12,7 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 828 |
| 70-74 ans | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 86,6 | 83,5 | 89,8 | 1,1 | 0,2 | 2,1 | 10,9 | 8,0 | 13,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 954 |
| 75-79 ans | 3,0 | 1,0 | 5,1 | 86,4 | 82,7 | 90,1 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 8,6 | 5,6 | 11,7 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 697 |
| 80+ ans | 1,7 | 0,4 | 2,9 | 88,3 | 85,0 | 91,6 | 1,2 | 0,0 | 2,3 | 7,8 | 5,0 | 10,7 | 1,0 | 0,1 | 1,9 | 759 |
| Scolarité obligatoire | 3,1 | 1,2 | 5,0 | 87,4 | 84,1 | 90,7 | 1,6 | 0,3 | 3,0 | 7,3 | 4,8 | 9,8 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 706 |
| Secondaire II | 1,6 | 0,7 | 2,4 | 86,8 | 84,6 | 89,0 | 1,1 | 0,5 | 1,8 | 9,9 | 8,0 | 11,8 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1765 |
| Tertiaire | 3,5 | 1,2 | 5,8 | 84,3 | 79,9 | 88,7 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 11,6 | 7,8 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 740 |
| En dessus du seuil de pauvreté | 1,7 | 0,9 | 2,5 | 87,6 | 85,7 | 89,5 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 9,3 | 7,6 | 10,9 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 2431 |
| En dessous du seuil de pauvreté | 3,6 | 1,7 | 5,5 | 83,3 | 79,7 | 87,0 | 2,1 | 0,7 | 3,6 | 9,9 | 7,0 | 12,8 | 1,1 | 0,2 | 1,9 | 807 |
| Né en Suisse | 1,8 | 1,0 | 2,6 | 87,4 | 85,5 | 89,3 | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 9,0 | 7,4 | 10,6 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 2217 |
| Né à l'étranger | 3,5 | 1,5 | 5,4 | 84,1 | 80,5 | 87,7 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 11,2 | 8,1 | 14,3 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1015 |
| Medical Home | 1,5 | 0,4 | 2,5 | 95,4 | 93,7 | 97,0 | 1,1 | 0,3 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 1249 |
| Sans Medical Home | 5,6 | 2,8 | 8,4 | 79,9 | 75,4 | 84,4 | 1,4 | 0,2 | 2,7 | 12,4 | 8,7 | 16,1 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 726 |
| Malade | 2,4 | 0,9 | 3,8 | 93,9 | 91,8 | 96,1 | 1,2 | 0,2 | 2,2 | 2,0 | 0,8 | 3,2 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 948 |
| Non-malade | 2,0 | 1,1 | 2,9 | 83,4 | 81,1 | 85,6 | 1,1 | 0,5 | 1,8 | 12,8 | 10,8 | 14,8 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 2188 |
| Malade avec Medical Home | 1,5 | 0,0 | 3,3 | 96,1 | 93,6 | 98,6 | 1,1 | 0,0 | 2,4 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 463 |
| Malade sans Medical Home | 5,7 | 0,4 | 11,0 | 92,8 | 87,4 | 98,2 | 1,1 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 210 |
| Ville | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 85,5 | 82,2 | 88,8 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 10,6 | 7,7 | 13,5 | 0,8 | 0,2 | 1,5 | 1026 |
| Agglomération | 2,4 | 1,2 | 3,6 | 86,0 | 83,6 | 88,5 | 1,0 | 0,4 | 1,7 | 9,6 | 7,6 | 11,7 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 1643 |
| Zone rurale | 1,4 | 0,0 | 2,9 | 88,4 | 84,8 | 92,0 | 2,3 | 0,3 | 4,2 | 7,6 | 4,8 | 10,5 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 454 |
| Suisse alémanique | 2,4 | 1,4 | 3,5 | 87,0 | 84,7 | 89,2 | 1,2 | 0,5 | 1,9 | 8,8 | 6,9 | 10,7 | 0,6 | 0,1 | 1,1 | 1040 |
| Suisse romande | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 85,2 | 82,8 | 87,5 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 11,2 | 9,1 | 13,4 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | 1869 |
| Suisse italienne | 1,2 | 0,1 | 2,4 | 86,8 | 82,9 | 90,7 | 1,5 | 0,0 | 2,9 | 9,5 | 6,1 | 12,9 | 1,0 | 0,0 | 2,2 | 329 |
| ZH | 1,9 | 0,5 | 3,4 | 88,5 | 84,9 | 92,0 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 7,8 | 4,8 | 10,9 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 332 |
| CH sans ZH | 2,2 | 1,4 | 3,1 | 86,1 | 84,2 | 88,0 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 9,7 | 8,1 | 11,4 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 2906 |
| VD | 2,1 | 0,4 | 3,7 | 83,6 | 79,3 | 87,8 | 1,0 | 0,0 | 2,1 | 11,9 | 8,2 | 15,6 | 1,5 | 0,2 | 2,8 | 324 |
| CH sans VD | 2,2 | 1,4 | 3,0 | 86,8 | 85,0 | 88,6 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 9,2 | 7,7 | 10,7 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 2914 |
| VS | 1,4 | 0,1 | 2,7 | 85,1 | 80,9 | 89,4 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 11,2 | 7,3 | 15,0 | 1,7 | 0,3 | 3,1 | 321 |
| CH sans VS | 2,2 | 1,4 | 3,0 | 86,6 | 84,8 | 88,3 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 9,3 | 7,9 | 10,8 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 2917 |
| GE | 2,2 | 1,3 | 3,1 | 85,5 | 83,3 | 87,7 | 1,7 | 0,9 | 2,5 | 9,9 | 8,0 | 11,7 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | 1160 |
| CH sans GE | 2,2 | 1,4 | 3,0 | 86,6 | 84,8 | 88,3 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | 9,4 | 7,9 | 10,9 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 2078 |

Source: Commonwealth Fund – International Health Policy Survey 2017

© Obsan 2017

Index des tableaux des annexes

| | | |
|--------------|---|----|
| Tableau 6.1 | Indicateurs de l'état de santé, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017 | 51 |
| Tableau 6.2 | Indicateurs de la situation financière, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017 | 52 |
| Tableau 6.3 | Indicateurs du recours aux soins, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017 | 52 |
| Tableau 6.4 | Indicateurs de qualité et de coordination, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017 | 53 |
| Tableau 6.5 | Indicateurs des soins de premier recours – Accès au médecin, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017 | 53 |
| Tableau 6.6 | Indicateurs des soins de premier recours – Déroulement de la consultation, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017 | 54 |
| Tableau 6.7 | Indicateurs des soins de premier recours – Pratiques de prévention, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017 | 54 |
| Tableau 6.8 | Indicateurs des soins de premier recours – Aide à la coordination, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017 | 55 |
| Tableau 6.9 | Indicateurs des soins de premier recours, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017 | 55 |
| Tableau 6.10 | Indicateurs de l'expérience du système de santé, variables centrées réduites moyenne, personnes de 65 ans et plus, comparaison internationale, 2017 | 55 |
| Tableau 6.11 | Satisfaction concernant la qualité des soins reçus au cours des douze derniers mois, comparaison internationale (2017, en %) | 58 |
| Tableau 6.12 | Satisfaction concernant la qualité des soins reçus au cours des douze derniers mois, Suisse (2017, en %) | 58 |
| Tableau 6.13 | Renoncement à différents types de soins de santé pour des raisons de coûts, comparaison internationale (2017, en %) | 59 |
| Tableau 6.14 | Renoncement à différents types de soins de santé pour des raisons de coûts, comparaison internationale (2014, en %) | 59 |
| Tableau 6.15 | Renoncement à différents types de soins de santé pour des raisons de coûts, Suisse (2017, en %) | 60 |
| Tableau 6.16 | Renoncement à différents types de soins de santé pour des raisons de coûts, Suisse (2014, en %) | 60 |
| Tableau 6.17 | Renoncement à des soins de santé pour des raisons de coûts (A1-A3), comparaison internationale (2017, en %) | 61 |
| Tableau 6.18 | Renoncement à des soins de santé pour des raisons de coûts (A1-A3), comparaison internationale (2014, en %) | 61 |
| Tableau 6.19 | Renoncement à des soins de santé pour des raisons de coûts (A1-A3), Suisse (2017, en %) | 61 |
| Tableau 6.20 | Renoncement à des soins de santé pour des raisons de coûts (A1-A3), Suisse (2014, en %) | 62 |
| Tableau 6.21 | Difficulté à recevoir des soins médicaux le soir, le week-end ou les jours fériés, comparaison internationale (2017, en %) | 63 |
| Tableau 6.22 | Difficulté à recevoir des soins médicaux le soir, le week-end ou les jours fériés, Suisse (2017, en %) | 63 |
| Tableau 6.23 | Délai pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, comparaison internationale (2017, en %) | 64 |
| Tableau 6.24 | Délai pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, comparaison internationale (2014, en %) | 64 |
| Tableau 6.25 | Délai pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, Suisse (2017, en %) | 64 |
| Tableau 6.26 | Délai pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, Suisse (2014, en %) | 65 |
| Tableau 6.27 | Recours à un médecin ou à un lieu de traitement régulier pour les soins médicaux, comparaison internationale (2017, en %) | 66 |
| Tableau 6.28 | Recours à un médecin ou à un lieu de traitement régulier pour les soins médicaux, comparaison internationale (2014, en %) | 66 |
| Tableau 6.29 | Recours à un médecin ou à un lieu de traitement régulier pour les soins médicaux, Suisse (2017, en %) | 67 |
| Tableau 6.30 | Recours à un médecin ou à un lieu de traitement régulier pour les soins médicaux, Suisse (2014, en %) | 67 |
| Tableau 6.31 | Reçoit une réponse du médecin le jour-même, comparaison internationale (2017, en %) | 68 |
| Tableau 6.32 | Reçoit une réponse du médecin le jour-même, comparaison internationale (2014, en %) | 68 |
| Tableau 6.33 | Reçoit une réponse du médecin le jour-même, Suisse (2017, en %) | 69 |
| Tableau 6.34 | Reçoit une réponse du médecin le jour-même, Suisse (2014, en %) | 69 |
| Tableau 6.35 | Le médecin habituel ou le personnel de santé connaît les informations importantes du passé médical, comparaison internationale (2017, en %) | 70 |
| Tableau 6.36 | Le médecin habituel ou le personnel de santé connaît les informations importantes du passé médical, comparaison internationale (2014, en %) | 70 |

| | | |
|--------------|--|----|
| Tableau 6.37 | Le médecin habituel ou le personnel de santé connaît les informations importantes du passé médical, Suisse (2017, en %) | 71 |
| Tableau 6.38 | Le médecin habituel ou le personnel de santé connaît les informations importantes du passé médical, Suisse (2014, en %) | 71 |
| Tableau 6.39 | Le médecin habituel ou le personnel de santé passe assez de temps avec le patient, comparaison internationale (2017, en %) | 72 |
| Tableau 6.40 | Le médecin habituel ou le personnel de santé passe assez de temps avec le patient, comparaison internationale (2014, en %) | 72 |
| Tableau 6.41 | Le médecin habituel ou le personnel de santé passe assez de temps avec le patient, Suisse (2017, en %) | 73 |
| Tableau 6.42 | Le médecin habituel ou le personnel de santé passe assez de temps avec le patient, Suisse (2014, en %) | 73 |
| Tableau 6.43 | Patient encouragé à poser des questions, comparaison internationale (2017, en %) | 74 |
| Tableau 6.44 | Patient encouragé à poser des questions, comparaison internationale (2014, en %) | 74 |
| Tableau 6.45 | Patient encouragé à poser des questions, Suisse (2017, en %) | 75 |
| Tableau 6.46 | Patient encouragé à poser des questions, Suisse (2014, en %) | 75 |
| Tableau 6.47 | Le médecin habituel ou le personnel de santé explique les choses clairement, comparaison internationale (2017, en %) | 76 |
| Tableau 6.48 | Le médecin habituel ou le personnel de santé explique les choses clairement, comparaison internationale | 76 |
| Tableau 6.49 | Le médecin habituel ou le personnel de santé explique les choses clairement, Suisse (2017, en %) | 77 |
| Tableau 6.50 | Le médecin habituel ou le personnel de santé explique les choses clairement, Suisse (2014, en %) | 77 |
| Tableau 6.51 | Patient impliqué dans les décisions concernant les soins et traitements, comparaison internationale (2017, en %) | 78 |
| Tableau 6.52 | Patient impliqué dans les décisions concernant les soins et traitements, Suisse (2017, en %) | 78 |
| Tableau 6.53 | Relation avec le médecin régulier, comparaison internationale (2017, en %) | 79 |
| Tableau 6.54 | Relation avec le médecin régulier, comparaison internationale (2014, en %) | 79 |
| Tableau 6.55 | Relation avec le médecin régulier, Suisse (2017, en %) | 80 |
| Tableau 6.56 | Relation avec le médecin régulier, Suisse (2014, en %) | 80 |
| Tableau 6.57 | Nombre de médecins différents consultés au cours des douze derniers mois, comparaison internationale (2017, en %) | 81 |
| Tableau 6.58 | Nombre de médecins différents consultés au cours des douze derniers mois, comparaison internationale (2014, en %) | 81 |
| Tableau 6.59 | Nombre de médecins différents consultés au cours des douze derniers mois, Suisse (2017, en %) | 82 |
| Tableau 6.60 | Nombre de médecins différents consultés au cours des douze derniers mois, Suisse (2014, en %) | 82 |
| Tableau 6.61 | Coordination du médecin habituel avec d'autres médecins ou d'autres endroits, comparaison internationale (2017, en %) | 83 |
| Tableau 6.62 | Coordination du médecin habituel avec d'autres médecins ou d'autres endroits, comparaison internationale (2014, en %) | 83 |
| Tableau 6.63 | Coordination du médecin habituel avec d'autres médecins ou d'autres endroits, Suisse (2017, en %) | 84 |
| Tableau 6.64 | Coordination du médecin habituel avec d'autres médecins ou d'autres endroits, Suisse (2014, en %) | 84 |
| Tableau 6.65 | Besoin d'aide à la coordination des soins, comparaison internationale (2017, en %) | 85 |
| Tableau 6.66 | Besoin d'aide à la coordination des soins, Suisse (2017, en %) | 85 |
| Tableau 6.67 | Problèmes de coordination, comparaison internationale (2017, en %) | 86 |
| Tableau 6.68 | Problèmes de coordination, comparaison internationale (2014, en %) | 86 |
| Tableau 6.69 | Problèmes de coordination, Suisse (2017, en %) | 87 |
| Tableau 6.70 | Problèmes de coordination, Suisse (2014, en %) | 88 |
| Tableau 6.71 | Erreur médicale constatée par le patient, comparaison internationale (2017, en %) | 89 |
| Tableau 6.72 | Erreur médicale constatée par le patient, comparaison internationale (2014, en %) | 89 |
| Tableau 6.73 | Erreur médicale constatée par le patient, Suisse (2017, en %) | 90 |
| Tableau 6.74 | Erreur médicale constatée par le patient, Suisse (2014, en %) | 90 |
| Tableau 6.75 | Au moins un problème de coordination, comparaison internationale (2017, en %) | 91 |
| Tableau 6.76 | Au moins un problème de coordination, comparaison internationale (2014, en %) | 91 |
| Tableau 6.77 | Au moins un problème de coordination, Suisse (2017, en %) | 92 |
| Tableau 6.78 | Au moins un problème de coordination, Suisse (2014, en %) | 92 |
| Tableau 6.79 | Consultation d'un spécialiste au cours des deux dernières années, comparaison internationale (2017, en %) | 93 |
| Tableau 6.80 | Consultation d'un spécialiste au cours des deux dernières années, comparaison internationale (2014, en %) | 93 |
| Tableau 6.81 | Consultation d'un spécialiste au cours des deux dernières années, Suisse (2017, en %) | 94 |
| Tableau 6.82 | Consultation d'un spécialiste au cours des deux dernières années, Suisse (2014, en %) | 94 |
| Tableau 6.83 | Délai d'attente pour un rendez-vous chez un spécialiste, comparaison internationale (2017, en %) | 95 |
| Tableau 6.84 | Délai d'attente pour un rendez-vous chez un spécialiste, comparaison internationale (2014, en %) | 95 |
| Tableau 6.85 | Délai d'attente pour un rendez-vous chez un spécialiste, Suisse (2017, en %) | 96 |
| Tableau 6.86 | Délai d'attente pour un rendez-vous chez un spécialiste, Suisse (2014, en %) | 96 |
| Tableau 6.87 | Problèmes de coordination entre le médecin habituel et le spécialiste, comparaison internationale (2017, en %) | 97 |
| Tableau 6.88 | Problèmes de coordination entre le médecin habituel et le spécialiste, comparaison internationale (2014, en %) | 97 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| Tableau 6.89 | Problèmes de coordination entre le médecin habituel et le spécialiste, Suisse (2017, en %) | 98 |
| Tableau 6.90 | Problèmes de coordination entre le médecin habituel et le spécialiste, Suisse (2014, en %) | 99 |
| Tableau 6.91 | Consommation régulière de médicaments sur ordonnance, comparaison internationale (2017, en %) | 100 |
| Tableau 6.92 | Consommation régulière de médicaments sur ordonnance, comparaison internationale (2014, en %) | 100 |
| Tableau 6.93 | Consommation régulière de médicaments sur ordonnance, Suisse (2017, en %) | 101 |
| Tableau 6.94 | Consommation régulière de médicaments sur ordonnance, Suisse (2014, en %) | 101 |
| Tableau 6.95 | Analyse personnalisée de la consommation de médicaments, comparaison internationale (2017, en %) | 102 |
| Tableau 6.96 | Analyse personnalisée de la consommation de médicaments, comparaison internationale (2014, en %) | 102 |
| Tableau 6.97 | Analyse personnalisée de la consommation de médicaments, Suisse (2017, en %) | 103 |
| Tableau 6.98 | Analyse personnalisée de la consommation de médicaments, Suisse (2014, en %) | 103 |
| Tableau 6.99 | Hospitalisation au cours des deux dernières années, comparaison internationale (2017, en %) | 104 |
| Tableau 6.100 | Hospitalisation au cours des deux dernières années, comparaison internationale (2014, en %) | 104 |
| Tableau 6.101 | Hospitalisation au cours des deux dernières années, Suisse (2017, en %) | 105 |
| Tableau 6.102 | Hospitalisation au cours des deux dernières années, Suisse (2014, en %) | 105 |
| Tableau 6.103 | Suivi des soins à la sortie de l'hôpital, comparaison internationale (2017, en %) | 106 |
| Tableau 6.104 | Suivi des soins à la sortie de l'hôpital, comparaison internationale (2014, en %) | 106 |
| Tableau 6.105 | Suivi des soins à la sortie de l'hôpital, Suisse (2017, en %) | 107 |
| Tableau 6.106 | Suivi des soins à la sortie de l'hôpital, Suisse (2014, en %) | 108 |
| Tableau 6.107 | Médecin habituel informé des soins reçus à l'hôpital, comparaison internationale (2017, en %) | 109 |
| Tableau 6.108 | Médecin habituel informé des soins reçus à l'hôpital, comparaison internationale (2014, en %) | 109 |
| Tableau 6.109 | Médecin habituel informé des soins reçus à l'hôpital, Suisse (2017, en %) | 110 |
| Tableau 6.110 | Médecin habituel informé des soins reçus à l'hôpital, Suisse (2014, en %) | 111 |
| Tableau 6.111 | Soutien reçu à la sortie de l'hôpital pour gérer l'état de santé à la maison, comparaison internationale (2017, en %) | 112 |
| Tableau 6.112 | Soutien reçu à la sortie de l'hôpital pour gérer l'état de santé à la maison, Suisse (2017, en %) | 112 |
| Tableau 6.113 | Recours aux services d'urgence au cours des deux années précédentes, comparaison internationale (2017, en %) | 113 |
| Tableau 6.114 | Recours aux services d'urgence au cours des deux années précédentes, comparaison internationale (2014, en %) | 113 |
| Tableau 6.115 | Recours aux services d'urgence au cours des deux années précédentes, Suisse (2017, en %) | 114 |
| Tableau 6.116 | Recours aux services d'urgence au cours des deux années précédentes, Suisse (2014, en %) | 114 |
| Tableau 6.117 | Motif du recours aux services d'urgence, comparaison internationale (2017, en %) | 115 |
| Tableau 6.118 | Motif du recours aux services d'urgence, comparaison internationale (2014, en %) | 115 |
| Tableau 6.119 | Motif du recours aux services d'urgence, Suisse (2017, en %) | 116 |
| Tableau 6.120 | Motif du recours aux services d'urgence, Suisse (2014, en %) | 117 |
| Tableau 6.121 | État de santé, comparaison internationale (2017, en %) | 118 |
| Tableau 6.122 | État de santé, comparaison internationale (2014, en %) | 118 |
| Tableau 6.123 | État de santé, Suisse (2017, en %) | 119 |
| Tableau 6.124 | État de santé, Suisse (2014, en %) | 119 |
| Tableau 6.125 | Besoin d'aide, comparaison internationale (2017, en %) | 120 |
| Tableau 6.126 | Besoin d'aide, Suisse (2017, en %) | 120 |
| Tableau 6.127 | Fréquence de l'aide reçue, comparaison internationale (2017, en %) | 121 |
| Tableau 6.128 | Fréquence de l'aide reçue, Suisse (2017, en %) | 121 |
| Tableau 6.129 | Type d'aide reçue, comparaison internationale (2017, en %) | 122 |
| Tableau 6.130 | Type d'aide reçue, Suisse (2017, en %) | 122 |
| Tableau 6.131 | Absence d'aide pour des raisons de coûts, comparaison internationale (2017, en %) | 123 |
| Tableau 6.132 | Absence d'aide pour des raisons de coûts, comparaison internationale (2014, en %) | 123 |
| Tableau 6.133 | Absence d'aide pour des raisons de coûts, Suisse (2017, en %) | 124 |
| Tableau 6.134 | Absence d'aide pour des raisons de coûts, Suisse (2014, en %) | 124 |
| Tableau 6.135 | Risque auto-évalué de chute, comparaison internationale (2017, en %) | 125 |
| Tableau 6.136 | Risque auto-évalué de chute, Suisse (2017, en %) | 125 |
| Tableau 6.137 | Discussion avec le médecin sur les risques de chute, comparaison internationale (2017, en %) | 126 |
| Tableau 6.138 | Discussion avec le médecin sur les risques de chute, Suisse (2017, en %) | 126 |
| Tableau 6.139 | Sentiment d'isolement, comparaison internationale (2017, en %) | 127 |
| Tableau 6.140 | Sentiment d'isolement, Suisse (2017, en %) | 127 |
| Tableau 6.141 | Fournit des soins ou de l'assistance, comparaison internationale (2017, en %) | 128 |
| Tableau 6.142 | Fournit des soins ou de l'assistance, comparaison internationale (2014, en %) | 128 |
| Tableau 6.143 | Fournit des soins ou de l'assistance, Suisse (2017, en %) | 129 |
| Tableau 6.144 | Fournit des soins ou de l'assistance, Suisse (2014, en %) | 129 |
| Tableau 6.145 | S'est vu diagnostiquer de l'hypertension ou une haute pression sanguine, comparaison internationale (2017, en %) | 130 |
| Tableau 6.146 | S'est vu diagnostiquer de l'hypertension ou une haute pression sanguine, comparaison internationale (2014, en %) | 130 |
| Tableau 6.147 | S'est vu diagnostiquer de l'hypertension ou une haute pression sanguine, Suisse (2017, en %) | 131 |

| | |
|--|-----|
| Tableau 6.148 S'est vu diagnostiquer de l'hypertension ou une haute pression sanguine, Suisse (2014, en %) | 131 |
| Tableau 6.149 S'est vu diagnostiquer une maladie cardiaque, comparaison internationale (2017, en %) | 132 |
| Tableau 6.150 S'est vu diagnostiquer une maladie cardiaque, comparaison internationale (2014, en %) | 132 |
| Tableau 6.151 S'est vu diagnostiquer une maladie cardiaque, Suisse (2017, en %) | 133 |
| Tableau 6.152 S'est vu diagnostiquer une maladie cardiaque, Suisse (2014, en %) | 133 |
| Tableau 6.153 S'est vu diagnostiquer du diabète, comparaison internationale (2017, en %) | 134 |
| Tableau 6.154 S'est vu diagnostiquer du diabète, comparaison internationale (2014, en %) | 134 |
| Tableau 6.155 S'est vu diagnostiquer du diabète, Suisse (2017, en %) | 135 |
| Tableau 6.156 S'est vu diagnostiquer du diabète, Suisse (2014, en %) | 135 |
| Tableau 6.157 S'est vu diagnostiquer de l'asthme ou une maladie pulmonaire chronique, comparaison internationale (2017, en %) | 136 |
| Tableau 6.158 S'est vu diagnostiquer de l'asthme ou une maladie pulmonaire chronique, comparaison internationale (2014, en %) | 136 |
| Tableau 6.159 S'est vu diagnostiquer de l'asthme ou une maladie pulmonaire chronique, Suisse (2017, en %) | 137 |
| Tableau 6.160 S'est vu diagnostiquer de l'asthme ou une maladie pulmonaire chronique, Suisse (2014, en %) | 137 |
| Tableau 6.161 Maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement), comparaison internationale (2017, en %) | 138 |
| Tableau 6.162 Maladies chroniques diagnostiquées, comparaison internationale (2014, en %) | 138 |
| Tableau 6.163 Maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement), Suisse (2017, en %) | 139 |
| Tableau 6.164 Maladies chroniques diagnostiquées, Suisse (2014, en %) | 139 |
| Tableau 6.165 S'est vu diagnostiquer une dépression, de l'anxiété ou d'autres problèmes psychiques, comparaison internationale (2017, en %) | 140 |
| Tableau 6.166 S'est vu diagnostiquer une dépression, de l'anxiété ou d'autres problèmes psychiques, comparaison internationale (2014, en %) | 140 |
| Tableau 6.167 S'est vu diagnostiquer une dépression, de l'anxiété ou d'autres problèmes psychiques, Suisse (2017, en %) | 141 |
| Tableau 6.168 S'est vu diagnostiquer une dépression, de l'anxiété ou d'autres problèmes psychiques, Suisse (2014, en %) | 141 |
| Tableau 6.169 S'est vu diagnostiquer un cancer, comparaison internationale (2017, en %) | 142 |
| Tableau 6.170 S'est vu diagnostiquer un cancer, comparaison internationale (2014, en %) | 142 |
| Tableau 6.171 S'est vu diagnostiquer un cancer, Suisse (2017, en %) | 143 |
| Tableau 6.172 S'est vu diagnostiquer un cancer, Suisse (2014, en %) | 143 |
| Tableau 6.173 S'est vu diagnostiquer des douleurs articulaires, de l'arthrite, comparaison internationale (2017, en %) | 144 |
| Tableau 6.174 S'est vu diagnostiquer des douleurs articulaires, de l'arthrite, comparaison internationale (2014, en %) | 144 |
| Tableau 6.175 S'est vu diagnostiquer des douleurs articulaires, de l'arthrite, Suisse (2017, en %) | 145 |
| Tableau 6.176 S'est vu diagnostiquer des douleurs articulaires, de l'arthrite, Suisse (2014, en %) | 145 |
| Tableau 6.177 S'est vu diagnostiquer une attaque cérébrale, un AVC, comparaison internationale (2017, en %) | 146 |
| Tableau 6.178 S'est vu diagnostiquer une attaque cérébrale, un AVC, Suisse (2017, en %) | 146 |
| Tableau 6.179 S'est vu diagnostiquer des problèmes neurologiques, Suisse (2017, en %) | 147 |
| Tableau 6.180 S'est vu diagnostiquer des problèmes neurologiques, Suisse (2014, en %) | 147 |
| Tableau 6.181 Maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement, suite), comparaison internationale (2017, en %) | 148 |
| Tableau 6.182 Maladies chroniques diagnostiquées (suite), comparaison internationale (2014, en %) | 148 |
| Tableau 6.183 Maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement, suite), Suisse (2017, en %) | 149 |
| Tableau 6.184 Maladies chroniques diagnostiquées (suite), Suisse (2014, en %) | 149 |
| Tableau 6.185 Nombre de maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement, A1-A8), comparaison internationale (2017, en %) | 150 |
| Tableau 6.186 Nombre de maladies chroniques diagnostiquées (A1-A8), comparaison internationale (2014, en %) | 150 |
| Tableau 6.187 Nombre de maladies chroniques diagnostiquées (actuelles et plus en traitement, A1-A8), Suisse (2017, en %) | 151 |
| Tableau 6.188 Nombre de maladies chroniques diagnostiquées (A1-A8), Suisse (2014, en %) | 151 |
| Tableau 6.189 A eu une discussion sur les priorités ou principaux objectifs à atteindre, comparaison internationale (2017, en %) | 152 |
| Tableau 6.190 A eu une discussion sur les priorités ou principaux objectifs à atteindre, comparaison internationale (2014, en %) | 152 |
| Tableau 6.191 A eu une discussion sur les priorités ou principaux objectifs à atteindre, Suisse (2017, en %) | 153 |
| Tableau 6.192 A eu une discussion sur les priorités ou principaux objectifs à atteindre, Suisse (2014, en %) | 153 |
| Tableau 6.193 A reçu des instructions claires sur les symptômes à surveiller, comparaison internationale (2017, en %) | 154 |
| Tableau 6.194 A reçu des instructions claires sur les symptômes à surveiller, comparaison internationale (2014, en %) | 154 |
| Tableau 6.195 A reçu des instructions claires sur les symptômes à surveiller, Suisse (2017, en %) | 155 |
| Tableau 6.196 A reçu des instructions claires sur les symptômes à surveiller, Suisse (2014, en %) | 155 |
| Tableau 6.197 Professionnel de la santé de contact, comparaison internationale (2017, en %) | 156 |
| Tableau 6.198 Professionnel de la santé de contact, comparaison internationale (2014, en %) | 156 |
| Tableau 6.199 Professionnel de la santé de contact, Suisse (2017, en %) | 157 |
| Tableau 6.200 Professionnel de la santé de contact, Suisse (2014, en %) | 157 |
| Tableau 6.201 Professionnel de la santé facilement joignable entre les visites du médecin, comparaison internationale (2017, en %) | 158 |

| | |
|---|-----|
| Tableau 6.202 Professionnel de la santé facilement joignable entre les visites du médecin, comparaison internationale (2014, en%)..... | 158 |
| Tableau 6.203 Professionnel de la santé facilement joignable entre les visites du médecin, Suisse (2017, en%)..... | 159 |
| Tableau 6.204 Professionnel de la santé facilement joignable entre les visites du médecin, Suisse (2014, en%)..... | 159 |
| Tableau 6.205 Dispose d'un plan de traitement, comparaison internationale (2017, en %)..... | 160 |
| Tableau 6.206 Dispose d'un plan de traitement, comparaison internationale (2014, en %)..... | 160 |
| Tableau 6.207 Dispose d'un plan de traitement, Suisse (2017, en %)..... | 161 |
| Tableau 6.208 Dispose d'un plan de traitement, Suisse (2014, en %)..... | 161 |
| Tableau 6.209 Confiance quant à la gestion des problèmes de santé, comparaison internationale (2017, en %)..... | 162 |
| Tableau 6.210 Confiance quant à la gestion des problèmes de santé, Suisse (2017, en %)..... | 162 |
| Tableau 6.211 Discussion avec un professionnel de la santé, comparaison internationale (2017, en %)..... | 163 |
| Tableau 6.212 Discussion avec un professionnel de la santé, comparaison internationale (2014, en %)..... | 163 |
| Tableau 6.213 Discussion avec un professionnel de la santé, Suisse (2017, en %)..... | 164 |
| Tableau 6.214 Discussion avec un professionnel de la santé, Suisse (2014, en %)..... | 164 |
| Tableau 6.215 Consommation de cigarettes ou de tabac, Suisse (2017, en %)..... | 165 |
| Tableau 6.216 Consommation de cigarettes ou de tabac, Suisse (2014, en %)..... | 165 |
| Tableau 6.217 Discussion concernant la consommation de cigarettes ou de tabac, Suisse (2017, en %)..... | 166 |
| Tableau 6.218 Discussion concernant la consommation de cigarettes ou de tabac, Suisse (2014, en %)..... | 167 |
| Tableau 6.219 Sentiment de détresse émotionnelle, comparaison internationale (2017, en %)..... | 168 |
| Tableau 6.220 Sentiment de détresse émotionnelle, Suisse (2017, en %)..... | 168 |
| Tableau 6.221 Aide professionnelle reçue en cas de sentiment de détresse émotionnelle, comparaison internationale (2017, en %)..... | 169 |
| Tableau 6.222 Aide professionnelle reçue en cas de sentiment de détresse émotionnelle, Suisse (2017, en %)..... | 169 |
| Tableau 6.223 Désirs en matière de soins de fin de vie, comparaison internationale (2017, en %)..... | 170 |
| Tableau 6.224 Désirs en matière de soins de fin de vie, comparaison internationale (2014, en %)..... | 170 |
| Tableau 6.225 Désirs en matière de soins de fin de vie, Suisse (2017, en %)..... | 171 |
| Tableau 6.226 Désirs en matière de soins de fin de vie, Suisse (2014, en %)..... | 172 |
| Tableau 6.227 Discussion avec le médecin sur les choix de fin de vie, Suisse (2017, en %)..... | 173 |
| Tableau 6.228 Modèle pour l'assurance-maladie de base, Suisse (2017, en %)..... | 174 |
| Tableau 6.229 Modèle pour l'assurance-maladie de base, Suisse (2014, en %)..... | 175 |
| Tableau 6.230 Niveau de franchise pour l'assurance-maladie, Suisse (2017, en %)..... | 176 |
| Tableau 6.231 Niveau de franchise pour l'assurance-maladie, Suisse (2014, en %)..... | 177 |
| Tableau 6.232 Difficultés à payer des factures médicales, comparaison internationale (2017, en %)..... | 178 |
| Tableau 6.233 Difficultés à payer des factures médicales, comparaison internationale (2014, en %)..... | 178 |
| Tableau 6.234 Difficultés à payer des factures médicales, Suisse (2017, en %)..... | 179 |
| Tableau 6.235 Difficultés à payer des factures médicales, Suisse (2014, en %)..... | 179 |
| Tableau 6.236 Soucis financiers pour l'achat d'aliments sains, comparaison internationale (2017, en %)..... | 180 |
| Tableau 6.237 Soucis financiers pour l'achat d'aliments sains, Suisse (2017, en %)..... | 180 |
| Tableau 6.238 Soucis financiers pour le paiement du loyer ou de l'hypothèque, comparaison internationale (2017, en %)..... | 181 |
| Tableau 6.239 Soucis financiers pour le paiement du loyer ou de l'hypothèque, Suisse (2017, en %)..... | 181 |
| Tableau 6.240 Soucis financiers pour le paiement de factures non médicales, comparaison internationale (2017, en %)..... | 182 |
| Tableau 6.241 Soucis financiers pour le paiement de factures non médicales, Suisse (2017, en %)..... | 182 |
| Tableau 6.242 Difficultés matérielles, comparaison internationale (2017, en%)..... | 183 |
| Tableau 6.243 Difficultés matérielles, Suisse (2017, en%)..... | 183 |
| Tableau 6.244 Montant des dépenses médicales (en USD) du ménage non couvertes par l'assurance maladie (base ou complémentaire) au cours des douze derniers mois, comparaison internationale (2017, en %)..... | 184 |
| Tableau 6.245 Montant des dépenses médicales (en USD) du ménage non couvertes par l'assurance maladie (base ou complémentaire) au cours des douze derniers mois, comparaison internationale (2014, en %)..... | 184 |
| Tableau 6.246 Montant des dépenses médicales (en USD) du ménage non couvertes par l'assurance maladie (base ou complémentaire) au cours des douze derniers mois, Suisse (2017, en %)..... | 185 |
| Tableau 6.247 Montant des dépenses médicales (en USD) du ménage non couvertes par l'assurance maladie (base ou complémentaire) au cours des douze derniers mois, Suisse (2014, en %)..... | 185 |
| Tableau 6.248 Recours aux instruments de cybersanté au cours des deux dernières années, Suisse (2017, en %)..... | 186 |
| Tableau 6.249 Pourrait imaginer recevoir les suites d'un traitement par des professionnels de la santé non médicaux, Suisse (2017, en%)..... | 187 |
| Tableau 6.250 Pourrait imaginer recevoir les suites d'un traitement par des professionnels de la santé non médicaux, Suisse (2014, en%)..... | 188 |
| Tableau 6.251 Opinion concernant la quantité de soins reçus au cours des douze derniers mois, Suisse (2017, en%)..... | 189 |



GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CDS Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Département fédéral de l'intérieur DFI
Dipartimento federale dell'interno DFI



Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) ist eine gemeinsame Institution von Bund und Kantonen.
L'Observatoire suisse de la santé (Obsan) est une institution commune de la Confédération et des cantons.
L'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) è un'istituzione comune della Confederazione e dei Cantoni.